

應驗藥



千金保真散	保產無憂散	加味芎歸湯	衣胞不下	化生湯
華陀愈風散	小兒初服方	臍風馬牙方	臍風艾葉方	通瓜湯
婦人乳痛	小兒胎熱	嬰兒洗浴方	稀豆方	夜啼方
麻糝撮要賦	清金一貫散	止鼻血歌	火牙疼痛	虫牙痛
火眼初起	眼生挑針	耳根紅腫	耳心貫膿	朽耳瘡
虫入耳內	口舌熱痛	喉痛難飲	悞吞錢物	錢卡喉中
吞針	湯火初起	火毒攻心	惡犬咬傷	瘋犬咬傷
中風痛急	中風痰壅	中風卒倒	中暑	水瀉不止
熱瀉下血	痢疾腹痛	瘧疾奇方	瘧疾奇方	發痧方
刀傷磕損	蛇串瘡	疥瘡	瘡一切毒	解藥毒
牛馬毒	食魚中毒	蛇虫咬傷	蜈蚣咬傷	惡虫傷
諸骨硬	吞髮燒喉	悞吞螞蝗	蜘蛛咬人	竹木入肉

藥方目錄

婦人氣痛

瘍疾二方

風熱目疾

咳嗽並老咳嗽方各一

手足風溼痛

癩病陽物潰爛方二

癰疽潰爛

婦人心慌

癆病

瘡疾二方

白喉嚨

目疾雲翳不消

哮喘病

風溼兩足不能動舉

膝痛足痛各一方

癬瘡

脫肛

大腸下血

雙目青盲

頭頂風癢

婦人年老頭痛心噁

目視不明

小兒潮熱咳嗽氣喘

風溼徧身疼痛

疝氣少腹痛三方

疥癩癢甚

黃腫病

戒洋煙癮

風熱眩眼

頭瘡爛癢

應驗藥方

吐血兼衄血肺家之血

腎子氣腫

保產萬應

生化湯

達生散

稀痘臍帶

瘋犬咬傷

時行痢疾

偏頭痛

截三陰瘡

火燒破爛

脚指間溼氣潰爛

久患寒瀉白痢後重

加味芎歸湯

當歸補血湯

秘傳小兒驚風散

臍風三方

咽喉腫痛

治痢奇方

疔毒

毒蛇咬傷

跌打損傷

腰疽潰爛

鼻塞

佛手散

通脈湯

保嬰出痘

撮口臍風

牙痛

頭痛

無名腫毒

蜈蚣咬傷

刀傷

解諸毒 天保采微湯 如意丹 七厘散 點舌丹

金黃散 治廉瘡 敗毒藥 除瘟殺毒丹 益元散

身面汗斑 身中狐臭 身面白丹 喉蛾散 咳痰初起

潤肺膏 夫血症 吐血仙方 體膈 血筋方

白帶方 五淋散 固精丸 腎囊風 龜頭生瘡

大人騎襠 縮陰症 諸風証 壯親丹 肥兒丸

小兒虫積 虫積肚痛 寸金丹 難產 長春丹 長壽酒

戒食洋煙 鼻中出血 口瘡 刺毒腫痛 眼中流淚 小便不通

大便不快 破傷風 急傷寒 牙疼 蛇傷 犬傷 龜病 湯火傷

蚊虱 胡臭 自縊 耳疼 牙疼 重舌 雙蛾 久痢

咽喉不通 乳少 乳瘡 胎前 發瘧 口瘡 頭風痛

月水不通 自汗 犬傷 轉筋吐瀉 痺癩 瘰癧 骨鯁

耳聾 蛇大傷 安胎 止痛 痔漏 接骨 解酒

催生 果毒 吃噫 赤眼 刀斧傷 瘡疾 小兒撮口

忘事 蜈蚣 蛇蝎 傷 消渴 小兒撮口

口臭 痔毒 赤眼 刀斧傷 瘡疾 小兒撮口

倒生 產後無乳 陰中腫 陰瘡 產難 小兒撮口

小兒瀉疾 產後無乳 陰中腫 陰瘡 產難 小兒撮口

共方 百五十九

千金葆真丸

子嗣一門悉用辛熱壯火之劑若施之氣虛精

寒之人固所當然用於火旺精衰者不愈伐其陰乎予歷

檢古方種子丸男女所宜常服平穩屢驗者開列於后尚

洽房勞太過腎氣虛衰精寒不能生子服是方者養精惜

氣男女寡慾琴瑟友之自然多子

鹿角膠六兩蛤粉炒成珠 杜仲二兩鹽水炒 胡盧巴一兩 山藥一兩

熟地二兩 故紙一兩同胡盧巴羊腎煮熟去羊腎焙干為末 雲苓 棗皮各二兩

五味五錢 益智鹽水炒 遠志肉甘草水製 川練子酒煮去核 巴

戟酒各一兩 沉香五錢 肉蓯蓉酒洗四兩 枸杞 九製香附

藥方

各二
兩 精流不痛者加魚膠三兩蛤粉炒成珠 練密爲丸 此方不

用桂附壯火助陰純用溫養精血之味獨以沉香益智鼓
其氤氲又以練子抑其陽引諸陽藥歸宿下元深得廣嗣
之旨

神效保產無憂散

此方山陰胡公家傳其數十年無產厄及小產之患蓋
有胎即能安胎欲生即能催生大凡懷孕之婦不必問以
日月如果傷胎氣或腰酸腹痛只要一服即安者見紅勢
欲小產者亦一服即安再服即愈若十月滿足或臨盆艱
危者一服即下倘遇橫生倒產或六七日不下或見死腹

起七月服一劑八月服二劑九月服三劑十月亦服三劑
臨產再服一劑諸事平安余見藥味分兩恐難記憶特編
歌訣以記之其分兩務要過戩稱足如法炮製不可加減
倘擅自加減懶於炮製則不應驗

歌訣

安胎芥八六枳殼 芎歸錢五七艾朴

羌草生芪各五分 貝兔一錢錢二芍

荆芥穗 八分 炒枳殼 六分 川芎 一錢五分 羌活 五分

生箭芪 五分 川貝母 一錢去心 紫厚朴 七分姜炒

兔絲子 一錢 當歸 一錢五分 斷艾 七分 甘草

一錢

抹淨酒泡

當歸

一錢五分

酒洗

斷艾

七分

甘草

五分 酒白芍 二分

生薑三片木二鐘煎八分若婦人有孕至二三月者不論

有病無病皆可月服三兩劑但宜空心服若將臨盆或胎

動不安以及勢欲小產者皆宜熱服虛極者加人參五分

加味芎歸湯 百試百驗萬叫萬靈真神方也

此方催生第一交骨不開用此方如神

當歸 一兩 川芎 七錢 敗龜板 手大一井 醋炙研末 婦人髮 如雞

蛋大一團瓦 上焙存性 水二碗煎一碗服如人行五里即生胎亦下

小兒衣胞不下不必服藥亦不必驚慌急用粗麻線將臍帶繫

住又將臍帶雙折再繫一道以物墜住再將臍帶剪斷

其放心不必驚恐切不可聽信穩婆用手法取每有因此而傷生者慎之慎之

生化湯 無論有病無病產下即服此方能治產後兒枕痛及

惡露不行腹痛等症逐瘀生新永免一切產危或兩三日

內精神疲倦或腹中作痛再連服二三劑即愈無不立效

全歸 入錢 川芎 四錢 乾薑 五分 桃仁 十粒去皮尖研碎水

一匙童便一鍾煎服若惡而巳行腹痛已止減去桃仁多服三四劑不妨

華陀愈風散 治產後中風口噤手足抽掣及角弓反張或心頭

刺芥穗 除根不用焙乾研末 每服三錢童便調服口噤則

藥方

四

挑牙灌之斷噪則不研末只將荆芥以童便煎放微溫灌入鼻中即愈其效如神

小兒下地時先服此藥永無驚風少生瘡疾

連翹 八分 金銀花 二錢 勾藤 一錢 虫退 七個去頭足

赤芍 六分 防風 八分 荆芥 一錢 薄荷 八分 甘草

四分 灯心引 加大黃尤妙

嬰兒臍風馬牙簡驗神方

枯礬 二錢五分 硼砂 五分 硃砂 三分 冰片麝香 各五厘

共爲細末凡嬰兒下地洗過即用此末搽臍眼上每日換

尿布時仍搽上此末搽完一料此兒永無臍風等症

切片貼臍上用艾火炙之卽愈此方兼治撮口風大凡臍
風肚腹必作青筋一道行至肚却生兩岔行至心不治必
詳視其青筋兩岔盡頭處各炙灯火三五壯卽愈

通脈湯 治乳少或無乳

生箭芪 一兩

當歸 五錢

白芷 五錢

用七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面
睡卽有乳或未效再一服無不通矣

新產無乳者不用猪蹄只用水一半酒一半煎服體壯者
如好紅花三分以消惡露

婦人乳痛 用蒲公英 金銀花 各五錢 甜酒二碗煎一碗熱

服汗出渣炒熱包患處神效如酒少者對水煎服

小兒胎熱身上濕爛 用泥蜂窩土細末搽上即效又方用草

房上青苔 乾末搽之一方用蕎米粉擦搽尤效

嬰兒下地候先 肥大川練子七個搗爛砂窩內煎爛通身洗

擦不生瘡 平常用此洗之至三五歲者川練子要十餘

個可免痘疹 出必稀真有奇效

稀痘神方

立春前一月將 蛋七個用麻布袋盛上用線掛好浸尿

桶內 糞取一口 蛋勿埋土內三日 須趁 立春日早用

磁罐煮三枚

須糖心
令易吃

諸食宜少進恐飽不能食總三日內

吃完兒小者一二枚亦可食過三年重者必稀輕者不出

按痘皆父母遺毒今用尿浸消後天之毒用上理培先之

氣又當立春回陽之候服之毒消痘稀必然之理也慎勿以礮而

忽之

小兒夜啼青黛水研服之又方用五倍子研末口水調填臍中

麻疹撮要賦

疹出於肺前人言之詳矣亦感天地邪陽火旺之氣而出

其大概與痘相同且痘屬五經皆見之症而疹獨居於肺

何也疹未有不咳者咳肺之鬱火也疹多喉痛喉肺之竅

也肺火上衝於喉故痛痛者啞之由也疹多腹痛大腸者

肺之腑也肺火衝突於內故腹痛疹多泄瀉大腸者傳送之官也肺火下注故瀉疹多喘喘者肺火太盛也疹多痰痰者肺火之所蒸也疹症不一肺病獨多故善治疹者惟自清肺爲主諸症以兼治一則思過半矣

一發熱症治

疹毒一萌熱卽兆其先其熱與外感相同身熱咳嗽鼻塞聲重涕溼稠粘眼弦如醉惟以嗽爲憑嗽之重者疹亦重嗽之輕者疹亦輕其治法惟清肺涼血兼散風熱不宜用升麻生姜芫荽辛熱等升陽提火蓋火之輕者升之亦可解散火之重者不提而猶上竄一遇升麻生姜芫荽

等必上炎而泰陽位頭腫喉痛聲啞氣喘可立而待矣此
 治其常者也若遇梟惡之症毒火隱伏再服辛熱升提補
 滯等藥必致氣喘聲啞似出不出悶閉而死清金一貫飲
 雖非萬病回春之方果若未經誤治已至危絕等症決無
 有不百發百中者矣

清金一貫飲

枯芩 大者三錢至五 枳椇 大者二 牛蒡子 大者二三
三 小者一 至 小者一 至 小者一 至
 大者二錢中者一 至 荊芥 大者 批前胡 大者二三
半 小者一 至 小者一 至 小者一 至
 錢至二 至 青皮 大者二 淮木通 大者二
小者一 小者一 至 小者一 至 小者一 至
 生甘草 大者六分 白芍藥 大者三
四分 小者二分 至 小者五分 至 小者五分 至

火盛大便閉結加大黃大者五升中者三升小者一升見點血熱加

生地大者五升小者三升大熱火盛口渴加石膏

大者三五升小者一至二升中者三升三日出齊加元參大者三升小者二升

小者五升粗大加大黃蟬退十五個至

深紅加大黃生地丹皮元參 干紅加大黃紫草生地丹

皮桃仁紫草三升桃仁一二升氣喘加桑皮杏仁風寒閉膈加麻黃

一錢三日後疹已無恙獨燒不退或經日久疹不散盡者

重加生地蟬退元參丹皮

止鼻血歌

石柳花辦可以寒

...