

黃氏紀效新書

黃氏紀效新書下卷目錄

瘡 痢 泄瀉

大小便閉 嘔吐 餽雜

呃逆 自盜汗汗脫 疸

痿痺 調經 帶下

崩漏 胎前 產後


遺精淋濁 消渴 不寐

喉嚨 梅核氣 陰虛喉痺 乳癆 鼻淵牙宣耳日疾

幼科蟲積 外科 腸疔 痔瘡 懸癭 瘡疥



紀效新書



黃雲臺先生著

黃壽南校註

二瘡


錢 三三歲

但熱不寒為三單瘡
舌白底絳濕色甚也
濕胆湯方
化濕藥 痰涎 待利 三
真氣白
薑手厚皮 茯苓
吳橘紅 枳壳
甘肫 炒竹葉

寒熱轉為單瘡 甚由少陽而入陽明 舌白底絳不渴 脈頗弦 數濕甚內益從單瘡例治

溫膽湯去草加
小川連 茯苓 白杏仁 六一散 荷葉

華 甲子歲



仲景復脈湯 又名三升湯

治傷寒脈結代心動

悸者又治肺痿咳吐血

心中澀澀之者

炙甘草 生薑 桂枝

麥冬 麻子仁 大棗

人參 河膠 生地黃

以清酒水差二升煮碎

入河膠柯氏云五河膠

以通脈膠代麻子仁用

後者肺痿以麻子仁

薄暮微寒身熱平旦得汗乃解病延已久按以仲景

復脈湯合乎邪少虛多之治

炙草 細生地 青蒿 茯苓 穀芽 紅棗

桂枝 麥冬因 丹皮 廣皮 煨姜

袁 右三十七歲

產後伏邪內動痺瘧不退舌濁脫胸始從氣分

邪勿派產後陰虛之例

羚羊角 青蒿 赤苓 陳皮 桑皮 炒仁

焦山危 姜半夏 竹茹 杏仁 川通草

丹溪云痰瘰者三陰

瘰也三日一發發於子午

身自日者少陰瘰如瘰

於寅申巳亥日者厥陰

瘰如瘰於辰戌丑未

日者太陽瘰也更須以

脈診為之也後決其

信而身治法

諸苓湯

蒼朮濟瀉湯瀉濁如

諸苓 蒼朮 滑石 澤瀉 阿膠

錢 三子散三瘰

瘰瘰于辰戌丑未丹溪謂之太陽瘰腹滿不運是其
見端以培土泄邪法

枳實 半夏 柴胡 茯苓 老薑

炒芫朮 橘紅 草果 淡芩 紅朮

呂 三歲

瘰瘰退不消畜甚勝脫少腹微滿仿諸苓湯法

諸苓 阿膠 澤瀉 白朮 麩皮

赤苓 滑石 丹皮 炒桑

六君子湯
中氣用之之要
人考 桂枝 茯苓
甘州 平夏 陽夏

華子虛

八白大弟中陽因五支冬發病間日一至泄瀉每處脈
濡細右手不搖不欲細弱此胃健脾憊恐難長莫
及奈何

六君子湯加 煨姜 大棗

楊 三六右

新產感冒客邪間日寒熱為痛瘧痰煩渴引飲必
得大汗淋漓乃解。眩暈悸動夢驚術大虛仲聖三
病論多汗善惡此其一端詳可慮也

桂枝 白薇 黨參 白石斛 雲苓 石決明

白芍 夜粉 丹皮 射干 益母草 益母代

孫 辛夷

恙後未復又因寒暖不和瘧疾微寒熱熾薰蒸為黃濁而口渴渡赤脈形數神勇充斥三焦理宜苦辛通泄氣勿

小川連 茯苓 茵陳 夜粉 通草

姜黃 澤瀉 滑石 白寇仁

蘇

全虛云瘡寒多微胃助肢冷汗流口渴喜溫飲
脈遲緩知宗壯瘡論但經吐瀉腕痛正氣已虛
玄端莫測慎勿忽視

桂枝

牡蠣

雲英苓

乾薑

茯苓

吳茱

小麥根

諸

瘡瘡甚熾煩冤曾任大活蘊慈自因而發故
消又甚脈轉數往之甚也欲清陽以理推白帛
且有辛涼達表之功

白虎湯

若湯用黏濁飲飲如膠

非大浮瀉不寒反惡乃

生石膏一斤 知母七升

甘草半斤 粳米六合

以水一斗煮取粳米湯

去渣滓服一升日三服

生石膏

杏仁

赤苓

生升

塊消石

熟羊角

連翹

鬱金

佛手

南薄荷

胎知母

真危

鮮竹葉

二診

前議清陽以泄少陽熱退得活均屬轉機茲伏邪

白藜胃起伏之威微胃寒似胃復瘧之意舌絳燥

略減煎款瀉佐以手經主也

羚羊角

連翹

鬱金

赤苓

桑枝

真山危

杏仁

古高

滑石

苦根

三診

症象向如惟^甚微黃仍魚灰瀉氣分餘未清者宜慎調

川貝母 淡芩 赤苓 魚尾 通草

白杏仁 橘白 澤瀉 枳椇殼

四診

間瘧惡心腕痛起自足腫外癢濕甚蘊過使然

溫膽湯去甘草加

川連 柴胡 淡芩 藿香梗 炒仁

錢 三六歲

舊恙肝胃不和痲攻嘔吐加以收受暑濕但患不寒渴
不多飲口中甜膩脈來弦數從痺瘡例治

薑手夏 黃苓 青蒿 菴仁 六一散 焦山危

山連 杏仁 廣皮 赤苓 芦根

周

痺瘡舌絳煩渴汗後復起防其化燥神昏勢勿渺視

犀角尖 夜粉 鬱金 連翹心 焦山危

鮮生地 青蒿 桑枝 芦根

二診

氣熾煩渴。波赤。陽氣獨盛之象。頭痛汗出。舌起微黃。究屬氣分未宣。兼以清透。

羚羊角

淡豆豉

杏仁

薄荷

連翹

桑葉

焦山桅

青蒿

菴仁

(合研包)
生石膏

衣粉

芦根

劉石

初瘧因產後元虛。勞倦感受暑熱。濕滯中宮。更觸新涼。所以發則反無汗。而寒熱均重。作渴脫痞。口膩惡心。府陽失陽。脈虛弦而數。此心氣漸虧。邪深膠固。且甚。甚則神氣迷蒙。頭可微矣。經旨太陽為開。若專事和解。未

能奏效者為此

二蘇裡 半夏 紫胡 益元散 薑皮

杏仁 花粉 淡芥 江枳殼 秋露水

二診

前議辛宣洩太陽已得大汗而解此屬應機瘧來
寒慄甚勢較短而神氣逆弱頭疼作渴舌心灰
黑者為薰蒸風陽亢甚上焦累胸者仍慮筋而鼓
宗長沙通調營衛清泄氣分藥其漸輕身

桂枝 青蒿 淡芥 羚羊角 蘇合香 益元散

理中湯

治傷寒直中太陰自利不渴寒多而嘔中氣不運

人參 白朮 甘草

乾姜 各三兩 加附子

二枚 名附子理中湯程

應旋去命口益平每過

矣

茯苓 知母 杏仁 連翹心 荷葉露

化 三症傳及脾張

三症一載中陽因頓寒多厥心脹脾脾胃交傷浮非
輕者與附子理中湯加味

附子理中湯加味

枳實 白朮 茯苓 沉香 砂仁

浦 二十餘歲

三症漸見寒甚稍輕但其根竅深未易驟回宜搜
邪扶正調治

王士雄云外感為癩原
 不外乎風寒燥暑為
 裏論亦不外乎痰食
 但癩疾存是外感病
 不過輕在傷身故傷寒
 有為癩亦有為今世正
 傷寒為溫者者連三病
 多瘡而外也故善治溫
 氣者推補始知治癩
 之全解也
 又曰癩有修上癩有附
 癩有藏癩治法各異
 輕者皮重者皮死

桂枝 雲仙 栝白 當歸 當歸 薑

鼈甲 青蒿 羊夏 白芍 茯苓 粳

畢 四十二歲

大癩脈弦細真陽必虧且值冬令葢寒時年深
 而其根愈固苟非補正搜邪焉得胃瘳

附子 紫苑 羊夏 鼈甲 栝白 仁棗

桂朮 茯苓 炙草 雲仙 煨薑

錢

毒之黑苔漸化可徵陰液未復診得脈右弦甚木脾仍

故問二日而後作若俗林
 三病其害藏二病少而
 府病尤力經上病倍病
 焉為故驟死者明
 之曰陽分大虛必扶實
 陰分大虛必扶氣况濕
 者三病尤易傷陽
 主天所論前主遠微
 因之猶作書局

乘脾土見象再宗橫龍為如仁搜別結解勿使結
 痰痼疾其呈自與見珍者方書云非真寒也德田益虛不
 和身

龍甲 樞榔 川芎 吳穿甲 細生地

香澤 雲仙 夜粉 鹿角霜 麦芽湯代水

患 三三三威

大瘡特為日作乘時漸寔結母支滿臍窞并正混淆
 勢化鼓脹大便滯泄不爽府陽窒滯使如

紫胡 青皮 淡荅 荻荅 威靈仙 炒麦芽

錢

龍甲 芩白 薑夏 丹皮 另服來復丹

昔賢之治後宴為邪陷胃納減必宜扶脾升陽泄邪

六君子湯加

桂枝 柴胡 龍甲 知母 紅杏 薑

朱 三子七歲

先瀉後痞轉三陽大便溏泄從太陰治

煨草果 焦朮 薑夏 茯苓 大棗

芩白朮 茯苓 煨薑