

廣陵醫籍叢刊

痢疾目錄

內經錦囊痢疾原論

自論痢症由

痢疾論治

痢症論脈

治痢各方

和瘥清痢飲

暢肝清痢湯

解暑清痢飲

清金止痢湯

固陰清痢煎

附論

救痢悞治壞症方

奪命救痢飲

治痢救陰煎

濟陰回春飲

溫脾清痢飲

溫腎止痢煎

清胃除痢湯

救陰清痢飲

補氣清痢湯

補陰清痢飲

祛痢飲

清痢飲

除濕清痢飲

養陰化濕除痢湯

陳遠公治痢引胃湯

又靖亂湯

又治痢啓關散

又止脫救痢湯

溫中救痢飲

新附

清中救痢飲

六味地黃湯

附丸

補血保胎清痢湯

治孕婦之痢

孕婦痢後調理方

產後補血化痢湯

養陰培元煎

產後痢愈調理方

小兒痘疹後痢疾論

附方

補脾清痢飲

養陰解毒清痢湯

調理健脾丸方

附久痢應驗單方

休息久痢不愈方

治久痢紅多方

治久痢白多方

治久痢紅白方

陳遠公治長年累月痢不愈方

又煎方

又治痢氣逆不舒下痢不止方

又消瘀神丹方

治久痢不止下如清涕如油內有紫黑血絲方

新方鐵甲散

又廣濟痢疾方

又烏金治痢丸方

痢後調理諸方

理陰益氣煎

治痢後氣血兩虛

調中益氣煎

治痢後氣虛怕冷

補脾和肝飲

治痢後肝燥脾虛作瀉

培土分消飲

治痢後脾虛頭面四肢虛腫腹脹

起脾湯

治痢後四肢痿無力

安神飲

治痢後陰虛不寐

又附初生小兒調護論并備各症諸應驗方

治臍風撮口方

又方治症同上

又方治症同上

傷風發熱方

治小兒禁口不乳方

治臍內有瘡出水方

又方治症同上

治小兒目赤紅腫眼不開方

治小兒小便不通方

治小兒大便不通

五福化毒丹

治胎火毒方

青金丸

治小兒胎熱化痰鎮驚邪方

天麻丸

治胎風神效方

鈎藤飲

治小兒天癇目睛上視四肢痲癢方

天竺黃散

治症同上

治小兒盤腸氣神方

又方

治同上

木香丸

治驚風內癇肚痛驚啼

乳香丸

治症同上

琥珀丸

治急慢驚風痰涎潮熱昏冒目眩內癆搐搦反張腹痛夜啼不安

萬金丸

治小兒臟冷腹痛夜啼手足作冷如神

又煎方

治小兒面赤心家有熱夜啼

蟬花散

治小兒夜啼不止如見鬼狀

雄麝散

治小兒客忤卒然心口刺痛腹大脹滿啼叫欲絕危急之致

至寶丹

治小兒大人卒中惡客忤諸癇急驚

惺惺散

治小兒變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

定驚神丹

治小兒急慢驚風

水鑑仙方

治百日内小兒寒熱吐乳諸藥不效此方如神

又治小兒吐乳方

初生小兒 目錄
又方治小兒先受熱後受暑發熱方

又治小兒赤遊丹方

又治小兒天泡瘡方

又治小兒膿耳紅腫耳底疼痛神方

又治小兒口內瘡方

又預解小兒稀痘方

又方同上

又方同上

以上諸方皆余常治小兒應驗神方

慈航集

三元普濟方

古欵王於聖纂著

京都史蘭圃叅訂

內經錦囊痢疾原論

痢者古名滯下、內經謂之腸澼、潔古云壯盛之人無積、虛人則有之、可見積由虛召、皆因脾胃既虛、飲食不節、七情不適、腸胃怫鬱、氣血壅滯、釀成膿血而爲滯下也、然卒成有五、積漸有七、有因飲食不調、脾胃驟傷者、有因受暑濕而發者、有因風寒相感而發者、有因吐瀉失調而成者、有因誤食毒物冷物與驚恐相乘而得者、此爲乍成五症、其七症者、有因食積日

久而成者有因氣虛夾寒而成者有因脾氣久傷不能統血而下血者有因濕熱傷脾而成者有因陽氣下陷積成脾敗而成者有因膏粱燻炙太過燥熱蘊積者有因疫氣時行穢毒相感者凡傷氣則白傷血則赤氣血俱傷赤白并出黃是食傷綠是傷濕然總因濕熱寒暑積滯而成者其虛實各有不同以痢之數有八曰冷曰熱曰疴曰驚曰寒熱不調曰休息曰瀉痢曰蟲毒其冷痢色白熱痢色赤疴痢黃白下無時度驚痢色青冷熱不調之痢赤白之色相兼休息痢糞黑而如魚腸愈而復作瀉痢肚大停積而又下

飲食不爲肌膚、氣臭而大便閉塞、蟲毒痢下黑色、其治之法、必審挾寒挾熱、或虛或實、實熱者、即可用實治、寒者當同虛論也、至如痢久發熱者、陰虛也、肛門痛甚者、濕熱流於下也、禁口痢者、因胃口熱甚、或疫氣穢毒積於臟腑、熱毒之上衝、則成禁口痢矣、治宜清心解毒、徹熱下行、如後重之症、由肺氣鬱於大腸、宜升提清氣、降其濁熱、血虛者補血、養陰皆兼潤下、而痢自止、經云養血和血、而痢自愈、調氣理氣、後重自除、衰老幼弱、元氣虛者、必須如此治法、如強壯食積重、而痢盛者、初痢之時、必須下之、不可遲也、過五

日之後則脾胃漸虛當用消導升提行氣和血病久
挾虛者當滋補氣血收澀固脫後重者仍宜下之腹
痛者宜和身重者除濕脉弦者兼散去風膿血稠粘
者以重劑竭之驚澇爲痢者宜溫之在外者散之在
裏者下之在上未成積者吐之在下已成痢者通之
表熱者內疏之小便澀者分利之盛者和之去者送
之至者止之此治痢之格言也

痢疾論

於聖識著

夫痢無壞症卽有壞症必臟腑久已內傷一病卽禁
口不食痢如腐爛魚腸屋漏此不治之症也如初病

久病能食者、再無一壞也、余常讀諸名人著述、議論精微、無處不到、其理無出其外矣、每閱治痢諸方、與論大相懸遠、有曰不可用苦寒、而方中又用黃連、黃柏、黃芩、有曰不可用辛熱、而方中備用丁香、肉桂、巴豆、乾薑、附子等藥、且又註明此丸能治諸痢、卽此一言、未分虛實、直誤至今、近時醫家、書並未富、只知此方能治諸痢、不問寒熱、槩而用之、如寒痢服熱藥者、賴以見功、胃積痢熱者、服之卽成禁口、如用苦寒者、熱痢服之、湊效、冷痢服之、寒戰腹痛、手指青黑、及至無救、尙在不知、徒空發嘆、又有好善者、見此方能治

諸痢可以多合施送救人其中所誤者亦不少也如果立心行善何不遵運氣之方寒熱又無偏勝救人更多矣凡痢瘧二症初病皆屬陽明胃與大腸積滯濕熱外受寒暑而成痢瘧要明表裏虛實不可執一之見痢有初起惡寒發燒頰象瘧症而又腹痛下痢人見瘧痢并行皆稱重候不知內停積滯外感風寒半表半裏之症治宜兩解如專一治之則多纏綿夫痢腹必痛有寒痛火痛虛痛實痛之分其寒痛者唇白面青手足作冷痢下白色脾氣虛弱體氣不壯之人積滯腸胃虛中挾實此爲寒痢腹痛也其火痛者