

女科精華

嚴鴻基題

午 31

93-2



南京中医药大学图书馆版权所有

女科精華

嚴鴻基題



南京中医药大学图书馆所有

医药大学图书馆版

中華書局



南京中医大學
南京中醫藥大學圖書館藏所有

序

吾國自軒岐以來醫籍浩如煙海而女科之書亦汗牛充棟處今日而欲研究國醫學非擇精守約不可東西醫籍日見輸入學者精神有限既欲注意於國醫學復欲參觀東西學幾有日不暇給之勢余輯女科精華即本精約二字之義先古聖法規猶欲導水必先窮源也次先哲粹言猶源既得然後溯其流也次中外名論廣見猶窮源溯流然後旁證曲引借觀自得也約之以三卷而女科經帶胎產之學備矣倘世有博學者見之以為此是糟粕此仍尤無不足當精約二字吾亦聽之而已

民國九年歲次庚申春月
慈谿嚴鴻志序於退思廬

退思廬女科精華目錄

卷上

古聖法規

素問

金匱婦人妊娠病脉證并治

金匱婦人產後病脉證并治

金匱婦人雜證脉證并治

內經方

金匱方

卷中

先哲粹言

論女科大意

論命門

論治婦科當悉衝任兩脉

論男女氣血運行之別

論神思間病難治

論經帶

論月經之本

論天癸崩帶各病由於奇經

論天癸為精血之源

論經行當慎將理



南京中医药大学图书馆藏

論調經之法

論因病致經不調

論經不調各有所因

論經水來原

論行經不常

論賦秉不齊經行異常

論天癸至當及時婚配

論停經不可漫治

論經水變化

論經色變動由於命火衰旺

論經愆期由於陰虛多火

論經閉由於病發心脾

論經閉與血隔血枯不同

論經脈壅遏由於痰氣

論經閉則生寒熱

論治血宜治氣

論氣血陰陽升降

論帶下三十六疾

論帶下五色因風邪入於胞門

論帶下屬濕熱冤結不散

論帶下有寒熱虛實之分

論淋帶淫濁

論帶下各家所主不同

論崩漏

論崩由妄治

論崩宜止截

論治崩不宜用溫熱峻補

論治崩漏之法



論血崩用藥

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論崩中五色俱下

論婦女有花無花之別

論求嗣之法

論成孕之道

論求嗣補養法

論受孕有內外入留之分

論不孕各有所因

論惡阻

論逐月養胎主氣

論半產

論安胎之法

論胎孕治法

論胎產宜慎藥

論漏胎之因

論半產漏下

論鬼胎

論暗產

論辨胎男女法

論胎前三大病源

論妊娠腫脹

論子死腹中藥宜慎用

論胎孕忌藥並歌括

論治胎產不可執一

論產後三病

論產後治法



論產後審症

論產後頭汗

論產後血暈

論產後浮腫并治法

論產後傷寒并治法

論病血分原由

論產後宜補

論治產後宜以生化湯加減

論癥瘕

論腸覃石瘕

論治奇經之藥

論經產兼證方法

論婦女易致虛勞

論婦科診法

卷下

中外名論廣見

陰陽水火氣血論

男女異同論

奇經八脉大旨

全體功用大略

中西營衛說

熱入精室論

熱入血室廣論

中西剖解血室考

中西剖解帶脉考

中西剖解三焦考



婦人病勞似孕受孕似勞辨

診治婦科心得說

求嗣論

調經以治氣為先說

全體新論摘要

婦科精蘊摘要



南京中医大學

南京中医药大学图书馆版权所有

退思廬女科精華卷上

慈谿嚴鴻志凝孫纂輯

男智鶴梅村校字

古聖法規

素問

上古天真論黃帝曰人年老而無子者材力盡耶將天數然也歧伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脈盛月事以時下故有子三七腎氣平均故真牙生而長極四七筋骨堅髮長極身體盛壯五七陽明脈衰面始焦髮始墮六七三陽脉衰於上面皆焦髮始白七七任脈虛太衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也

評熱病論月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

陰陽別論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息貢者死不治

腹中論有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩



時時前後血病名血枯。此得之年少時有所大脫血。若醉入房中氣竭肝傷。故月事哀少不來也。治之以四烏鰡骨一蕙茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯。飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也。

腹中論。帝曰。何以知懷子之且生也。歧伯曰。身有病而無邪脉也。平人氣象論。婦人手少陰脈動甚者。姪子也。

六元正紀大論。黃帝問曰。婦人重身毒之何如。歧伯曰。有故無殞亦無殞也。帝曰。願聞其故。何謂也。歧伯曰。大積大聚其可犯也。哀其大半而止。過者死。

奇病論。黃帝問曰。人有重身。九月而瘡。此何為也。歧伯曰。胞之絡脈絕也。帝曰。何以言之。歧伯曰。胞絡者繫於腎。少陰之脈貫腎繫舌本。故不能言。帝曰。治之奈何。歧伯曰。無治也。當十月復。

痿論。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。故本病曰。大經空虛。發為肌痺。傳為脈痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝使內也。

痿論。論言治痿者。獨取陽明何也。歧伯曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主

束骨而利機關也。衝脈者。經脉之海也。主滻灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街而陽明為之長。皆屬於帶脉而絡於督脈。故陽明虛則宗筋縱。帶脈不引。故足痿不用也。

離合真邪論。天地溫和則經水安靜。天寒地凍則經水凝泣。天暑地熱則經水沸溢。卒風暴起。則經水波湧而龍起。

玉機真藏論。風寒客於人。由脾傳腎。病名曰疝瘕。少腹冤熱而痛。面白。一名曰盢。難經

十九難曰。脉有順逆。男女有恒而反者。何謂也。然男子生於寅。寅為木。陽也。女子生於申。申為金。陰也。故男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。是其常也。反者男得女脉。女得男脉也。

二十八難曰。其奇經八脉者。既不拘於十二經。皆何起何經也。然督脈者。起於下極之俞。並於脊裏之上。至風府入屬於腦。任脈者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏。上闕元。至咽喉間。上頤循面。入目絡舌。衝脈者。起於氣街。並足陽明之經。夾脣上行。至胸中而散。帶脈者。起於季脇。迴身一周。陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行。入風也。

陰蹻脈者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈陽維陰維者維絡於身溢蓄不能環流灌溢諸經者也故陽維起於諸陽會陰維起於諸陰交也

二十九難曰奇經之為病何若然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能自相維則悵然失志溶溶不能自收持陰蹻為病陽緩而陰急陽蹻為病陰緩而陽急衝之為病逆氣而裏急督之為病脊強而厥任之為病其內若結男子七疝女子瘕癥帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛此奇經八脉之為病也

金匱婦人妊娠病脉證并治

師曰婦人得平脉陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥痼害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

婦人懷妊六七月脉弦發寒熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開

故也當以附子湯溫其藏

痛為胞阻膠艾湯主之

婦人懷娠腹中疔痛當歸芍藥散主之

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之

妊娠小便難飲食如常當歸月母苦參丸主之

妊娠有水氣身重小便不利灑淅惡寒起即頭眩禁子後芩散主之

婦人妊娠宜常服當歸散主之

妊娠養胎白朮散、王之

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不晨此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

金匱婦人產後病脉證并治

問曰。新產婦人有三病。一者病瘡。二者病鬱冒。三者病大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病瘡。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。

產婦鬱冒。其脉微弱不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜出汗者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。病解能食七八日。更發熱者。此為胃實。大承氣湯主之。

產婦腹中疔痛。當歸生姜羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。產後腹痛煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散主之。假令不愈者。此為腹中有乾血。著脣不宣。下瘀血湯主之。亦主經水不利。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。熱在裏。結在膀胱。不大便。煩躁發熱。切脉微實。再倍發熱。日晡時。煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。產後風續之。數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱心下悶。乾嘔汗出。雖久。陽旦證續在者。可與陽旦湯。

產後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。
婦人乳中虛煩亂嘔逆。安中益氣竹皮大丸主之。

產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

金匱婦人雜證脉證并治

婦人之病。因虛積冷積氣為諸經水斷絕。至有歷年血寒積結胞門。寒傷經絡凝堅。在上。嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結。繞脣寒症。或兩脇疼痛。與寒相連。或結熱中。痛在關元。脈數無瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不匀。令陰掣痛。少腹惡寒。或引腰脊下根。氣街急痛。膝脛痛煩。奄忽眩冒。狀如厥癲。或有憂懼悲傷。多嗔。非有鬼神。此皆帶下。久則羸瘦。脉虛多寒。三十六病。千變萬端。審脈陰陽。虛實緊緩。行其鍼藥。治危得安。其雖同病。脉各異源。子當辨記。勿謂不然。

婦人咽中如有炙鸞。半夏厚樸湯主之。

婦人藏燥。喜悲傷欲哭。象如神靈所作。數久伸。甘麥大棗湯主之。

婦人吐涎沫。醫反下之心。下即痞。當先治其吐涎沫。小青龍湯主之。涎沫止。乃治痞瀉心湯主之。

問曰。婦人年五十。所病下血。數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口

口乾燥故知之當以溫經湯主之。

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散主之。

寸口脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之。

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之。

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此為水與血俱結在血室也大黃甘

遂湯主之。

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈。

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼和胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之。

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濁然汗出即愈。

婦人經水不利下抵當湯主之。