

周氏醫學鼓書



脈義簡摩卷一

皖南建德周學海潛初甫撰輯

婦科診畧

婦人常脈

凡婦人脈常欲濡弱於丈夫也。千金翼方

脈之大小緩急。根於性氣者也。女脈弦長多悍。洪滑多淫。右尺洪數。與左寸相應。或左關長出寸口。氣來上擊者。恆主多欲未遂。大率女子體靜。氣陰。脈宜畧沈而靜。其形柔軟。爲佳。若有一部獨乖。本於稟賦者。卽非美質。脈如曰。乍浮乍沈。乍遲乍疾。稍兼虛散而數者。問無別證。卽與人期約私會也。是未必然。

男子脈在關上。女子脈在關下。故男子尺脈恆弱。女子尺脈恆盛。是其常也。反者。男得女脈爲不足。病在內。女得男脈爲有餘。病在四肢。左得之病在左。右得之病在右。隨脈言之。此之謂也。難經十九

魂魄穀神。皆見寸口。左主司官。右主司府。左大順男。右大順女。脈經

經曰。左右者陰陽之道路也。左爲陽。右爲陰。男脈左大。女脈右大。夫復何疑。然他書多言左主血。右主氣。女血盛。故左大。男氣盛。故右大者。何也。蓋男右女左者。以血氣之本體言之。卽以脈之形狀言之也。男左女右者。以陰陽之升降言之。卽以脈之來去言之也。

故脈經專取寸口言之。來去之盛衰最顯於寸部也。他書蓋取尺中言之。形體之虛實最重於尺部也。丹溪於脈經不得其解。以醫者之左右手釋之。豈非離遁之詞耶。又有以妊娠之男女言者。於本文上下亦乖。

張石頑曰。古人雖有女子右脈常盛。及女脈在關下之說。要非定論。何夢瑤曰。古謂女脈左大於右。驗之不然。蓋人右手比左手畧大。故脈亦應之而右大於左也。按右大於左者。因人右手常勞於左。故其氣強於左也。卽女尺恆盛。亦不過尺寸平等。不似男脈尺弱於寸耳。非能更盛於寸也。

不調。王月則閉。男子失精。尿有餘瀝。刺足少陰經。治陰。

右手關後尺中陽絕者。無子。戶脈也。苦足逆寒。絕產。帶。

下。無子。陰中寒。刺足少陰經。治陰。

王月。膀胱寒水。王月。是仲冬也。

左手關上脈陰虛者。足厥陰經也。病苦脇下堅。寒熱。腹。

滿。不欲飲食。腹脹。悒悒不樂。婦人月經不利。腰腹痛。

從寸口邪入上者。名曰解脈來至。狀如琴絃。苦少腹痛。

女子經月不利。孔竅生瘡。男子病痔。左右脇下有瘡。

經脈

有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。

先唾血。四肢清。目眩。時時前後血。病名爲何。何以得之。

岐伯曰。病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入。

房。中氣竭。肝傷。故月事衰少不來也。治之奈何。曰。以四。



烏鰂骨。一蘆茹。二物并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五

丸爲後飯。飲以鮑魚汁。利傷中。

腸一作中

及傷肝也。

素問腹中論

此與下節病證畧同而更重。下爲墜墮而畜血。屬於實。故肝脈浮沈皆急。此爲大脫血。屬於虛。觀於中氣竭。肝傷。是損及血分。肝脈虛散。可知也。男女破身太早。有患此者。

肝脈沈之而急。浮之亦然。苦脇下痛。有氣支滿。引少腹而痛。時小便難。苦目眩。頭痛。腰背痛。足逆寒。時癢。女子月信不來。時無時有。得之少時有所墜墮。

脾脈沈之而濡。浮之而虛。苦腹脹煩滿。胃中有熱。不嗜食。食而不化。大便難。四肢苦痺。時不仁。得之房內。月使

不來。來而頻併。脈經

來而頻併。無定期也。脾主信。脾虛故爾。

婦人脈寸關調如故。而尺脈絕不至者。月經不利。當患少腹引腰絞痛。氣積聚。上又胸脇也。巢氏

統觀諸文。凡月事不調。未有不胸脇支滿腰腹脹痛。目眩頭痛者。大槪實者多痛。虛者多脹也。

已上諸文。率推原月使不調之因。竊嘗深維其義。病之處所。在於肝腎。病之根原。在於心脾。而旋轉之樞紐。則全在肺也。繆仲醇謂白微爲調經聖藥。白微清降肺氣者也。氣逆降而降之。氣陷宣而降之。血實決而降之。血虛補而降之。血寒溫而降之。血熱清而降之。

之。未。有。肺。氣。調。而。只。使。不。調。者。也。未。有。肺。氣。不。調。而。月。使。調。者。也。昔。人。或。注。意。腎。或。注。意。脾。雖。皆。屬。喫。緊。而。不。理。肺。氣。仍。是。無。效。肺。氣。不。調。半。由。肝。熱。半。由。脾。淫。也。

脈微而瀉。血氣俱虛。年少者。亡血也。乳子下利。爲可不者。此爲居經。三月一來。脈經下併同

寸口脈。衛浮而大。榮反而弱。浮大則氣強。反弱則少血。孤陽獨呼。陰不能吸。二氣不停。不停也衛降。榮竭。陰爲積。

寒。陽爲聚。熱。陽盛不潤。經絡不足。陰虛。陽往。故令少血。時發洒淅。咽燥汗出。或溲稠數。多唾涎沫。此令重虛。津液漏洩。故知非軀畜煩滿泄。月稟一經。三月一來。陰盛。



則瀉名曰居經。畜煩二字未曉

寸口脈微而澹。微則衛氣不足。澹則血氣無餘。衛不足其息短。其形燥。血不足其形逆。營衛俱虛。言語謬誤。跌陽脈微而澹。微則胃氣虛。虛則短氣。咽燥而口苦。胃熱澹則失液。少陰脈微而遲。微則無精。遲則陰中寒。澹則血不行。此爲居經。三月一來。

婦人經一月再來者。經來其脈欲自如常。而反微不利。不汗出者。其經二月必來。謂必閒月至第二月始能來也。

醫存曰。婦人脈爽如常。雖經水或前或後。或多或少。或一月未來。皆不成經病。又曰。婦人有兩月而經一行者。有三月而一行者。有一生不行經者。皆由稟賦。

無妨生育。又有懷孕後逐月行經者。亦稟賦然也。夫兩三月而經一行。及一生不行經者。凡病不宜過涼。其血及破其血。孕後逐月行經者。凡病皆宜清血熱。兼固中氣。又有倒行經者。每月依期鼻衄。而不下行。多由血熱而下。有寒溼也。多行者。肝不攝。脾不舉也。逆行者。腎不納。肺不降也。婦人來脈。反得微瀼。法當吐若下利。而言不。因言夫人年幾何。夫人年七七四十九。經水當斷。反至今不止。以故致此虛也。

婦人來診。言經少不如前者。何也。曰。曾更下利。若汗出。小便利者可。何以故。曰。亡其津液。故令經少。設經下反多於前者。當所困苦。當言恐大便難。身無復汗也。

脈浮。汗出者。必閉。

寓意草曰。楊季登長女及笄。經閉踰年。發熱。食少。肌削。多汗。嘉言診之曰。此證可療。處全在。有汗。汗亦血也。設無汗而血不流。則皮毛槁死矣。宜用極苦藥。斂血入內。下通衝脈。於是以龍薈丸。兩月而經水大至。諸證全瘳。次女亦病。多汗。食減。肌削。診時手閒筋掣。肉顫。始以爲大驚大虛之候。治以溫補。畧無增減。繼見面色時赤時黃。無定。知有邪祟。附入藏府。於是以犀角。羚羊角。龍齒。虎威骨。牡蠣粉。鹿角霜。人參。黃芪。合末。以羊肉半斤。煎濃汁。調末。一次盡服之。竟愈。

婦人常嘔吐而胃反。若常喘。

一作多唾

其經必斷。設來者。必

少。

婦人血下。咽乾而不渴。其經必斷。此榮不足。本有微寒。故不引飲。渴而引飲者。津液得通。榮衛自和。其經復下。

右並出

脈經

肝心脈弦緊而疾。肺脈浮而大。尺澤鬱鬱不散。月候不通。大府秘熱。兩足痛不能行。肌肉消瘦。漸如馬藍節。

六脈弦緊而長。心脈洪大而實。尺脈結。月經不通。時常淤怒。不得安處。淤怒即鬱怒也忽忽似顛狂。夜不睡。小便赤。大

府如常。或下鴨塘。

肝脈虛弦而長。按之無骨力。心脈動而疾。肝邪傳心。日夜煩躁。或如顛狂。不得眠睡。肝主疏泄。肝邪傳心。疏泄太過。故見諸證。

六脈大而沈。肝脈橫。肺脈浮。主婦人血熱。血候行少。背上非時有一片發熱。口無津液。或兩三月一次。或半年不行。或止些小黑血。

六脈沈而洪大。重手取之。其深至骨。隱隱然。應指有骨力。來疾去遲。至數與常人無異。但胃脈亦洪大。上隔有伏涎。此爲血澀。生積。當經候不快。或不行。腰痺。口乾而渴。背逆。脹眼睛逆。兩臂重。缺盆逆。大府祕。心憎。煩夜不得眠。

六脈疾大虛急者。大爲風。浮血溢。急爲尺澤有寒。或因經候行時。或因產後。喫生冷不相當之物。或產後早起傷風。血氣俱病。臨經行時。忽先氣痛。或小腹急痛。



心脈芤。肝脈虛。尺澤微細。血海虛損。經候過多。或成片流下。不可禁止。

六脈皆沈。肝脈弱而虛。尺澤細細如縷。又帶澀而遲。肝腎多感寒。伏在子宮。血海虛損。經候過多。小便白濁如米泔。少陰腎脈貫脊而行。背上忽有一片寒冷。口中卽吐清水。

六脈疾大而浮。腎脈急而浮。心脈差洪。血風頭痛。口乾吐痰。痰當作沫

六脈弦大。肝心脈澀而短。尺脈急沈而搏。緣使性多痰怒。傷損肝心正氣。因而積涎。怒則氣逆。涎隨氣上。其狀聞得心前昏悶。潰亂不快。聞猶覺也遂有一塊之物。上觸到

咽喉。卽手足俱冷。口禁不開。不省人事。

卽所謂中氣也。

六脈弦大而疾。尺脈亦弦而動。泛泛不絕。經候過多。七八日不止。皆下鮮血。此非虛。不可補。止可涼。風血緣風盛。血散然。久而不止。卽肝氣脫血。右並出史載之。

婦人月經不利。脈絕小。實者生。浮虛者死。

凡血熱者。經多先期而至。然須察其虛實。不可以假火作真火也。若形證無火而經早者。乃心脾氣虛。不能固攝而然。若一月二三至而無定期者。此氣血敗亂之證。當隨其寒熱而調治。

凡血寒者。多後期而至。然常有陰火內爍。血本熱而亦過期者。此水虧血少。燥澀而然。治宜清火滋陰。

又有以血質之濃淡分寒熱者。較以先期後期分者。畧爲有準。大抵血濃却勻淨。不成衃。色鮮妍。臨期無腰痛腹痛諸證者。氣血俱調之婦也。若下過多者。血熱也。血濃成衃。帶紫色。下多者。此血實氣虛也。氣不健運。故血多而成衃也。成衃帶紫黑色。下少者。此血熱氣寒也。因寒束於外。熱鬱於內。血不得行。爲熱煎熬。故成衃帶黑。又下少也。色深黑成衃而下少者。血敗氣虛也。色畧淡而下多。不成衃者。有水氣也。若下過少者。血虛也。色淡中帶黑。衃下少者。氣血俱寒也。色極淡如屋漏水者。虛寒之極也。故以多少定虛實。以濃淡定寒熱。往往可信。

凡經有不調而證見不足者皆不可妄行剋削及寒涼等劑再傷脾腎以伐生氣。

經行腹痛證有虛實實者或因寒滯或因血滯或因氣滯或因熱滯虛者有因血虛有因氣虛然實痛者多痛於未行之前經通而痛自減虛痛者多痛於既行之後血去而痛未止或痛益甚大都可按可揉者爲虛亦爲熱

拒按拒揉者爲實亦爲寒有滯無滯於此可察但實中有

虛虛中有實全虛全實不多見也當於形氣稟質兼而辨之右並出景岳

有初按快久按不快輕按快重按不快者卽虛實兼證也難經曰內痛外快爲內實外虛外痛內快爲外