

周氏醫學鼓書



脈因證治卷三目錄

元丹溪朱震亨著

三十八乳癰

三十九瘰

四十發癰

四十一丹疹

四十二金瘡

四十三傾仆

四十四百藥中傷

四十五癲狂

附癰

四十六驚悸

四十七疝癰

四十八腳氣

四十九蟲

附狐惑

五十喉痺

五十一口

五十二舌

五十三目

五十四耳

五十五鼻

五十六齒

五十七結燥

五十八痔漏

五十九婦人產胎

六十滯下

六十一經候

六十二崩漏

六十三小兒證

六十四雜證

六十五雜治

六十六五臟證

六十七七情證

六十八雜脈

六十九察視

七十汗

脈因證治卷四

元丹溪朱震亨著

三十八乳癰

證乳房爲陽明所經乳頭爲厥陰所屬

因厚味濕熱之痰停蓄臍間與滯乳相搏而成

滯乳因兒口氣吹噓而成 有怒氣激其滯乳而成

凡病皆陽明經也淺者爲癰深者爲岩不治

治宜疏厥陰之滯清陽明之熱行汗血散腫結

方

煨石膏

清陽明

橘皮

瓜蒌子

消腫

甘草節

行血

蜂房

台芎

香附

二味鬱氣加之

青皮

疎厥陰

葛根

酒姜汁飲

又方

大黃

天花粉

歸一兩

甘草節

已下一錢五分

瓜蒌子

穿山甲

陳壁土炒

酒丸服

三十九瘰

因大抵食味之過鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此三端變化引換須分虛實實者易治虛者可慮夫初發於少陽一經不守禁戒延及陽明蓋膽經至主決斷有相火而且氣多血少

神効方

牡蠣粉五錢和雞胆爲膏貼之

又用活石

一兩肉桂五錢調湯服之好

證外有蝦蟆瘰無核但腫

瘰在陽明少陽經結核按

之走痛

瘰或隱僻處

勞瘵結核連數箇在耳邊

或聚或散也 癰等亦同

治宜瀉火散結虛則補元氣實則瀉陰火補則十全散

下則玉燭散化堅湯

升麻 一錢 葛 五分 漏蘆 足陽明 牡丹皮 三錢去

歸 地黃 生熟各 連翹 一錢生 芪 錢護

芍 收散 桂 散結寒因 柴 入錢 黍粘 消腫

羌活 一錢 防風 獨活 各五分 昆布 軟堅

三稜 筋堅 廣朮 參 樸 腹脹加

連 陳皮 木香 氣不順 大黃 便秘加

大黃湯 大黃 煨 皂角 甘草 炙

煎服以麝香瓜蒌仁傳之

法未破核者用火針針其上卽用追毒膏點芋綫頭內針孔中

又用杜牛膝搗傳縛其上一日一易如膿將盡又用生玄參地榆滑石寒水石大黃等末傳縛其瘡又用白厄菜墨草同縛其瘡以寒水石大黃硝龍骨木香檳榔末收口後又用竹茹亦能長肉白膏藥收後紅不退用北蠟螬窠傳如已潰久不收口須用香附燈燒鐵鉗烙其腐處盡後依前治之

治耳接耳邊項上生塊核是

方 五倍子 香白芷 爲末蜜調傳

獾鼠糞以黃泥煨燬

去瘰癧毒

皂角子

五兩

大黑豆

一斤

甘草

一兩

冬青葉汁

一斤

右煮汁乾爲度常食不過二料

四十發癰

因治屬表者因風挾熱痰通經微汗之下之不可

屬裏者因胃熱助手少陰心火入於手太陰肺也故
紅點如斑生於皮毛之間耳白虎瀉心調胃承氣從
長而用之

四十一丹疹

因熱與痰血熱也

夫斑痘疹丹皆惡毒血熱蘊蓄於

命門遇相火合起則發也

外有赤遊風天蛇漠丹疹癰斑其狀不同因則一也
治張歸之少陽相火 如遇熱之時以通經辛涼解之
如在寒之時以葛根升麻辛溫解之 如遇瘡癰
黑陷腹內喘滿者熱而氣虛也急以白虎解之 熱
加參參主喘也主之全以涼膈調之

消毒湯

升麻根

羌活

藁本

細辛

柴胡

葛根

芩

酒炒

生地黃

連

藥

翹

紅花

歸

蘇木

白朮

蒼朮

陳皮

吳茱萸

防風

甘草

又方

紫草

紅花子

芍

胡荽

歸

附方 剪刀草汁調厚蚕沙傳之

龍腦丸 治斑瘡倒靨

猪心血調腦子成膏以紫茸湯化無腦用辰砂

四十二金瘡

附油火刀犬等傷

脉金瘡出血太多脉沉細者生浮數實大者死

治沒藥散 治刀箭傷止血住痛

定粉

風化灰

各一兩

枯白礬

三錢

乳香

五分另研

沒藥一字即二分半也一銅錢有四字之故另研和勻糝之

聖愈湯 治出血太多

四物湯 參 芪 煎服

金瘡刀傷見血方 降真香末細貼之 石灰和人血

作餅旋乾貼之 煨大黃石膏細研桐油二分水一

分拌抹上 又淹灰搽傅亦良

救苦散 治熱油刀斧傷火傷犬咬傷

寒水石油調塗上

四十三傾仆

脉傾仆內有血腹脹滿脉堅强者生小弱者死

證瘀血爲病或痰涎發於上

治同中風證惡血歸內留於肝經脇痛自汗治宜破血

行經

張論墜墮使生心恙痰涎發於上也治宜補之

凡杖打閃肭疼痛皆血滯證可下之忍痛則傷血

神應散 治瘀血大便不通

大黃

酒浸一兩

桃仁

紅花

二錢

歸

三錢

瓜蒌根

二錢

炮穿山甲

二錢

柴胡

引經

麝

透

熱酒下

紫金丹 治骨節折傷疼痛

炮川烏

炮草烏

各一兩

五靈

五錢

木鱉子

去殼

黑牽牛

各五錢

威靈仙

金毛狗脊

骨碎補

沒藥

麝香

紅娘子

各二錢五分

地龍

烏藥

青皮

陳皮

茴香 各五分

防風

自然銅

燒淬四兩

禹餘糧

滓四兩

酢糊丸梧子大每十丸酒下

三聖散吐之 治痰壅

四十四百藥中傷

脉浮澁而疾者生 微細者死 洪大而遲者亦生

治法在上吐之

解毒丸 治食毒物救人於必死

乾板藍根

四貫衆去土一兩

青黛

甘草

蜜丸青黛夏

秘傳方

續隨子

甘草

五味子

茶清下一二碗

四十五癲狂 附癰

脉大堅疾者癲病 脉大滑者自己 脉小急實者死

循衣縫者死 虛而弦急者死 脉虛弦爲驚

脉沉數爲痰熱

因痰火驚 血氣者身之神也神既衰乏邪因而入夫
血氣俱虛痰客中焦妨礙不得運用以致十二官各
失其職神聽言動皆有虛妄宜吐之而安

肺入火爲譫語肺主諸氣爲氣所鼓舞火傳於肺爲
之尋衣撮空胃中大實熱薰于心肺亦能譫語宜降
火之藥

驚其神血不得寧也積痰鬱熱隨動而迷亂心神無

主有似邪鬼可先吐之後以安神丸主之佐以平肝之藥膽主驚故也

證狂言譫語鄭聲辨

狂者開目與人語語所未嘗見之事爲狂也 譫語者合目自言日用常行之事爲譫也 鄭聲者身動無力不相接續造語出於喉中爲鄭聲也 又蓄血證則重復語之

治痰者吐之 三聖散 火者下之 承氣湯

驚者平之安神丸

方總治 連 辰砂二味降火 瓜蒌 星

半夏三味行痰 青黛 柴胡 川芎三味平肝