

經方應用二



經方應用

泰州武國良簡侯編纂

麻黃湯類

頭痛惡風發熱無汗身痛而喘者傷寒論主用

麻黃湯

金匱去還魂湯

桂枝千金方以桂枝易桂皆名

麻黃

杏仁

各一。

桂枝

七。

甘草

五。

以水三合煎一合去滓一日分三回溫服服後

覆取微似汗（通常不溫覆取汗）

証狀表現

原書所載麻黃湯証有多條今為

省畧歸納如下發熱無汗頭痛身疼或腰痛骨節痛

經方應用

卷五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

惡風脈浮緊或浮數喘而胸滿

李時珍云時兼面赤佛鬱欬嗽痰喘之証

立方意義 本方証由表邪遏伏於分肉之間所致為用麻黃開洩腠理桂枝溫通經絡合力以驅逐風寒使從汗腺排出更用杏仁利氣散結與麻黃合作則增強平喘之功甘草主治急迫兼有鎮欬緩痛之能其主要意旨重在逐表邪而以杏草治表邪所生之症也用是以治風寒而來之咳喘身熱胸滿身疼諸証其有不消除者哉

治療標的 據皇漢醫學要訣此方以脈浮緊

而無汗身熱惡寒頭痛身體痛有喘鳴之候者為目
標極是可從之

諸家經驗談

中國內科醫鑑乳兒犯風邪起

鼻加答兒苦於鼻閉時本方與之有神效

方輿輓

余常值小兒之發熱昏沉者發其汗

十無一誤

柯韻伯

予治冷風哮與風寒濕三氣成痹等

證用此方輒效

張錫純

服此湯後間有汗出不解者非因汗

出未透實因餘熱未清也佐以知母於發表之中兼

發

厲清熱之意自無汗後不解之虞此乃屢經試而確知其然非敢於經方輕為加減也

方技雜誌 哮喘痰潮聲音不出抬肩滾肚而不得卧惡寒熱冷汗如油者合生姜半夏湯用之則立效

女科要訣 舒詔治一產婦發動六日兒已出胞頭已向下滑用催生方又用催生符神靈爐丹俱無效延余視之其身壯熱無汗頭頸腰背強痛作一大劑麻黃湯投之令溫服少頃得汗熱退乃索食食訖豁然而生

皇漢醫學要訣 本方加薏苡仁蒼朮應用於

急性痿麻質斯有奇驗

眼科錦囊 麻黃湯治為風熱所侵而眼目赤

腫生障翳者

諸家緒論 外臺秘要深師療久上氣麻黃湯

改為散於氣上發時服之有效 又 肘后用治中

惡短氣欲絕並通療諸昏客忤良分服含嚥 又

深師於本方去杏仁易大棗治新久欬嗽吐膿血連

年不差晝夜肩息等 又 於本方加生姜治上氣

咳嗽喉中水鷄鳴吐膿血腥臭

聖惠方 於本方加大黃芍藥名解肌散治小兒傷寒發熱四肢煩痛

和劑局方 本方去桂三味生用加生姜名三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重四肢拘攣欬嗽多痰胸滿氣喘等証其他有將桂枝易桑白皮名杏甘湯治煩喘躁渴更有以石膏易桂加脂茶亦名麻黃湯治煩喘躁渴者

皇漢醫學要訣 此方應用於熱性初期及小兒肺炎等之機會甚多

東園醫訓 麻黃湯証喘而不惡寒發熱身疼

疼

痛若發熱惡寒而身痛者大青龍湯証也

李時珍 麻黃湯雖為太陽發汗劑實為發散肺經火鬱之藥也

憑証使用

感冒性氣管支炎肺炎喘急麻疹

腸傷寒風濕性關節痛百日咳斑疹傷寒瘡癰內攻鼻感冒乳兒鼻孔閉塞及其他熱性病之初期等具麻黃湯証而小便不利者加朮金匱名

麻黃加朮湯

麻黃 杏仁各九。

桂枝六。甘草三。朮十二。

煎法用法同麻黃湯

証狀表現 原文溼家身煩疼可與麻黃加水
湯發其汗為宜慎不可以火攻之

補充 有無汗發熱惡寒或浮腫小便不利之

証（引葉橘泉氏說）

立方意義 上方証由水濕停滯外不達於肌

表內不通於水道故加白朮以健運脾胃脾胃健運
則水濕通行矣况朮得麻黃可以行表裏之濕麻黃
得朮又可不至多汗（引喻嘉言說）且有桂枝宣達血
氣杏仁下氣散結甘草緩咳祛痰於是濕之在肌表
者可從汗而出在脾胃等處者可從小便而出凝結

在胸上已成為疾者可從疾而出然大抵可從而解矣

治療標的 葉橘泉氏以身體煩疼無汗惡寒發熱或浮腫小便不利為標的極是可從之

諸家經驗談 類聚方廣義山行冒瘴霧或入窟穴中或於麴室浴室諸濕氣鬱悶處暈倒氣絕者可連服大劑麻黃加朮湯即蘇

葉橘泉 膏治浮腫型脚氣惡寒發熱無汗而喘小便不利脈沈實者以小方合鷄鳴散（檳榔橘紅木瓜吳子蘇葉桔梗生姜）每服輒效



湯本求真醫談 痛風病狀急激變化有一種
不堪名狀之疼痛而影響於起居動作者以麻黃湯
為良

諸家緒論 三因方麻黃白朮湯(即本方)治寒
濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

類聚方 治麻黃湯証一身浮腫小便不利者
隨証加附子

憑証使用 急性關節僵麻質斯妊娠腎臟炎
浮腫流感性急性腎炎喘咳浮腫浮腫型腳氣(古方
臨床之運用)



麻黃湯証汗出而喘有大熱者去桂枝加石膏傷寒
論名

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃九分 杏仁 甘草各五。石膏二。一。一。〇。〇。〇。

以水二合五勺煎一合去滓一日分三回溫服
証狀表現 原文發汗後不可更行桂枝湯汗
出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

補充 節傷寒論方解說欬嗽不惡寒但發熱

甚至鼻煽有汗時熱較低無汗時熱較高煩躁渴飲
或喉中有痰聲或胸痛或面目現浮腫脈浮滑而數

或浮大而數極合於當然的理想証狀

立方意義

此方以麻黃湯內桂枝易石膏亦

即越婢湯加杏仁去生姜之方與越婢湯相類似本証因肺中有鬱熱故去桂枝加石膏之清涼味薄者以泄肺熱合麻黃以引熱外出而除煩喘尚嫌潤燥利氣之力不足則加入杏仁麻黃與杏仁配合則平喘鎮欬之作用更强再以滋潤和中緩急之甘草尤有助於祛痰緩欬和痛解熱之功

治療標的

皇漢醫學要訣以有喘鳴急迫之

候渴而欲飲水者為目的

佐

編者按 應以身熱煩渴欬喘急迫為主標的較為完備

諸家經驗談 傷寒論今釋白喉初起時惡寒

發熱煩渴氣喘咽喉腫痛有蒼白之假膜用麻杏甘石湯輕者數小時重者一晝夜熱退身和腫痛悉去

皇漢醫葯全書 有病而喘息之人感邪氣而

發者服此有良效喘咳急者面目多浮腫亦為本方所主治本方與小青龍湯合方治欬嗽有奇效

古方臨床之運用 橘泉常用本方治小兒百

日欬之痙攣性劇欬或嘔吐或欬血無論有熱無熱

每獲頓挫之效且欬血者往往血即止瘕欬亦顯著
緩解也

張氏醫通

冬月欬嗽寒痰結於咽喉語聲不

出此寒氣客於會厭乃卒然而瘖也用麻杏石甘湯

漢法醫典

白喉初期用麻杏石甘湯加蘇子

桑白皮

華岡氏

喘息劇者於麻杏石甘湯或麥門冬

湯加沒食子有效

諸家緒論

陸淵雷本方主証為煩渴喘咳凡

支氣管炎支氣管喘息百日欬白喉等而有煩渴喘

欬之証者悉主之

傷寒大白 麻黃與石膏同用化辛溫為辛涼
麻黃同石膏不惟散表兼能清肺定喘石膏得麻黃
杏仁不惟清肺兼能散表

漢方治療各論 麻杏甘石湯喘欬初起用之
屢奏卓捷之功又加答兒性肺炎有發熱及輕度之
欬嗽呼吸困難等証小青龍湯或合麻杏石甘湯

三因方 惺惺散(即本方去杏仁加茶蘼煎服)
治傷寒發熱頭疼腦痛

仁齋直指附遺

五虎湯(即本方加細茶治喘

痰氣回春五虎湯(即本方加桑白皮)治咳嗽漢方治
療各論云本方特別有效於小兒

按 此方近有用治急性肺炎者謂為最適應
最妥善之方劑惟石膏始終宜少用以本方加茯苓
即與茯苓杏仁甘草湯合方

憑証使用 支氣管喘息支氣管炎百日效小
兒感冒溫瘧(成方切用)溫病初期(張錫純)肺炎白喉
初期亦有用於痔核及掌丸炎者
麻杏甘石湯証不煩渴而有水氣與各關節疼痛而
有麻痺感者去石膏加薏苡仁金匱名