

R2-51  
7

光緒三年新鐫

湯頭歌括

興發堂藏板

序

本草備要湯頭歌括註釋理法全宗古人體裁而字箋奇  
釋較勝羣書之詳明醫疾療病概兼百家之論辨但萬全  
中缺其二二今添地黃補心解肌四磨諸湯編輯歌括註  
釋共刊百首名曰湯頭讀考務須湯頭註釋同讀之不然  
書不求甚解恐不免面牆立

六



補益之劑

四君子湯中和義參朮茯苓甘草比益以夏陳者為

痰補氣陽虛餌一陳除痰四君補氣脾弱場虛宜之除生夏名異

加香砂胃寒使

六味補腎山茱萸山藥茯苓粉丹皮熟地黃兼宜澤瀉腎

虛腰痛最相宜

熟地滋陰補腎山茱萸溫肝逐風牡丹瀉君相之伏火山藥清虛熱於脾茯苓滲脾中濕熱而通腎交心澤瀉瀉勝水邪而聰耳明目

天王補心地三參茯苓志棗柏仁親二冬歸味蜜九子蔓

思過度健忘神



生地玄參所以補火丹參當歸補心所以生血人參茯苓以益氣天冬麥而渴火五味餘氣補便利膈遠志和仁柏仁所以養心神而有益也

小建湯中芍藥多桂姜甘草大棗和更加飴糖補中藏虛

勞腹痛服之瘥增人黃者名亦爾金匱若除飴糖則名黃者五枚湯不各建

中矣今人用建中湯者絕不用飴糖何哉表虛身痛效無過又有建中十四

味陰斑勞損起沉疴亦有陰虛者淡紅隱隱散見

蕞肺而然若服寒藥立斃十全大補加附子麥夏菴蓉仔細哦

### 發表之劑

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭頂痛身

寒服此汗淋漓

麻黃善發汗其力猛故以桂枝之甘和之使不食  
太發也

桂枝湯治太陽風為藥甘草姜棗同桂麻相合各各半大

陽如瘧此為功

熱多寒少如瘧狀者宜之

大青龍湯桂麻黃杏草石膏姜棗藏太陽無汗兼煩燥風

寒兩解此為良

麻黃湯治寒桂枝湯治風大青龍兼風寒而兩解之

升麻葛根湯錢氏再加芍藥甘草是故用升葛發散陽明

表邪陽邪盛則陰氣虛故加芍藥欬陰和血升麻甘草  
升陽解毒故亦治詰

陽明發熱與頭疼無汗惡寒均堪倚亦治時疫與陽

身重次三集

痘疹已出慎勿使

解肌湯用柴葛根羌活白芷黃芩白芍桔梗生甘草麻

洪身熱口渴

羌活散太陽之邪芷葛散陽明之邪柴胡散少陽之邪  
寒將為熱故以黃芩石膏清之以芍藥甘草和之

九味羌活湯防風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草三

陽解表益姜葱陰虛氣弱人禁用加減臨時在變通

潔古製此湯以代麻黃桂枝青龍各半等湯用羌防蒼  
細辛芷各走一經祛風散寒為諸路之應兵加黃芩生  
地赤芍土可謂施用時宜審

加麻黃赤芍兼香附味



行感冒效堪

高麻升萬蘇芷香用辛香劑

陰氣放發汗之中如甘草者

日此方用升麻乾葛能解湯

發熱用之則引邪入陽明傳

麻黃閉子細辛湯發表溫

為腎經之表藥屬其間若非表裏相兼

沈屬子當無熱今反發執為太陽表症未除

人參敗毒茯苓草枳桔柴前羌

行感冒有新功羌活理太陽能去濕除痛

前胡行挾降氣甘桔參茯苓清言曰暑濕熱三氣門中惟此

曾與他方去參名為敗毒散

病發表散寒加芍藥者歛

和陽氣鍊利之劑也吳綬

明溫疫用氣若太陽傷寒

發發既矣慎之

法多麻黃發太陽之汗附

治少陰反熱葛能康流脉

獨芎薄荷少許姜三片時

遊風獨活少陰伏風兼

用芎柴胡和血升清模殼肺強胃輔正匡邪也喻嘉

加入消風治亦同

再造散用參耆甘桂附羌防蒿芍耒細辛加裏煨姜煮陽

虛無汗法當諳

以參耆甘姜桂附大補其陽助羌助蒿細散寒發表  
芍藥者于陽中斂陰散中有取也陶管蒼白死熱頭症  
惡寒無汗服汗劑汗不出者為陽虛不能作汗各無阻  
症厲醫不識不論時令遂以麻黃重劑劫取其汗誤人  
死者多矣又曰人第知參芪以能止汗而不知其能發汗  
以在表藥隊中則助表藥而解散也

功裏之劑

大承氣湯用硝硝枳實大黃厚朴饒救陰瀉執功偏擅急

下陽明有數條

大黃治大寔位前治大燥大堅三味治有形血藥厚朴

大滿根寔治痞二味治無形氣藥熱毒傳人陽明胃

燥寔全見惟定三焦實熱並須以此下之胃

水設之油土為萬為之四旁有病皆能傳人

天... 則不... 他經... 藥大承... 蓋... 最緊小承氣次之調胃... 之大柴胡... 之蓋... 調在... 急... 不輕用

小承氣湯朴實黃譚狂痞

鞭上焦強

不用芒硝者恐傷

益

以羌活名三化中風閉

實可消

洋川承通二便加羌活治風中風休實者可

偶用然涉虛者多不可輕投

調胃承氣硝黃草甘緩微

和將胃保不用朴實傷上焦用

利寬者恐傷上焦中焦燥

實服之好

溫脾參附與乾姜甘草當

歸硝大黃寒熱並行治寒積臍

腹中結痛非常

補黃以蕩其積姜附以

接古入方中多有硝當祛其寒參附當歸以深其氣血相連與姜附桂附寒熱並用者



亦有參朮確黃補海菴  
用者亦有大黃麻黃汗下  
兼行  
者今人罕識其指姑錄  
此方以見流療之妙不一端也

### 和解之劑

小柴胡湯和解供半夏人  
參甘草從更用黃芩加姜棗少

### 陽百病此為宗

治一切竹來寒熱胸滿  
脇痛心煩喜嘔日晡耳聾咳嗽  
悸相半表半裏之症屬  
少陽經者但見一症即是不必  
悉其騰府清淨無出無  
人經在半表半裏法宜和解柴  
胡升陽透表黃芩退熱  
補中使邪不得  
復傳入裏也

四逆散裏用柴胡芍藥枳  
實甘草須此是陽邪成厥逆飲

### 陰泄熱平劑

芍藥散陰陽寒泄熱汁  
草和逆柴胡散邪用平劑其

黃芩湯用昌芍升二陽合和棗加烹此方遂為治知利後

人加味或更名再加生姜與半夏前症兼嘔此能平即

用芍藥與甘草散逆吐痛能和營

虞天居曰白芍不惟治血虛兼能行氣腹痛者苦甘氣不  
和逆於內裏以白芍行營氣以甘草和逆氣散治之也

逍遙散用當歸芍柴芩  
草加姜薄散鬱除蒸功最奇用

則血病歸芍養血平用水盞則土哀此草和中補土柴

胡升散熱茯苓利濕寧心生姜煖胃祛痰薄荷清風理

血匠費日方中柴胡薄何二味最妙蓋木喜風搖寒即

催萎溫則發主木鬱則火鬱火鬱則上鬱工鬱則金鬱

金鬱則水鬱五行相因自然之理也余以一方治木鬱

而諸鬱皆解調經八味片梔着

逍遙散是也

霍香正氣大腹蘓甘桔陳芩朮朴俱夏麩白芷加姜棗威

易頭歌括二集

傷嵐瘴並能驅

藿香理氣和中

邪腹朴消滿陳

以轉正氣止氣通

辟惡止

復除痰

腸則邪逆自除

以疏裏滿

以疏裏滿

以疏裏滿

六和藿朴杏紗呈半夏木瓜赤茯苓鹿參扁豆同甘草姜

棗煎之六氣平

脾為主脾胃既強

則諸邪不能入矣

青脾飲用青朴柴芩夏甘

苓白朮偕更加草藁姜煎服熱

多陽少此方佳

濕疾一名脾寒益因脾

胃受傷者居多此方乃加減小

柴芩夏甘

白朮

藁姜煎服熱

此方乃加減小



痛瀉方陳皮芍防風白朮煎九酌補土瀉木理脾肝若

作食傷醫便錯

吳瀉舉日傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛亦減故責之  
土或木賊也

表裏之劑

大柴胡湯用大黃枳實芍夏白芍將煎加姜棗表兼裏妙

法內攻併外按柴胡解表大黃枳實攻裏黃芩清熱芍藥欬陰半夏和胃止嘔

按本方治方治少陽陽明為不同柴胡硝黃義亦爾仍有桂枝

大黃湯

防風通聖大黃硝荊芥麻黃梔芍翹甘桔芎歸膏滑石薄

荷苓朮力偏饒表裏交攻陽熱盛外科瘍毒總能消

荆防麻黃薄荷發汗而散熱搜風  
而降火行水杏仁石膏清肺瀉胃  
連翹散氣聚而凝片尤能補中燥濕  
故能汗不傷表下

五積散治五般積麻黃蒼芷芍歸芎枳桔桂姜甘茯苓陳

皮半夏加美葱桂麻解表散寒甘芍和裏止痛蒼朮平

祛寒濕和精開腸一方絃除桂枳陳餘畧炒熟料大

增溫散功溫中解表祛寒濕散病調經用各充

三黃石膏芩柏連梔子麻黃淡豉全姜棗細茶煎熱服表

棗三焦熱

黃芩瀉上焦黃連瀉中焦黃柏瀉下焦梔子通瀉三焦

之火以清裏麻黃淡豉散寒發汗而解表石膏兼休重能瀉肺胃之火氣稟亦能解也

麥蘖飲內用 陳皮枳殼前胡半夏宜乾葛 木香甘桔茯苓內

傷外感此方推蘇葛前胡解表參苓甘草補中陳皮木香行氣破滯半夏枳殼利膈去痰

參前若去芍柴入飲號芍蘇治不差香 蘇飲饑陳皮草

傷感內外亦堪施

### 消導之劑

平胃散是蒼朮朴陳皮甘草四般藥除濕散滿驅瘴嵐調

胃諸方從此擴蒼朮燥濕強脾厚朴散滿平胃氣行痰消草和中補十泄中

或合一陳或五苓硝黃麥麴均堪着若合小柴名柴平

煎加姜棗能除瘧又不換金正氣散即是一加夏藿

保和神麴山查苓夏陳麴龍子加麴糊為左麥湯下亦



可方中用麥芽山查消肉食麥芽消穀食酒釀子下  
化痰比內傷而氣未病者故但以和平散和陳夏健脾  
之品消而化之不必政補也  
大安丸內加白

朮消中兼補效堪誇

健脾參朮與陳皮枳寔山查麥芽隨麴糊作丸米飲下消

補兼行胃弱宜陳皮枳實理氣化積山查消肉食只朮

丸亦消兼補荷葉燒飯上升奇

參苓白朮扁豆陳山藥甘蓮砂苡仁桔梗上浮兼保肺棗

湯調服益脾神

人參白朮茯苓甘草山藥苡仁扁豆蓮肉皆補脾之藥  
也砂仁陳皮調氣行滯之品也桔梗苦甘入肺載諸而

上等