

中国医生临床用药手册

The drug handbooks of chinese clinic doctors

2005年 第一辑 (总第三辑)



国药准字Z44021404 (10ml) 国药准字Z20023329 (100ml) 粤药广审(文)20041004519
▲ 患儿服用本品时请仔细阅读说明书或向药师咨询并仔细阅读说明书

健儿清解液
JIAN ER QING JIE YE
深圳市中药总厂

- 清热解毒
- 降火止咳
- 健脾消食

 **国药控股深圳中药有限公司** (深圳市中药总厂)



介宁[®]

(国家四类新药)

阿司匹林肠溶缓释片

ASPIRIN ENTERIC-COATED SUSTAINED RELEASE TABLETS

经典好药

长期防栓



- 百年经典好药 防治心脑血管疾病
- 肠溶缓释 国内独家剂型
- 血药峰谷波动小 胃肠道不良反应低

国药准字H20030396 鲁药广审(文)第2005030126号 请按医生处方购买和使用, 禁忌症及其它详见说明书。



山东新华制药股份有限公司



前言

严格意义上讲,这不是一本传统的药品手册。

药品手册的定义为“以简明、缩写方式提供专门领域内基本的既定知识和实用资料的工具书。便于查阅专门知识与具体实用资料。常以叙述和列表或图解方式来表述内容,并针对某一专门学科,收集相关的事实、数据、公式、术语以及规程等专门化的具体资料”。

严格意义上讲,这也不是一本传统的行业年鉴。

行业年鉴的定义为“逐年出版,提供相应年份内各行业资料的工具书,常被称为微型百科全书。既是各类动态性资料和事实、数据的综合性查考工具,也是编制百科全书类工具书的基本信息源”。

严格意义上讲,新版《中国医生临床用药手册》是一本定位中国主流医院中高端医生,面向临床,为医生提供处方评价、市场反应、药物评估等信息的综合类工具书。

事实上,国内针对医药类工具书研究已久,但很难有一类工具书能在权威性、时效性、准确性、客观性、易用性与临床指导性上面面俱佳,这导致了医生对信息渠道需求更加复杂化。为向医生提供简明、完整、准确、有用的临床信息,国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所策划推出了全新版本的《中国医生临床用药手册》。

《中国医生临床用药手册》分为十章,包括:心血管和造血系统用药、消化系统用药、呼吸系统用药、泌尿和生殖系统用药、抗微生物用药、内分泌和代谢系统用药、神经和肌肉系统用药、眼耳鼻喉用药、皮肤科用药、抗肿瘤用药及免疫制剂。

每章分为三节。第一节为产品推荐,收载2005年上半年全国主流医院各科处方药用量前16位的药物及部分常用药物,从适应症、剂型、用法用量、不良反应、禁忌、药物相互作用等方面对每个药物进行介绍,帮助临床工作者迅速地查寻到所需的药物信息。

第二节为2005年上半年全国医院各科重点药物的临床使用评价,对当前医院临床用药进行药物综合评估,以帮助专科医生和全科医生及时获取相关专业的信息及临床指导意见。

第三节为2005年上半年全球医药视窗,刊登最新药物的临床研究报告、最新研究进展及行业动态,为医生提供各学科的医药学方面的前沿动态信息。

我们希望本版《中国医生临床用药手册》能对临床工作者有所帮助,成为临床工作者的好助手。

由于水平有限,本书疏漏之处在所难免,欢迎读者给我们多提宝贵意见。

《中国医生临床用药手册》编委会
2005年7月

CONTENTS

目录

索引

药名拼音索引	A1
--------------	----

第一章 心血管和造血系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院心血管和造血系统处方用药量前 16 位产品	1
二、2005 年上半年全国主流医院心血管和造血系统用药重点推荐品种	
化学药部分	11
中成药部分	18

第二节 2005 年上半年全国医院心血管重点药物临床使用评价

心血管重点药物临床使用评价	20
---------------------	----

第三节 2005 年上半年全球心血管和造血系统医药视窗

1

第二章 消化系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院消化系统处方用药量前 16 位产品	25
二、2005 年上半年全国主流医院消化系统用药重点推荐品种	
化学药部分	31
中成药部分	35

第二节 2005 年上半年全国医院消化系统重点药物临床使用评价

消化性溃疡的治疗进展	37
肝细胞性黄疸和肝内胆汁淤积性黄疸的治疗进展	38
慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展	40

第三节 2005 年上半年全球消化系统医药视窗	42
-------------------------	----

第三章 呼吸系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院呼吸系统处方用药量前 16 位产品	45
二、2005 年上半年全国主流医院呼吸系统用药重点推荐品种	
化学药部分	51
中成药部分	54

第二节 2005 年上半年全国医院呼吸系统重点药物临床使用评价

四种常见呼吸系统疾病药物临床使用评价	55
--------------------	----

第三节 2005 年上半年全球呼吸系统医药视窗	58
-------------------------	----

第四章 泌尿和生殖系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院泌尿和生殖系统处方用药量前 16 位产品	61
二、2005 年上半年全国主流医院泌尿和生殖系统用药重点推荐品种	
化学药部分	69
中成药部分	72

第二节 2005 年上半年全国医院泌尿和生殖系统重点药物临床使用评价

外阴阴道念珠菌病治疗的研究进展	74
良性前列腺增生治疗药物的研究进展	76

第三节 2005 年上半年全球泌尿和生殖系统医药视窗	78
----------------------------	----

第五章 抗微生物用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院抗微生物用药处方用药量前 16 位产品	81
二、2005 年上半年全国主流医院抗微生物用药重点推荐品种	99

第二节 2005 年上半年全国医院抗微生物用药重点药物临床使用评价

肺部耐药菌及真菌感染用药的临床应用	119
-------------------	-----

第三节 2005 年上半年全球抗微生物用药医药视窗	122
---------------------------	-----

第六章 内分泌和代谢系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院内分泌和代谢系统处方用量前 16 位产品	125
二、2005 年上半年全国主流医院内分泌和代谢系统用药重点推荐品种	
化学药部分	133
中成药部分	137

第二节 2005 年上半年全国医院内分泌和代谢系统重点药物临床使用评价

胰岛素类似物:临床优化血糖控制的更多选择	139
糖尿病合并高血压的药物治疗	141
乳腺增生症的中医药治疗近况	143

第三节 2005 年上半年全球内分泌和代谢系统医药视窗

第七章 神经和肌肉系统用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院神经和肌肉系统处方用量前 16 位产品	147
二、2005 年上半年全国主流医院神经和肌肉系统用药重点推荐品种	
化学药部分	153
生物药部分	158
中成药部分	158

第二节 2005 年上半年全国医院神经和肌肉系统重点药物临床使用评价

神经内科疾病的研究进展和治疗	160
外用非甾体类抗炎药的合理使用	162

第三节 2005 年上半年全球神经和肌肉系统医药视窗

第八章 眼/耳/口/喉用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院眼/耳/口/喉处方用量前 16 位产品	167
二、2005 年上半年全国主流医院眼/耳/口/喉用药重点推荐品种	
化学药部分	174
中成药部分	178

第二节 2005 年上半年全国医院眼/耳/口/喉用药重点药物临床使用评价

糖尿病性白内障的药物治	179
美国眼科交流学会发布玻璃体内注射指南	180
2004 年咽喉疾病临床医学进展回顾	182
眼科抗生	182
治沙眼药物的作用评价	183

第三节 2005 年上半年全球眼/耳/口/喉用药医药视窗	185
------------------------------	-----

第九章 皮肤科用药

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院皮肤科处方用药量前 16 位产品	187
二、2005 年上半年全国主流医院皮肤科用药重点推荐品种	
化学药部分	194
中成药部分	198

第二节 2005 年上半年全国医院皮肤科用药重点药物临床使用评价

皮肤科药物临床使用和研究进展	199
----------------	-----

第三节 2005 年上半年全球皮肤科用药医药视窗	202
--------------------------	-----

第十章 抗肿瘤用药及免疫制剂

第一节 产品推荐

一、2005 年上半年全国主流医院抗肿瘤用药及免疫制剂处方用药量前 16 位产品	205
二、2005 年上半年全国主流医院抗肿瘤用药及免疫制剂重点推荐品种	
化学药部分	216
生物药部分	219
中成药部分	222

第二节 2005 年上半年全国医院抗肿瘤用药及免疫制剂重点药物临床使用评价

类风湿关节炎治疗方法的研究进展	223
非小细胞肺癌治疗新进展	225
唑来膦酸治疗恶性肿瘤骨转移的研究进展	227

第三节 2005 年上半年全球抗肿瘤用药及免疫制剂医药视窗	228
-------------------------------	-----

制药商名录	231
-------	-----

Index

药名拼音索引

A

α-干扰素·····	212
阿达帕林·····	191
阿卡波糖·····	125
阿仑膦酸钠·····	150
阿米卡星·····	194
阿米洛利·····	11
阿米三嗪萝巴新·····	11
阿莫西林(胶囊)·····	99
阿莫西林(咀嚼片)·····	99
阿莫西林克拉维酸钾(片剂)·····	93
阿莫西林克拉维酸钾(注射剂)·····	92
阿奇霉素·····	85
阿曲库铵·····	151
阿司待因·····	153
阿司匹林·····	12
安神补脑液·····	158
氨苄西林钠氯唑西林钠·····	100
氨苄西林舒巴坦·····	98
氨基葡萄糖·····	149
氨肽素·····	190
氨溴索·····	45
昂丹司琼·····	25
奥美拉唑·····	25
奥沙利铂·····	208
奥硝唑·····	61
奥扎格雷·····	12

B

白蚀丸·····	198
班布特罗·····	51
斑蝥素乳膏·····	193
棓丙酯注射液·····	18
贝那普利·····	6
倍氯米松·····	48
倍美力·····	69

苯磺酸氨氯地平·····	2
苯溴马隆·····	154
鼻舒适片·····	54
比格列酮·····	129
吡诺克辛钠·····	169
吡嗪酰胺·····	101
吡柔比星·····	215
表柔比星·····	211
丙卡特罗·····	49
丙硫氧嘧啶·····	133
布地奈德·····	45
布洛芬·····	149

C

茶碱缓释胶囊·····	49
产复康颗粒·····	72
重组牛碱性成纤维细胞生长因子·····	152
重组人白介素-2·····	215
重组人白介素-11·····	219
川贝枇杷露·····	54
川芎嗪·····	13
穿王消炎片·····	54
促肝细胞生长素·····	219
醋酸舍莫瑞林·····	133

D

单硝酸异山梨酯·····	3
单组分人胰岛素/单组分猪胰岛素·····	125
地喹氯铵·····	49
地塞米松·····	192
递法明·····	171
癫痫宁片·····	158
碘酸钾·····	134
丁咯地尔·····	10
丁香罗勒服膏·····	195
多抗甲素·····	219

多潘立酮	31
多沙普仑	51
多司马酯	31
多索茶碱	48
多西他赛	209
多烯磷脂酰胆碱	30

E

二甲双胍	125
------	-----

F

法莫替丁	26
非格司亭	207
非洛地平	7
非那留胺	61
肥儿疳积颗粒	35
伏格列波糖	130
氟康唑	88
氟米龙	170
福莫特罗	52
福辛普利	9
复方氨酚烷胺胶囊	51
复方丹参	10
复方莪术油	66
复方甘草	52
复方甘草甜素	28
复方甘草浙贝氯化铵片	52
复方雷尼替丁	31
复方磷酸可待因	49
复方托吡卡胺	174
复方硝酸益康唑	188
复方血栓通胶囊	18

G

干扰素	174
甘草酸二铵(甘利欣胶囊)	29
甘草酸二铵(甘利欣注射剂)	29
甘草酸二铵(天晴甘平)	29
甘油果糖注射液	154
格拉司琼	26
格列本脲	134
格列吡嗪	127
格列喹酮	128
格列美脲	131
格列齐特	127
葛根素	3

骨肽注射液	151
骨仙片	158
冠心丹参胶囊	19
果糖二磷酸钠	1
过氧苯甲酰	195

H

核糖核酸	27
华蟾素	222
化痔灵片	36
还原型谷胱甘肽	174
环孢菌素	206
环吡司胺	195
环丙沙星	195
黄酮哌酯	70

J

吉西他滨	211
己酮可可碱	13
加替沙星(辰立)	95
加替沙星(罗欣严达)	94
甲苯磺丁脲	134
甲地孕酮	64
甲钴胺	135
甲磺酸帕珠沙星	101
甲硫氧嘧啶	135
甲羟孕酮	68
甲巯咪唑	132
甲硝唑/芬布芬	175
甲硝唑/克霉唑/洗必泰	70
甲状腺	137
甲状腺素碘塞罗宁滴眼液	176
健儿清解液	178
降钙素	128
降糖舒胶囊	138
交沙霉素	102
金芪降糖颗粒/金芪降糖片/金芪降糖胶囊	138
精蛋白锌胰岛素	129
聚甲酚磺醛	70
聚维酮碘	71
枸橼酸西地那非	63

K

卡铂	216
卡培他滨	216

卡替洛尔·····	173
卡维地洛·····	14
康莱特·····	210
克拉霉素·····	103
克林霉素·····	91
克林霉素磷酸酯(克林美)·····	86
克林霉素磷酸酯(力派)·····	87
克林霉素磷酸酯(力深)·····	87
克霉唑·····	71
苦参碱·····	32
苦碟子注射液·····	19

L

拉克替醇·····	32
拉坦前列素·····	170
拉氧头孢钠·····	103
来氟米特·····	150
来格司亭·····	217
利巴韦林(利巴韦林含片)·····	104
利巴韦林(利巴韦林片)·····	104
利福霉素钠·····	105
利福平·····	105
利福昔明·····	106
利妥昔单抗·····	220
联苯苄唑·····	190
两性霉素 B(莱帕)·····	108
两性霉素 B(欧泊)·····	107
膦甲酸钠·····	108
硫化硒·····	196
硫普罗宁·····	27
硫糖铝·····	32
龙珠软膏·····	198
卤米松·····	189
鹿胎颗粒·····	72
铝碳酸镁·····	30
氯己定·····	190
氯雷他定·····	46
氯霉素/玻璃酸钠·····	170
氯屈膦酸二钠·····	151
氯沙坦钾·····	7
氯唑沙宗·····	151
仑氨西林·····	108
罗库溴铵·····	152
洛美沙星(奇敌)·····	109
洛美沙星(星洛)·····	109

M

马应龙麝香痔疮栓·····	36
---------------	----

麦考酚酸酯·····	207
煤焦油·····	190
美洛昔康·····	155
美托洛尔·····	16
门冬氨酸钾镁(门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液)·····	9
门冬氨酸钾镁(门冬氨酸钾镁注射液)·····	9
孟鲁司特·····	47
咪康唑·····	188
米非司酮·····	66
米诺环素·····	110
莫拉司亭·····	220
莫米松·····	188
莫匹罗星·····	190

N

那格列奈·····	136
萘丁美酮·····	153
萘朴维·····	171
脑栓通胶囊·····	158
尼美舒利·····	156
尼莫地平(尼立苏,尼莫地平口服缓释剂)·····	8
尼莫地平(尼立苏,尼莫地平注射液)·····	8
尼扎替丁·····	33
尿毒灵软膏·····	72

P

帕米膦酸二钠·····	148
哌拉西林钠他唑巴坦钠·····	89
哌拉西林三唑巴坦·····	110
哌拉西林舒巴坦钠·····	111
泮托拉唑·····	26
喷昔洛韦·····	196
普伐他汀·····	18
普拉洛芬·····	169
普乐安片·····	72

Q

七叶皂苷·····	148
奇应内消膏·····	159
前列地尔·····	1
前列通片·····	72
羟喜树碱·····	217
青柏洁身洗液·····	73

曲安奈德·····	196
曲马多·····	156
去甲万古霉素·····	112

R

绒促性素·····	67
乳果糖·····	30
乳核散结片·····	138
瑞格列奈·····	129

S

塞来昔布·····	149
三分三浸膏片·····	19
沙丁胺醇·····	46
沙美特罗·····	46
舍尼通·····	62
神黄钠铝胶囊·····	36
肾灵·····	61
参麦·····	210
生长抑素·····	33
施图伦滴眼剂·····	172
舒肝颗粒·····	36
双氯芬酸·····	147
双氯芬酸钠·····	176
双歧三联活菌·····	27

T

他克莫司·····	213
坦索罗辛·····	62
特比萘芬·····	187
特布他林·····	50
替勃龙·····	68
酮康唑·····	191
酮洛芬·····	157
头孢呋辛酯·····	83
头孢克洛·····	92
头孢克肟·····	112
头孢拉定·····	113
头孢尼西钠·····	114
头孢哌酮·····	115
头孢哌酮舒巴坦·····	81
头孢曲松·····	84
头孢噻肟(头孢噻肟钠)·····	97
头孢噻肟(卓立佳)·····	96
头孢他啶·····	84
头孢他美酯·····	116

头孢唑林·····	116
透明质酸钠·····	169
托美丁钠·····	158
妥布霉素·····	168
妥布霉素/地塞米松·····	168

W

外用重组人表皮生长因子衍生物·····	158
维A酸·····	197
维胺酯·····	188
维库溴铵·····	148
维生素A棕榈酸酯/聚羧乙烯·····	176
翁沥通胶囊·····	73
乌司他丁·····	10

X

西吡氯铵·····	176
西咪替丁·····	28
西替利嗪·····	46
烯丙雌醇·····	69
腺苷蛋氨酸·····	29
香菇多糖·····	211
消渴丸·····	138
硝苯地平·····	4
硝呋太尔·····	72
硝酸咪康唑·····	66
小儿氨酚黄那敏颗粒·····	52
小儿氨酚烷胺颗粒·····	53
小儿清热止咳口服液·····	54
缬沙坦·····	14
辛伐他汀·····	5
胸腺肽- $\alpha 1$ ·····	221
胸腺五肽(10mg)·····	222
胸腺五肽(1mg)·····	221
熊胆胶囊·····	178
熊去氧胆酸·····	30
溴莫尼定·····	177
溴隐亭·····	64

Y

亚胺培南西司他丁钠·····	89
盐酸苯乙双胍·····	136
盐酸格拉司琼·····	217
盐酸雷尼替丁·····	34
眼氨肽·····	172
氧氟沙星·····	167

氧化苦参碱·····	35
野马追糖浆·····	54
伊马替尼·····	218
依巴斯汀·····	53
依降钙素·····	130
依诺沙星·····	117
胰岛素·····	126
乙胺丁醇·····	118
乙酰半胱氨酸·····	48
乙氧苯柳胺软膏·····	198
异丙托溴铵·····	47
异长春花碱·····	212
异环磷酰胺·····	218
异维 A 酸·····	189
益肾蠲痹丸·····	159
荧光素钠·····	177
右美沙芬·····	53

愈创木酚甘油醚·····	53
孕三烯酮·····	65

Z

障眼明片·····	178
珍石烧伤膏·····	198
珍珠明目液·····	173
猪苓多糖·····	36
壮肾丸·····	73
滋肾育胎丸·····	73
紫杉醇·····	205
左布诺洛尔·····	177
左甲状腺素钠·····	130
左氧氟沙星·····	82/171



第一节 产品推荐

Pharmaceutical Introduction

一、2005年上半年全国主流医院 心血管和造血系统处方用药量前16位产品

前列地尔

Alprostadil

【剂型】注射剂

【适应症】

①治疗慢性动脉闭塞症(血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化症)引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛,改善心脑血管微循环障碍。

②脏器移植术后抗栓治疗,用以抑制移植血管内的血栓形成。

③小儿先天性心脏病动脉导管未闭,用以缓解低氧血症,保持导管血流以等待时机手术治疗。

【用法用量】成人,一日1次,1~2ml(前列地尔5~10 μ g)加入10ml生理盐水(或5%的葡萄糖)静注,或直接入小壶。

【不良反应】

①偶见休克。

②注射部位:有时出现血管疼、发红,偶见发硬、瘙痒等。

③循环系统:有时出现加重心衰、肺水肿、胸部发紧感、血压下降等症状。另外,有时出现发红、血管炎,偶见脸面潮红,心悸。

④消化系统:有时出现腹泻、腹胀,不愉快感,偶见腹痛,食欲不振,呕吐,便秘。

⑤肝脏:偶见GOT、GPT上升等肝功能异常。

⑥精神和神经系统:有时头晕、头痛、发热,疲劳感,偶见发麻。

⑦皮肤:有时出疹或瘙痒感,偶见荨麻疹。

⑧血液系统:偶见嗜酸细胞增多,白细胞减少。

⑨其他:偶见视力下降,口腔肿胀感,脱发,四肢疼痛,浮肿,发热感,不适感。

【禁忌】既往对本制剂有过敏史的患者禁用。严重心衰(心功能不全)患者禁用。妊娠或可能妊娠的妇女禁用。以下情况慎用:青光眼或眼

压亢进;既往有胃溃疡合并症;间质性肺炎。

【注意事项】

①用于治疗慢性动脉闭塞症、微小血管循环障碍的患者。由于本药的治疗是对症治疗,停止给药后,有再复发的可能性。

②如出现休克,要注意观察,发现异常现象时,立刻停药,采取适当的措施。

③一旦出现加重心衰,肺水肿,胸部发紧感,血压下降等症状,立即停药。

④不能与输液以外的药品混合使用,避免与血浆增溶剂(右旋糖酐、明胶制剂等)混合。

⑤与输液混合后须在2小时内使用。

【药物相互作用】与抗高血压药和血小板抑制剂合用,有协同作用。

果糖二磷酸钠

Fructose Diphosphate sodium

【剂型】注射剂

【适应症】用于心肌缺血、休克、缺氧、组织损伤的辅助治疗。

【用法用量】

本品有瓶装制剂及粉针剂二种规格,瓶装制剂50ml含5g果糖二磷酸钠,粉针剂为每支0.5g果糖二磷酸钠。

①瓶装制剂用法:50~100ml/次,1~2次/d,最大量200ml/d,静脉滴注速度为每分钟4~7ml。

②粉针剂用法:以注射用水配成2.5~10%的溶液静脉滴注,每次0.1~0.25g/kg,本品5g于5~10分钟内滴完。

【不良反应】一般耐受良好,可有滴注部位疼痛、皮疹、口唇麻木,偶见头晕、胸闷及过敏反应。

【禁忌】对本品过敏者、高磷酸血症、肾功能衰竭者禁用。

【注意事项】

①不能溶入其他药物,尤其忌与碱性溶液、





钙盐混合使用。

②肌酐清除率低于50ml/min者，应监测血磷。

③病人伴有心力衰竭时，剂量减半。

【药物相互作用】宜单独使用，勿溶入其他药物，尤其忌溶于碱性溶液和钙盐中。

【商品名及生产企业】博维赫(山东新华制药股份有限公司)

苯磺酸氨氯地平 Amlodipine Besylate

【适应症】

①高血压(单独或与其他药物合并使用)。

②心绞痛:尤其是自发性心绞痛(单独或与其他药物合并使用)。

【用法用量】通常口服起始剂量为5mg,每日1次,最大不超过10mg/d。瘦小者、体质虚弱者、老年患者或肝功能受损者从2.5mg,每日1次开始用药;合用其他抗高血压药者也从此剂量开始用药。

【不良反应】

①本品在10mg/d的剂量范围内有良好的耐受性,大多数不良反应是轻中度的。本品因不良反应而停药的仅为1.5%,与安慰剂没有明显差别(约1%)。最常见的不良反应是头痛和水肿。

②发生率>1%的剂量相关性不良反应如下:水肿、头晕、潮红和心悸。与剂量关系不明确,但发生率超过1.0%的不良反应如下:头痛、疲倦、恶心、腹痛和嗜睡。以上不良反应中,水肿、潮红、心悸和嗜睡在女性中的发生率超过男性。

③以下不良事件发生率≤1%但>0.1%,与药物的因果关系不明确。一般:过敏反应,虚弱,背痛,潮热,不适,疼痛,僵硬,体重增加;心血管:心律失常(包括心动过速、心动过缓或房颤),胸痛,低血压,外周缺血,昏厥,体位性头晕,体位性低血压和脉管炎;中枢和外周神经系统:感觉减退,外周神经病,感觉异常,震颤,眩晕;胃肠道:厌食症,便秘,消化不良,吞咽困难,腹泻,胃胀气,胰腺炎,呕吐,牙龈增生;骨骼肌系统:关节痛,关节炎,肌肉痛性痉挛,肌痛;精神:性功能障碍,失眠,紧张,抑郁,梦魇,焦虑,人格解体;皮肤及附属物:血管性水肿,红斑,瘙痒,皮疹,斑丘疹;特殊感觉:视觉异常,结膜炎,复视,眼痛,耳鸣;泌尿系统:尿频,排尿障碍,夜尿;自主神经系统:口干,盗汗;代谢和营养:高血糖,口渴;造血系统:白细胞减少症,紫癜,血小板减少症。

④以下不良事件的发生率≤0.1%:心衰,脉搏不规则,期外收缩,皮肤变色,风疹,皮肤干燥,皮肤炎,脱发,肌肉无力,颤搐,共济失调,张力过高,偏头痛,皮肤冷湿,淡漠,激动,健忘,胃炎,食欲增加,稀便,咳嗽,鼻炎,排尿困难,多尿,嗅觉倒错,味觉颠倒,视觉调节失常,眼干燥症。其他偶发反应如心肌梗死和心绞痛则不能分辨是药物作用还是疾病状态。

⑤常规实验室检查项目没有明显变化,未发现血钾、血糖、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白(HDL)、尿酸、血尿素氮或肌酐出现有意义的变化。

⑥药物上市后,用药人群中偶有男性乳腺发育的报道,但与药物的因果关系不明;部分病例中黄疸和肝酶升高(常伴有胆汁淤积和肝炎)较严重,需要住院治疗。

【禁忌】

①对二氢吡啶类钙拮抗剂过敏者禁用。

②钙通道阻滞剂应慎用于心衰患者。

③严重肝功能不全患者应慎用本品。

【注意事项】

①心绞痛和/或心肌梗死罕见。有严重的阻塞性冠状动脉疾病的患者,在开始应用钙通道拮抗剂治疗或加量时,会出现心绞痛发作频率、时程和/或严重性上升,或发展为急性心肌梗死,机制不明。

②由于本品逐渐产生扩血管作用,口服一般很少出现急性低血压,但本品与其他外周扩血管药物合用时仍需谨慎,特别是对于有严重主动脉瓣狭窄的病人。

③肾衰患者的起始剂量可以不变。

④本品对突然停用β-受体阻滞剂所产生的反跳症状没有保护作用,因此,停用β-受体阻滞剂仍需逐渐减量。

⑤本品在梗阻性肺病、代偿良好的心力衰竭、外周血管疾病、糖尿病和脂质异常疾病的病人中可以安全使用。

【药物相互作用】

①西咪替丁、葡萄柚汁、致酸剂:合用时不改变本品的药代动力学。

②阿伐他汀、地高辛、乙醇:本品不影响它们的药代动力学。

③昔多芬:原发性高血压患者单剂服用昔多芬(伟哥)对本品的药代动力学没有影响。两药合用时独立产生降压效应。

④华法林:本品不改变华法林的凝血酶原作用时间。

⑤地高辛、苯妥英和华法林:与本品合用对血浆蛋白结合率没有影响。

⑥麻醉药:吸入烃类与本品合用可引起低血压。





⑦非甾体类抗炎药：尤其吲哚美辛可减弱本品的降压作用。

⑧ β -受体阻滞剂：与本品合用耐受性良好，但可引起过度低血压，罕见加重心力衰竭。

⑨雌激素：合用可引起体液潴留而增高血压。

⑩磺吡酮：合用可增加本品的蛋白结合率，产生血药浓度变化。

⑪锂：合用可引起神经中毒，出现恶心、呕吐、腹泻、共济失调、震颤和/或麻木，需慎重。

⑫拟交感胺：可减弱本品降压作用。

⑬舌下硝酸甘油和长效硝酸酯制剂：与本品合用可加强抗心绞痛效应。虽未报告有反跳作用，但停药时应在医生指导下逐渐减量。

⑭噻嗪类利尿药、ACEI、地高辛、华法林、抗生素和口服降糖药：可与本品安全合用。

【商品名及生产企业】安内真(苏州东瑞制药有限公司)

单硝酸异山梨酯

Isosorbide Mononitrate

【剂型】口服常释剂，口服缓释剂，注射剂

【适应症】冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。

【用法用量】

①口服常释剂：口服。10~20mg/次，一日2~3次，严重病例可用40mg/次，一日2~3次。

②口服缓释剂：清晨服50mg/日，病情严重者，可在清晨服100mg/日，若出现头疼，最初剂量可减至25mg/次。整片或半片服用前应保持完整，吞服，不可咀嚼或碾碎服用。

③注射剂：用5%葡萄糖注射液稀释后从每小时1~2mg开始静滴，根据患者的反应调整剂量，最大剂量为8~10mg，用药期间须密切观察患者的心率及血压。由于个体反应不同，需个体化调整剂量。

【不良反应】用药初期可能出现血管扩张性头痛，通常连续服用数日后，症状可消失。还可能出现面部潮红、眩晕、直立性低血压和反射性心动过速。偶见血压明显降低、心动过缓、心绞痛加重和晕厥。药物过量可导致与血管过度扩张有关的反应：颅内压增高、眩晕、心悸、视力模糊、恶心与呕吐、晕厥、呼吸困难、出汗伴皮肤潮红或湿冷、传导阻滞与心动过缓、瘫痪、昏迷、癫痫发作或死亡。

【禁忌】急性循环衰竭(休克、循环性虚脱)；严重低血压(收缩压<90mmHg)；急性心肌梗死伴低充盈压(除非在有持续血流动力学监测的条件下)；肥厚梗阻型心肌病；缩窄性心包炎或心包填塞；严重贫血；青光眼；颅内压增高；对硝基化合物过敏者禁用。主动脉或二尖瓣狭窄、体位性低血压及肾功能不全者慎用。儿童禁用。孕妇及老年患者慎用。

【注意事项】

①低充盈压的急性心肌梗死患者，应避免收缩压低于90mmHg。

②药物过量无特异的拮抗剂可对抗其血管扩张作用，用肾上腺素和其他动脉收缩剂可能弊大于利。处理方法包括抬高患者的下肢以促进静脉回流以及静脉补液。如发生高铁血红蛋白血症，治疗方法是静注亚甲蓝1~2mg/kg。

【药物相互作用】与其他血管扩张剂、钙拮抗剂、 β -受体阻滞剂、抗高血压药、三环抗抑郁药及酒精合用，可增强本类药物的降血压效应。

葛根素

Puerarin

【剂型】口服常释剂，注射剂

【适应症】注射剂用于辅助治疗冠心病，心绞痛，心肌梗死，视网膜动脉、静脉阻塞，突发性耳聋及缺血性脑血管病，小儿病毒性心肌炎，糖尿病等。口服常释剂用于冠心病和心律失常，也用于急性拟除虫菊酯中毒，可控制抽搐，促进意识恢复。

【用法用量】

①注射剂：静脉滴注，200~400mg/次，加入葡萄糖液500ml中滴注，一日1次，10~20天为一疗程，可连续使用2~3个疗程。

②口服常释剂：口服。重症50~100mg/次，每日3次。轻症50mg/次，每日3次。症状减轻后减至25mg/次，每日3次。连用1~2个月。

【不良反应】少数在用药开始时出现暂时性腹胀、恶心等反应，继续用药可自行消失。极少数有皮疹、发热等过敏现象，立即停药或对症治疗，可恢复正常。

【禁忌】严重肝、肾损害、心衰及其他严重器质性疾病患者禁用。有出血倾向者慎用。孕妇及哺乳期妇女慎用。

【注意事项】血容量不足者应在短期内补足血容量后使用注射剂。合并糖尿病患者，应用生理盐水稀释后静滴。

【药物相互作用】尚不明确。但与目前常用

