

丹溪心法卷之四

新安吳勉學校

痿五十六

○痿証斷不可作風治而用風藥 有濕熱 濕痰

氣虛 血虛 瘀血 濕熱東垣健步丸加燥濕降陰

火蒼朮黃芩黃柏牛膝之類 濕痰二陳湯加蒼朮

白朮黃芩黃柏竹瀝姜汁 氣虛四君子湯加黃芩

黃柏蒼朮之類 血虛四物湯加黃柏蒼朮煎送補

陰丸 亦有食積死血妨碍不得下降者大率屬熱

用參朮四物湯黃柏之類

附錄謹按五痿等証特立篇目所論至詳後代諸方獨於此証蓋多缺畧攷其由皆因混入中風條內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者多誤于庸醫之手有志之士必當究其心焉夫陳無澤謂痿因內藏不足所致誠得之矣然痿之所不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實實虛虛之患乎且無釋以三因立方可謂諸方之冠其餘此証尤且未明況求於他者乎

附方 健步丸 東垣方

防已

酒洗 一兩

羌活

柴胡

滑石

炒

甘草 炙

瓜蒌根

酒洗以上  
各半兩

澤瀉

防風

各三錢

苦參

酒洗

川烏

各一錢

肉桂

五分

右為末酒糊為丸梧桐子大每服七十丸葱白煎

愈風湯下

見中風類

補陰丸

見諸虛類

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒

水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下

痿軟癱瘓不能動

黃芪

一錢五分

蒼朮

一錢

白朮

橘皮

澤瀉

各半錢

人參

白茯苓

升麻

各三分

麥門冬

歸身

生芩

曲末

猪苓

各二分

酒柏

柴胡

黃連

各一分

五味子

九箇

甘草

炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七

附手足十指麻木

○厥逆也手足因氣血逆而冷也 因氣虛為主

有因血虛 氣虛脉細 血虛脉大 熱厥脉數

外感脉沉實 有痰脉弦 因痰者用白朮竹瀝

氣虛四君子 血虛四物 熱厥用承氣 外感用

雙解加姜汁酒 有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰

於下則寒

○手足麻者屬氣虛 手足木者有濕痰死血 十指麻木是胃中有濕痰死血

〔附錄〕厥者甚也短也逆也手足逆冷也其証不一

散之方書者甚多今姑撮大槩且如寒熱厥逆者則爲陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魂絕而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脈沉四肢逆足踈卧唇口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩

仍速灸關元百壯 又尸厥飛尸卒厥此卽中惡  
之候因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起  
頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏  
不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊吊死  
問喪入廟登塚多有此病以蘇合丸灌之候稍甦  
以調氣散和平胃散服名調氣平胃散 痰厥者  
乃寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附湯以生  
附代熟附 虻厥者乃胃寒所生經曰虻者長蟲  
也胃中冷卽吐虻蟲宜理中湯加炒川椒五粒攪  
柳半錢吞烏梅丸効虻是椒則頭伏故也 氣厥

者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以  
八味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰湯  
服之

附方

八味順氣散

見中風類

調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香

各二錢

藿香

甘草

炙各八錢

砂仁

四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

蒼朮

泔浸五斤

厚朴

姜制炒

陳皮

各三斤

甘草

炒三兩

丹溪心法

卷四

右為末每服五錢姜三片棗一箇煎服入塩一捻  
沸湯點服亦得

四七湯

厚朴 二兩

茯苓 四兩

半夏 五兩

紫蘇 二兩

右每服四錢水一鍾姜七片棗一箇煎服

承氣湯 見瀉類

四逆湯 理中湯

姜附湯 並見中寒類

烏梅丸 見心痛類

導痰湯 見痰類

疰五十八

○瘧切不可作風治兼用風藥 大率與癰病相似  
比癰爲甚爲虛宜帶補 多是氣虛有火兼痰宜用  
人參竹瀝之類

〔附錄〕古方風瘧曰瘧也經云諸瘧項強皆屬於濕  
土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽  
明內鬱而陰行於外又曰瘧瘧曰剛無汗陰瘧曰  
柔有汗亢則害承乃制故濕過極反兼風化制之  
然兼化者虛象實非風也

〔附方〕

葛根湯 治瘧病無汗而小便少反惡寒者名剛瘧

葛根 四錢

麻黃 二錢

桂枝 二錢  
芍藥 二錢

甘草 三錢

右咬咀水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗

桂枝加葛根湯 治瘧病有汗不惡寒者服之此名

柔瘧

葛根 四錢

生姜 三錢

桂枝

芍藥

甘草 各錢

右作一服水二鍾棗一箇煎服 二瘧皆可用小

續命湯加減服若胃滿口噤咬齒脚攣卧不着衣者以大承氣湯下之無疑矣

小續命湯 見中風類

大承氣湯 見痢類

癰五十九

○驚與痰宜吐 大率行痰爲主用黃連南星瓜蔓

半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者 分痰與

熱 有熱者以涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐

後用東垣安神丸 大法宜吐吐後用平肝之刺青

黛柴胡川芎之類龍會丸正宜服之 且如癰因驚

而得驚則神不守舍舍空而痰聚也

戴云癰者俗曰猪癰風者是也

附錄癩症有五馬牛雞猪羊且如馬癩張口搖頭  
馬鳴牛癩目正直視腹脹雞癩搖頭反折喜驚羊  
癩喜揚目吐舌猪癩喜吐沫以其病狀偶類之耳  
非無痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐  
搦口眼相引背強直叫吼吐沫食頃乃甦宜星  
香散加全蝎三箇

附方

續命湯 主癩發頓悶無知口吐沫出四體角弓反  
張百反上口噤不得言

竹瀝

一升  
二合

生芡汁

一升

龍齒

末

生姜

防風

麻黃

去節各四兩

防已

附子

炮各二兩

石膏

桂 二兩

右十味水一斗煮取三升分三服有氣加紫蘇陳

皮各半兩

○但小兒癩千金有風食驚三種本事方又有陰

陽癩慢脾風三証慢脾卽食癩宜醒脾丸人參散

古方三癩丸

治小兒百二十種驚癩

荆芥穗

二兩

白朮

一兩半生半枯

右爲末麩糊爲丸黍米大朱砂爲衣姜湯下二十

丸如慢驚用來復丹急驚三癩丸食癩醒脾丸可

也

本事人參散 治慢脾風神昏痰盛

人參

半兩

圓白大南星

一兩切片以生姜汁并漿水各半蔭滿煮帶性晒

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁搗細少

許同煎取半盞作兩三次灌下

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荊芥

殭蠶

炒

獨活

遠志

去心

犀角

麥門冬

去心

酸棗仁

炒

辰砂

各半兩另研

半夏

南星

石膏 各一兩

甘草 炙

白附子 川芎

鬱金

牛黃 各三錢

珍珠 三錢 生芩

黃連 各半兩

金箔 三十片

右為末酒糊丸空心服五十丸白湯下

東垣安神丸

黃連 一錢五分酒流

朱砂 一錢水飛

酒生芩 酒歸身

炙甘草 各五分

右除朱砂水飛外四味搗為末和勻湯浸蒸餅丸

如黍米大每服十五丸食後津嚥下

星香散 見中風類

顛狂六十

○癲屬陰狂屬陽癲多喜而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精蓋爲世所謂重陰者癲重陽者狂是也大槩是熱 癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是爲真病如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癲哭呻吟爲邪所憑非狂也燒蠶帛煎水下方寸匕 卒狂言鬼語針大拇指甲下卽止 風癲引脇痛發則耳鳴用八門冬去心日乾

作末酒服方寸匕 癩証春治之入夏自安宜助心  
氣之藥 陽虛陰實則癩陰虛陽實則狂狂病宜大  
吐下則除之

入方 治癩風

麻仁 四升

右以水六升猛火煮至二升去滓煎取七合旦空  
心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足  
須定凡進三劑愈

又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參 不以多少