

扶壽精方四



中医珍本丛书

扶寿精方（一函四册）

明·吴旻 王来贤辑

中医古籍出版社出版
涑水县上车站印刷厂印刷
北京市新华书店发行
一九八六年九月第一版第一次印刷
统一书号：一四二四九·〇一九三
定价：四八元



新刊續補扶壽精方

卷之下

瘡疾門

五神丸

巴豆

去油五錢

官桂

五錢

白礬

五錢

青黛

五錢

硫黃

五錢

麝

一分東

硃砂

一錢南

白芷

二錢西

黑附子

三分北

雄黃

一錢中

右端午日各為末各包按五方置案上取五
家粽尖午時搗合丸如梧子大每服用一九
絲綿裹男左女右未發日晚塞鼻孔中立效
合藥忌雞犬婦人見用過留俟有病者以醋
畧洗另用綿裹如法治之一丸可愈七八人
愈後忌食雞魚羊三五日

一方用大慈一根搗如泥同猪胆一枚取汁合
麩丸如芡實大硃砂為衣將發時以綿包男
左女右塞孔中效

漂陽馬竹湖先生傳

截瘰丹

端午取獨蒜不拘多少春爛入好黃丹再春
乾濕通勻為丸圓眼核大晒乾收貯三二發
後臨發日雞鳴時一丸畧搥破井水面東服

立止

蒼朮

柴胡

各兩半

川芎

乾葛

黃芩

陳皮

半夏

知母

甘草 各一兩

右剉作十劑生薑三片水一鍾煎七分浸晨
溫服氣弱加人參每劑一錢多服有益

又方

柴胡 錢半

白朮 一錢

芍藥

厚朴

草果 各八分

半夏

檳榔 各七分

青皮

川芎 各六分

陳皮

知母

甘草 各四分

右剉水一鍾生姜三片向東挑枝七箇煎七

分臨發時先服三五劑見效

續方治癰瘰劑

柴胡

蒼朮

蘇葉

檳榔

半尖半圓者

常山黑豆

等分炒去

青皮

陳皮

知母

貝母

草果

甘草

各等分

烏梅

一箇

厚朴

量用

右剉水二鍾煎至一鍾留當發日五更溫服
一日忌茶油膩魚生冷雖用常山以豆炒熟
而檳榔用雌雄相半則有以制常山不至吐
瀉矣

五淋門

附小便不通

治淋方法

如酒後恣慾而得者則小便將出而痛既出

而痒以八正散主之如上盛下虛口苦咽乾煩熱將淋者清心蓮子飲倍加地膚子效

又生用螺螄一碗連壳乾鍋內炒熟淬以好白

酒三碗煮至一碗取螺以針挑肉食仍以此

酒下之食至二三次殊效雖白濁晚卸亦治

又白茯苓去皮剉作錢余大塊四兩用知母貝

母剉開各一兩八錢瓦器水煮至乾去二母

將苓銅器內慢火炒散為末黃臘溶化和如

彈子大每空心食遠嚼一丸蜜湯下

淋莖中疼甘草稍無甘味者水通各五錢食鹽二分半

右剉水煎露一宿空心服畏冷者再溫服

易簡方治血淋用亂髮燒灰存性每一服一錢

空心白滾湯調服

又方用乾柿子燒灰為末每一錢米湯調下

小便不通土狗大者一箇小者二箇炙乾為

細末入水片麝香各少許用小筒或鵝翎管

吹入龜口內少頃氣透自通

有以生明礬末填臍中井水頻以指蘸滴礬
令濕者有以蚯蚓糞朴硝等分調敷小肚者
治小便不通用地膚子一名千頭子即掃帚上
子也每一兩搗為末水一鍾半煎服如春夏
秋只用苗搗爛絞汁一鍾服之立通

又方用滑石二錢甘草五分為末用漿黃米漿
半碗沌熱調服即通

痞塊門

神效阿魏散

治痞有驗



大黃

一兩

阿魏 二錢二分

天竺黃

蘆薈

白殭蚕

各二錢

孩兒茶

甘草

俱各三錢

川山甲

七片炮焦

木鱉

一箇

右為細末每服三錢好酒調服如重車行十

里許濃血化即愈

中翰屠白石方

治痞塊疳積兼噎膈

五靈

炒烟盡研細

阿魏研細等分用雄黃



狗胆汁和丸如黍米大空心唾津送下三

九忌羊肉醋麪

痞膏

桐油 五兩

松香 八兩

當歸 一兩 煮枯去渣

乳香

沒藥 各一兩 將起火

真阿魏 三錢

紅絹攤膏先以生姜煨過擦肌膚后貼膏頻以熱手按磨或炒鹽熨之

折傷門

乳香定痛散 金釵打撲折骨傷損

乳香

沒藥 各二錢

敗龜板

酥炙 晚十兩

紫荊皮 二兩

當歸

續

虎骨

酥炙

川山甲

炒炮

骨碎補

各五錢

半兩錢

五文如無以自然銅一兩醋淬七次

右研細末每服一錢重傷者二錢好酒調下

沒藥丸

打撲傷損筋骨疼痛

乳香

沒藥

川芎

川椒 去目

芍藥

當歸 各五錢

自然銅 二錢五分 醋淬七次

右為細末黃臘二兩化開入藥攪勻丸如彈子大每用一丸好酒煎沸熱服連服一二次
通血散 打撲傷損血汚入心下之立愈

當歸尾

枳壳

木通

澤蘭

大黃

莢仁 各五錢

蘇木

紅花各三錢

右為細末或滴水丸每服二錢好酒下重者
童便合酒下

加味芎歸湯 打跌傷損敗血入胃嘔吐黑血

如豆汁

川芎

當歸

百合

水浸

白芍藥

水浸

荊芥

各二錢

右剉水一鍾酒半鍾煎八分服



又死童子骸骨燬過香瓜子仁炒乾等為細末
好酒下止痛極速

破傷風門

治破傷方

燒魚膠存性研細熱酒服

又南星

半夏

川烏

草烏

天麻

硃砂

雄黃

每服一字

右為細末避風處熱酒調下仍進熱酒取汁