

經方應用



經方應用

秦州武國良簡侯編纂

當歸散類

婦人胎前產後諸病金匱千金主用

當歸散

當歸

芍藥

芎藭

黃芩

白朮

各二。

右為細末每服二。——三、〇一日二回

服改煎劑亦得妊娠常服易產胎無疾苦產後
百病悉主之

證狀表現

原文婦人妊娠宜常服當歸散主

之

立方意義

本方雖未說明証狀就藥物可考
知其主治與本方之大旨當歸有強心補血行血作
用川芎有行滯通絡去瘀作用芍藥有解凝通瘀瀉
火作用三味合用則血之滯者可通血滯而攣結有
痛者可緩因血滯而見貧血之狀者可行可補婦人
胎前血液多有鬱滯現象由鬱滯而生熱熱與濕結
而致氣機不利發生水氣積蓄者有之故以黃芩清
血中之熱白朮行脾中之濕從可知凡妊娠中具有
血液鬱滯而濕熱並見之証當以本方為主治胎前

如是胎後亦如是立方之意蓋在於斯

治療標的 以胎前形瘦有熱濕之証產後有
小便不利之証為主標的而用之

諸家緒論 易簡方治月經三四月不行或一
月再至本方加山茱萸

方氏 丹溪心法附錄此方養血清熱之劑也
瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以
清其源而無患也

金鑑 妊娠無病不須服藥若其瘦而有熱恐
耗血傷胎宜常服此以安之

葉橘泉 瘦人血少有熱有流產癖者產後有熱小便不利者效果極佳

漢方治療各論 妊娠中常服此方則胎氣自調和生產自容易從一月服至七月多得保全難產者亦用

編者按 此方可治妊娠腹筋攣痛及妊娠中有輕微之水氣者當歸芍藥散係從此方產生均有安胎易產之妙用

憑証使用 胎前濕熱產後尿少或腹痛有水氣者



以下係當歸散加減方

具上方証內熱少腹中疔痛有停水之候者去黃芩
加澤瀉茯苓金匱名

當歸芍藥散

當歸

芍藥各一。

茯苓

朮各一三

澤瀉二三

芍藥四八

右為細末一日三回分服或增藥二倍以上以
水二合五勺煎一合去滓一日分三回溫服

証狀表現

原文婦人懷孕腹中疔痛當歸芍

藥散主之又婦人腹中諸疼痛當歸芍藥散主之

補充 當有心悸或心下悸冒眩筋惕肉瞤小便不利腹部軟弱無力左側腹筋攣急之証

立方意義 本方証之腹痛由有貧血狀之瘀血停留腹中而水道受阻故用當歸芍藥行氣治血散瘀為一隊茯苓白朮澤瀉燥濕行水利尿為一隊一以通其血道一以通其水道水血均無所阻滯則由水停所生之眩冒動悸與由血滯所生之腹痛攣急等証自不復存在矣

治療標的 以有腹部疼痛左側腹筋攣急頭眩心悸小便不利等為主標的而用之

諸家經驗談 續建殊錄藝州人某患腹痛來

謁先生自以手按其腹良久曰僕得斯病醫索四方
吐下針灸無不極盡其術然百治無效遷延七年矣
今來浪華請公賜診雖死無怨先生診之自臍旁至
胸下攣急疔痛日夜無間乃與當歸芍藥散三日沈
疔頓去

又 一婦人足指疼痛不得步行一日腹中攣
急上冲於心絕倒不知人事手足溫脈數兩便不通
與當歸芍藥散小便快利色如血諸証頓除

又 浪華一賈人當行路時人誤踏其足遂成

跛躄眾皆以為脚氣因延先生診之無氣短倚息証
腹痛上迫時時上竄神氣將亂乃用當歸芍藥散小
便快利色如皂莢汁躄亦隨愈

險証百問 頃有一婦人患兩脚或一脚酸痛
不能步行數月遂痛近胸腹部而攣痛飲食俱吐小
便不利唇口乾燥氣息短迫人事不知自心下至少
腹手不可近醫以為脚氣投藥數劑無寸效予診之
胸中無動悸短氣有緩急非脚氣冲心証也乃與當
歸芍藥散作湯液與之服三帖痛退腹中雷鳴小便
快利其色紫黑忽知人事好飲不吐翌日腹痛大便

不通兼以消塊丸一大黃芒硝為丸大便下黑血腹滿
頓退服煎劑十餘日行步如常

類聚方廣義 有婦人經斷已三四月診之腹
中攣急胎不應手或腹中疼痛類於血瘀妊否難決
者用此方加大黃則二便快利不過十日腹中鬆軟
矣若懷妊者胎氣速張懷妊已累月腹中攣急者亦
宜此方

又 眼目赤痛其人心下有支飲頭眩涕淚腹
拘攣者宜此方肛門腫痛出水不止者有奇效

湯本求真 婦人反胃及子宮痙攣有宜用本



方者多奇效脫肛若為胃腸筋弛緩之一分証即水不出者用本方有效尤以脫肛腫痛水出不止者有奇效

南拜山氏 用手按患者左右直腹筋見右面不痛或稍痛左面較為緊張而痛臍之周圍或臍下有塊而不堅者不問何病均可用本方此為慢性胃腸痛之適藥也

又 凡婦人之腸胃病貧血性病均甚有效加適宜之酒煎而溫服之

漢方治療各論 當歸芍藥散為妊娠腹痛之



妙劑然妊娠中常服又有安胎易產之妙功貧血虛弱之婦人或妊娠腎有羊水過多之傾向者至分娩時常用之

又 子宮內膜炎非炎証充血之証尿意頻數白帶下或水樣帶下時時腰腹痛貧血手足易冷者用之

青州醫談 世云勞瘵正証雖無效然疑似之勞瘵証者用之甚效其他如腦貧血子宮出血子宮痙攣胃痙攣及鼓脹脚氣等均有效

中國內科醫鑑 本方預防腦溢血有意外之

效

大塚敬節

余嘗觀某醫診斷腎臟炎不浮腫

而貧血心悸眩暈証尿中証明有蛋白質已近一年
所診者為一婦人乃與此方蛋白質漸次消失心悸
眩暈亦止未及二月而全愈

湯本求真醫話

便秘用本方時必加大黃或

黃連解毒丸(即黃連解毒湯為丸)兼用大有效也

諸家緒論

和劑局方當歸芍藥散治妊娠腹

中疼痛心下急滿及產後血暈內虛氣乏崩中久痢
常服通暢血脉不生癰瘍消痰養胃明目益津

皇漢醫學要訣 本方以手足有寒冷之狀而

貧血左側腹直筋攣急者為主要目標

漢法醫典 婦人腰腹痛帶下屢次流產用當

歸芍藥散

中醫診療要覽 此方原來用於女子腹痛但

不僅限於女子亦用於男子其目標即不分男女老

幼有貧血傾向腰腿易冷頭痛頭重小便頻數有時

目眩肩疾耳鳴動悸等肌肉一般軟弱如女性容易

疲勞腹痛起自下腹部有時波及腰部或心下無腹

痛者亦可用之但噁心嘔吐者不可用

又在妊娠中如繼續服用此方可防止諸種
障碍於未然並使產婦早日恢復體力

按 湯本求真大塚敬節等諸人均謂此方為
日常必用者或為散為丸或為煎劑大塚又云若專
用於利尿則去芍藥亦極有效我個人曾用於男子
腹水証婦人經閉証浮腫証等效果可期均以煎劑
內服皆不去芍藥惟於手足冷者令加酒一兩同煎
憑証使用 腦貧血眼疾弱視尤為適應心臟
衰弱衰弱性腳氣慢性胃腸病胃腸痙攣腎臟炎不
妊証流產癖痔疾脫肛及其他婦人諸病此外則治

桂枝茯苓丸適應証之貧血者（漢方新解）亦用於慢性腎炎半身不遂証輕証心臟瓣膜病（中醫診療要覽）其他子宮出血子宮痙攣鼓脹類似勞瘵及預防腦溢血等

妊娠腹痛下血金匱用

芍歸膠艾湯

芍藥 阿膠 甘草各三五 艾葉 當歸各五五

芍藥 七〇 地黃二〇

右細剉以水酒各一合煎一合去滓一日分三

回服用忌酒者可單用水煎加酒服均可

証狀表現 原文師曰婦人有漏下者有半產
後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹
中痛為胞阻膠艾湯主之

補充 當有左側腹筋攣急腹部常軟弱無力
且於下腹部有如覺鈍麻及煩（四肢尤甚）熱之狀（引
皇漢醫學要訣）一云腹部正按不痛斜按則痛者即
本方之腹証也

立方意義 本方証由於出血後血少而有枯
燥之狀故用含有鐵質糖質之地黃與含有糖質之
當歸以生新血開鬱行氣之芎藭以散滯血疏解血