

A Quick - Consultative Dictionaty  
of World Medicinal Plants

# 世界药用植物 速查辞典

肖培根 刘昌孝 主审

江纪武 主编

中国医药科技出版社

A Practical Compendium of Medicines  
of World Medicinal Plants

# 世界药用植物 速查辞典

主编 李时珍 主审 王中  
副主编 王中 王中

中国医药出版社

# 世界药用植物速查辞典

A Quick - Consultative Dictionary of World Medicinal Plants

主 审 肖培根 刘昌孝  
主 编 江纪武

中国医药科技出版社

## 内容提要

本书共收录世界药用植物 28 222 种, 其中我国药用植物约 12 000 余种, 国外药用植物约 16 000 余种。这些药用植物归类于 539 科, 4958 属。科、属、种共计词目 33 671 条。每种药用植物有拉丁学名、中文名称、产地和药用国家、药用部位、作用和用途等。科名有拉丁学名、中文名称、产地、世界属数和种数、中国属数和种数。属名有拉丁学名、中文名称、产地、世界种数、中国种数。正文后有科属表、中文名称索引。本书内容丰富、查找快速, 是目前收录药用植物品种最多的大型工具书。

可供中医药、天然药物、医药学、植物学、生命科学等相关学科的科研、教学、生产、检验、临床、信息、外贸和国际交流工作者参考。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

世界药用植物速查辞典/江纪武主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2015. 2

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7225 - 9

I. ①世… II. ①江… III. ①药用植物 - 世界 - 词典 IV. ①R567. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 295973 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 A4

印张 87

字数 2898 千字

版次 2015 年 2 月第 1 版

印次 2015 年 2 月第 1 版印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7225 - 9

定价 358.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

## 编委会

主 审 肖培根 刘昌孝

主 编 江纪武

副主编 靳朝东 刘永贵 高 颖

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 洁 王 娜 匡美林 刘永贵

江纪武 沈砚青 沈雪砚 张庆荣

陈笔岫 房德敏 钟世红 高 颖

龚苏晓 韩 凤 靳朝东

本书编委会于七八年编成巨著《世界药用植物志》,在付印之前,本人阅读了部分内容,为该书早日出版而感动。相信江纪武先生和他的合作者所编这部较全的世界药用植物工具书一定能为药用植物研究、

有保护和开发利用产生积极的影响。

本书编委会成员

天津中医药大学

2014年10月12日

中国工程院院士

天津药研所所长

天津中医药大学中药学院院长

刘昌孝

2014年10月20日于天津

# 肖 序

药用植物是人类向自然和疾病作斗争的珍贵传统文化知识。在人类进入到高度文明的今天，对它进行调查、整理和综合研究，仍然有十分重要的现实意义。因此，这是一项艰巨和崇高的任务。

“中国正在走向世界，世界正在走向中国”。中国与世界各国在医药、文化、科学、贸易上的交往日益频繁密切，我们需要了解世界上有哪些药用植物，他们最主要的概况是什么。这些知识要求有一本工具书来进行速查，用于指导开展进一步的工作。

江纪武教授从1988年开始编写整理《拉汉药用植物名称》，2005年编写出版《药用植物辞典》，再到现在的《世界药用植物速查辞典》，广收博采，在这个领域辛勤耕耘了30余年，以86岁的高龄为业界贡献了这部巨著。江老的这种坚韧不拔、一丝不苟的精神深深打动了我。这部著作涵盖了世界药用植物28 222种，词目33 671条，因此这部著作要把国际上众多的植物和药用植物学家对植物和药用植物的分类及系统繁杂的观点加以统一实在是件十分困难的事情。为了便于读者查阅，只能采用兼收并蓄的方式，这也是最为实事求是的形式。

本书是中医药、天然药物、生命科学等方面的科研、教学、生产、检验、贸易等工作者的必备参考工具书。

付梓之前，乐为之序。

中国工程院院士

中国医学科学院

药用植物研究所名誉所长

肖培根教授

2014年10月12日

责任编辑 郭静

版式设计 郭静

1. 中国医药出版社

地址 北京市西城区广安门内大街137号

邮编 100053

电话 010-63213221 传真 010-63213221

网址 www.cmppress.com

印刷 北京

定价 48.00元

书号 978-7-104-04111-1

定价 48.00元

印次 2015-03-01

印数 1-10000册

订购 中国医药出版社

书号 978-7-104-04111-1

定价 48.00元

本社图书如存在印刷质量问题，请寄回本社退换

# 刘 序

自古以来,药用植物是世界各国人民用来治疗疾病的源泉。中医药更是中国文化之瑰宝,是维系人民健康的伟大的宝库。

江纪武先生一生积累了大量的世界药用植物资料,为撰写本书奠定了基础。他从20世纪80年代起涉猎药用植物30余年,阅摘各类书刊已达百千种册。近期又参阅了1500余种南美洲阿根廷药用植物资料,为丰富本书增添了新内容。

纵览本书,作者共收载药用植物28222种,其中我国药用植物约12000种,国外药用植物约16000种。这些药用植物归类于539科,4958属。其中,药用植物最多的科为菊科2476种(434属),依次为:豆科1622种(293属);唇形科974种(136属);蔷薇科726种(77属);百合科707种(95属)。药用植物最多的属为乌头属174种,其次为鼠尾草属154种,紫堇属151种,茄属151种,蒿属149种。实属一项巨大的文献工程。

作者为了避免植物一名多物或一物多名,还参考了多种植物命名规范,如综合参考《国际植物命名法规》《中华人民共和国药典》《中国植物志》等工具书,以及在编写说明中提出的四条“名称处理根据的原则”为本书的科学性和严谨性提供了主要规范依据。

作者思索奋斗七八年而成巨篇《世界药用植物速查辞典》,在付印之前,本人阅读了部分内容,为其艰辛劳动所感动。相信江纪武先生和他的合作者所集品种较全的世界药用植物工具书一定能对植物药的科学研究、资源保护和开发利用产生积极的影响。

以此言为序,铭记科学工作者的贡献和喜盼植物药研究的繁荣。

中国工程院院士  
天津药物研究院名誉院长  
天津中医药大学中药学院院长  
刘昌孝  
2014年10月20日于天津

# 前言

自古以来,世界各国人民使用药用植物治疗疾病,从而得以繁衍生息。中国的中医药及民族医药是中国文化之瑰宝。而世界上约有 2000 多个不同的民族,各民族都各自具有其独特的生存环境和民族医药。本书就是将全球各国各民族使用的药用植物汇编成册,以供借鉴和参考。

撰写科技类图书重在素材积累。作者从 20 世纪 80 年代起涉猎了 30 余年,阅摘各类书刊已达百千种册。大凡离我国愈远者,药用植物种与我国差异愈大,南美洲离我国最远就是如此。前不久,有幸得一南美洲阿根廷(离我国最远的国家)药用植物集,约 1500 余种,几乎全部与我国使用的不同,是作者多年来获得药用植物品种最多的一次。虽脱稿在即,仍将其译出并收入本书,为此深感欣慰。

世界维管植物有 807 个科,17 525 属。中国维管植物 353 科,3180 属。《中国植物志》(包括苔藓类)共 301 科,3408 属,31 142 种。本书共收载药用植物 28 222 种,其中我国药用植物约 12 000 余种,国外药用植物约 16 000 余种。这些药用植物归类于 539 科,4958 属。其中,药用植物最多的科为菊科 2476 种(434 属),依次为:豆科 1622 种(293 属);唇形科 974 种(136 属);蔷薇科 726 种(77 属);百合科 707 种(95 属)。药用植物最多的属为乌头属 174 种,其次为鼠尾草属 154 种,紫堇属 151 种,茄属 151 种,蒿属 149 种。

科和属的大小由于分类学家观点不同而有所差异。如恩格勒系统中的豆科,在哈钦松系统中分成 4 个科:蝶形花科、云实科、含羞草科和刺球果科(Krameriaceae Dum.)。一种药用植物亦可以归于不同的科,如龙血树属(*Dracaena* Vand. ex L.)的龙血树(*D. draco* L.)可归于龙血树科、龙舌兰科、石蒜科或百合科。本书为了给出更多的信息资料,兼收并蓄,大部分予以列出。

药用植物名称要求不相重复,即一名一物,以避免一名多物或一物多名。《国际植物命名法规》制定了十分严格的规则,以保证学名不相重复及其他问题。但植物的中文名称,因为没有公认的统一命名法规,一名多物或一物多名的现象是很普遍的。《中国植物志》是我国权威的植物类工具书,重名现象甚少,是本书的主要依据。其中有个别重名:如 *Lilium brownii* F. E. Brown ex Mieliez 和 *Crotalaria sessiliflora* L. 均叫野百合,本书按属名优先原则,*Lilium* L. 为百合属,野百合名用于前者,后者改名为兰花猪屎豆。*Melastoma candidum* D. Don 和 *Paeonia delavayi* Franch. 均叫野牡丹,前者为野牡丹属,保留原名,后者改成滇牡丹。另有 *Valerianaceae* Batsch 《中国植物志》第 73 卷第 1 分册名败酱科,而《中国植物志》第 1 卷(总论)名缬草科。因 *Valeriana* L. 为缬草属,故本书用缬草科。

本书收载的中国植物名称以《中国植物志》为基础,国外药用植物,除书刊和互联网上能找到少数中文名称外,大部分都是由作者拟出中文名称,本应在这些拟名后注上“拟”字,但由于数量太大而省略了。由于国外的药用植物的形态我们不了解,难以从形态特点上拟出中文名称,主要根据种加词的词义或音译拟名。因此这些中文名称不一定得体,希望读者多提建议,以趋完善。本书提供的药用植物拉丁学名 33 671 个,中文名称 39 083 个,可为药学术语夯实基础,促进药学术语规范化工作的发展和提高。

文化建设与经济建设是并行的两条腿,缺一不可,没有经济实力,就没有竞争力。没有文化繁荣,就没有发展前景。改革开放后 30 年,经济以两位数速度增长,但近年来,经济发展逐渐减慢,究其原因,除经济因素外,与文化(包括科技文化和信息)也有关系。在经济全球化的今天,我们可以用先进的科技文化,促进经济的发展,从经济大国提升为经济强国,有更多的名牌产品行销世界,在国际上争取市场标准化的起草权、主导权和话语权,赢得标准,就赢得市场。就我们药学界而言,药学经济和药学文化应双翼齐飞,力创佳绩,大力弘扬中华文化,为国争光。

有鉴于此,本书编委会多方收集资料数百种,整理奋斗八年,终于集成《世界药用植物速查辞典》这本工具书。惟恐由于篇幅较大,时间和水平有限,其中缺点错误仍然不少,希望各位专家学者及广大读者提出意见批评指正。

江纪武

2014 年 3 月 20 日

## 编写说明

一、本书共收载世界药用植物 28 222 种，其中我国药用植物约 12 000 种，外国药用植物约 16 000 种。加上科名、属名和异名，共有词目 33 671 条。

二、正文按药用植物拉丁学名的字母顺序排列，每种药用植物，有拉丁学名、中文名称、产地和药用国家、药用部位、作用和用途等项目。科名条目下有拉丁学名、中文名称、本科属数、种数、产地。属名条目下有拉丁学名、中文名称、所属科名、本属种数、产地。但在属的异名条下，不再介绍种数、产地，而会在括号中给出相同属名，以便参考，并用等号表示相等。如：*Plectranthus* L'Herit. [= *Rabdosia* (Blume) Hassk.] 香茶菜属，唇形科。种数、产地参见 *Rabdosia* (Blume) Hassk. 处。

三、植物名称处理的原则：

1. 凡《中华人民共和国药典》收载的名称，均以药典为准，将其他主要名称置于括号内作为异名。

2. 凡国内其他药用植物，均以《中国植物志》(中、英文版)为准，如中、英文版本名称各异，则以修改的英文版为准。

3. 国外药用植物则以引用的文献为准。某些国际上常用的药用植物则以通用名为准。

4. 个别国际上常用的药用植物，如名称较为混乱者，则由编者予以说明。

四、一种植物，常因分类群大小的不同，可以列于不同的科。如龙血树属 (*Dracaena* Vand. ex L.)，可列于龙血树科(龙舌兰科、石蒜科、百合科)，这 4 科按分类从小到大排列，这里并无正名、异名之分。

五、一个属，其所列科的中文名称有多个时，按属名优先的原则，采用与属名一致的科名，如：缬草属 (*Valeriana* L.) 用缬草科 (*Valerianaceae* Batsch)，而不用败酱科。

六、科的拉丁学名，国内书刊上多缺定名人，本书为了与属、种相一致，均加上了定名人。如大戟科的学名为：*Euphorbiaceae* Juss.。

七、植物定名人与植物的属名和种加词同样重要。定名人的姓在两个音节以上时采用缩写法是可以理解的。但如何缩写，书刊上并不一致。如 L. 是指林奈人人皆知。但缩写成一个字母太多时，如 B., H., R., P. 以及两个字母的 Br., Sm., Sw. 等等，就难以确认了。本书采用两条办法：

1. 单音节词不缩写，如：*Bunge* (Bge.), *Kotschy* (Ky.), *Kuntze* (Ktze.), *Ruiz* (R.), *Smith* (Sm.), *Swartz* (Sw.)。

2. 在西文中，缩写点与句号是一样的，都是黑圆点。当定名人在句末时，这时的小圆点是缩写点还是句号就茫然了。本书为了减少缩写点的使用率，仅缩减两个字母时不缩写。如 *Baillon* (Baill.), *Benth* (Benth.), *Engler* (Engl.), *Forster* (Forst.), *Lindley* (Lindl.), *Meyer* (Mey.), *Oliver* (Oliv.), *Pavon* (Pav.), *Pilger* (Pilg.), *Poiret* (Poir.), *Schlechter* (Schltr., Schlecht.), *Schultes* (Schult.), *Urban* (Urb.)。

八、“*Tetragonia* L. 番杏属, *Tetragoniaceae* Link 番杏科(狭义)”见《中国被子植物科属综论》，本书从之。这样，番杏属和番杏科(狭义)词根均为 *Tetragonia*，同词根同译符合植物名称规范化的原则。本书以番杏科(狭义)和番杏科并用之。

九、根据《中国植物志》第 25 卷第 1 分册，何首乌已从蓼属分出列入何首乌属 (*Fallopia* Adanson)，现何首乌的拉丁学名为 *Fallopia multiflora* (Thunb.) Harald. (*Polygonum multiflorum* Thunb.)。同此，《中国植物志》第 10 卷第 2 分册将荻从芒属分出列入荻属 (*Triarrhena* Nakai)，现荻的拉丁学名为 *Triarrhena sacchariflora* (Maxim.) Nakai (*Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth. ex Hook. f.)。

十、《中国植物志》第1卷: Flacourtiaceae 刺篱木目, Flacourtiaceae DC. 刺篱木科和 Flacourtia Comm. ex L'Herit. 刺篱木属, 本书从之。

十一、Nyctanthus 夜花属, 木犀科(马鞭草科)。有人将此属从木犀科移至马鞭草科。还有人将此属升格成科: Nyctanthaceae J. Agardh 夜花科。

十二、网上有: Cabomba Aublet 水盾草属, Cabombaceae A. Rich. 水盾草科, 本书从之。Cabombaceae A. Rich. 另一中文名莼菜科, 置于水盾草科之后, 为水盾草科(莼菜科)。

十三、“三桠苦”的拉丁学名在《中国植物志》为 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. 本书从之。但《中草药》2011, 42 (10): 1891-1893 “三桠苦的化学成分研究”一文言及2008年出版的《中国植物志》(外文版)学名为 *Melicope pteleifolia* (Cham. ex Benth.) Hartley。本书将后者置于前者后的括号中。

十四、*Jatropha curcas* L. 中文有二: 麻风树和麻疯树。树枝具突起叶痕, 状似麻风疙瘩。叶和树皮能治麻风病, 因此本书用麻风树作正名。

十五、鹅肠菜属鹅肠菜有两种植物同名。一种为藻类荃藻科鹅肠菜属鹅肠菜 (*Enderachne binghamiae* J. Ag.); 另一种为种子植物石竹科鹅肠菜属鹅肠菜 *Myosoton aquaticum* (L.) Moench, 为了区别, 前者中文名加注“藻”字, 为鹅肠菜(藻)。



## A

**Aaronsohnia Warb. et Eig** 阿伦菊属 菊科 2 种, 产中东和北非。

**Aaronsohnia factorovskyi Warb. et Eig** 阿伦菊 约旦传统药。地上部: 浸剂用于驱风、急腹痛。

**Abelia R. Brown** 六道木属 忍冬科 30 种, 主产亚洲。中国 9 种, 主产中部、西南部和东南部。

**Abelia biflora Turcz.** 六道木 产华北及辽宁、河南。果实: 祛风湿、消肿毒。用于风湿筋骨疼痛、痈毒红肿。

**Abelia chinensis R. Brown** 糯米条 产华东、中南和西南地区。茎、叶、全草: 清热解毒、止血。用于泄泻、小儿疳虫蚀齿、跌打损伤、流行性感胃。外用治小儿口疮、腮腺炎。

**Abelia dielsii (Graebn.) Rehd.** 南方六道木 产西南至华东。果实: 可治风湿痹痛。

**Abelia engleriana (Graebn.) Rehd.** 通梗花 (短枝六道木) 根: 理气止痛、清热燥湿。用于牙痛、高热、火眼。果实、花: 祛风湿、解热毒。用于风湿筋骨疼痛, 外用于疮疮红肿。

**Abelia macrotera (Graebn. et Buchw.) Rehd.** 二翅六道木 产西南和华中地区。根、枝、叶: 祛风湿、消肿毒、清热燥湿、理气止痛。用于风湿关节痛、跌打损伤、牙痛、高热、火眼。

**Abelia parvifolia Hemsl.** 小叶六道木 根、叶、枝、全株: 清热解毒、理气止痛、止血止泻、燥湿。用于高热牙痛、火眼。果实: 祛风湿、消肿解毒。用于风湿筋骨痛。

**Abelmoschus Medik.** 秋葵属 (黄葵属) 锦葵科 15 种, 主产非洲、亚洲。中国 4 种, 产西南至台湾。

**Abelmoschus crinitus Wall.** 长毛黄葵 产西南至海南。根: 补脾、化痞、通经、消食。用于胸腹胀满、消化不良、喉痛、痈疽。花、叶: 用于烧、烫伤、皮肤红热灼痛。籽: 用于血淋。

**Abelmoschus esculentus (L.) Moench** 咖啡黄葵 产长江以南地区。根: 止咳。树皮: 通经、用于月经不调。果实: 用于淋病、喉痛。种子: 催乳、用于乳汁不足。全株: 清热解毒、润燥滑肠。

**Abelmoschus ficulneus (L.) Wight et Arn.** 榕状秋葵 印度、印度尼西亚苏门答腊药用植物。叶: 与盐水共研口服治疗腹泻。根: 煎剂口服治疗缺钙, 外敷治疗蝎子螫伤。

**Abelmoschus manihot (L.) Medicus** 黄蜀葵 产西南和中南地区。根: 利水、散瘀、解毒。茎或茎皮: 活血、除邪热。叶: 解毒托疮、排脓生肌。花: 通淋、消肿、解毒。

种子: 健胃润肠、利水、通乳、消肿。

**Abelmoschus manihot (L.) Medicus var. pungens (Roxb.)**

**Hochr.** 刚毛黄蜀葵 产西南至台湾。根: 清热利湿。用于水肿、尿路感染。叶: 消肿止痛。用于疮疽、骨折、跌打损伤。

**Abelmoschus moschatus (L.) Medicus** 黄葵 产东南部。

根、叶、花: 清热解毒、利湿、润肠通乳、拔毒排脓。根: 用于肺热咳嗽、产后乳汁不通、大便秘结、阿米巴痢疾、尿路结石。叶: 外用于痈疮肿毒、骨折。花: 外用于烧烫伤。

**Abelmoschus muliensis Feng** 木里秋葵 分布于四川。根: 通经。用于月经不调、闭经、痛经。

**Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.** 箭叶秋葵 产广东、广西、贵州、云南。全株、根、叶: 清热解毒、滑肠润燥。用于风湿痛、肺结核、肺燥咳嗽、产后便秘、痈疮肿毒。种子: 用于便秘、水肿、乳汁缺少、耳聋。

**Abies Miller** 冷杉属 松科 50 种, 主产欧洲、亚洲、美洲。中国 19 种, 产秦岭和长江以南地区。

**Abies alba Miller** 欧洲冷杉 本属模式种。欧洲药用植物。制造松节油作药用。

**Abies balsamea (L.) Miller** 胶枞 (香脂冷杉) 美洲药用植物。制造加拿大香脂, 用于民族药。树皮: 煎剂治肾病。

**Abies chensiensis Van Tieghem** 秦岭冷杉 果实: 平肝息风、调经活血、止血、安神定志。用于高血压症、头痛、头晕、心神不安、月经不调、崩漏带下。

**Abies cilicica (Ant. et Kotschy) Carr.** 西里西亚冷杉 (土耳其冷杉) 用于扭伤、骨折、背痛、风湿病。

**Abies delavayi Franch.** 苍山冷杉 产云南、西藏。球果、种子: 理气散寒、用于胃脘气痛、胸腹冷痛、疝气。

**Abies fabri (Mast.) Craib** 冷杉 产四川。果实: 理气散寒、止痛。

**Abies fargesii Franch.** 巴山冷杉 产河南至四川。球果: 平肝息风、调经活血、止血、安神定志。用于治疗高血压症、头痛、头晕、心神不安、月经不调、崩漏、白带。

**Abies faxoniana Rehd. et Wils.** 岷江冷杉 产甘肃、四川。果实: 祛风湿、止血。

**Abies fraseri (Pursh) Poir.** 弗氏冷杉 (福莱胶枞) 油树脂为加拿大香脂的代用品。叶: 用于制作药枕。

**Abies grandis Lindley** 巨冷杉 (北美冷杉) 加拿大温哥华岛印第安人药用植物。叶: 茶饮用于感冒。茎皮: 浸剂口

服用于内伤。

*Abies holophylla* Maxim. 辽东冷杉 产东北。枝、叶：民间熏洗外用于风湿。

*Abies lasiocarpa* (Hooker) Nuttall 洛杉矶冷杉 美国和加拿大药用植物。杉针：焚香防治不安、惊厥。树脂：油膏敷治眼病、创伤、溃疡。枝：煎剂口服治疗咳嗽。内皮：煎剂口服治疗肺结核。

*Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. 臭冷杉 产东北及河北。树皮、枝叶：长白山民间外洗用于腰腿痛。

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach 高加索冷杉 产亚洲、欧洲。为土耳其药用植物。焦油：用于治创伤和脓疮。

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach ssp. *bornmuelleriana* (Mattf.) Coode et Cullen 博米勒冷杉 土耳其药用植物。叶：用于治疗结核病。

*Abies pectinata* DC. 梳齿冷杉 法国药用植物。花蕾：口服用于发汗、祛痰、利尿、润滑。树脂：外敷用于风湿、消散。

*Abies pindrow* Royle 印度冷杉 印度药用植物。叶：提取物用于治疗发热、呼吸道感染等。

*Abies religiosa* (H. B. K.) Schlechter 神圣冷杉 (墨西哥冷杉) 墨西哥药用植物。用于制作香膏剂。

*Abies sibirica* Ledeb. 新疆冷杉 产新疆。树脂：舒筋活络。果实：祛痰、止咳、平喘。

*Abies spectabilis* (D. Don) Spach 西藏冷杉 产西藏南部。松脂：治肾炎、淋病。

*Abies squamata* Mast. 鳞皮冷杉 产四川、西藏。树脂：用于风寒湿痹、疮疥溃烂、久治不愈、关节积黄水、骨骼扭伤。

*Abies webbiana* Lindley 韦布冷杉 印度药用植物。叶：用于治疗咳嗽、慢性支气管炎、粘膜炎。

*Abildgaardia* Vahl (= *Fimbristylis* Vahl) 飘拂草属 莎草科

*Abildgaardia ovata* (Burm. f.) Kral 卵形飘拂草 阿根廷药用植物。根：用于治疗头痛。

*Abronia* Juss. 美花莉属 (三翼萼属、叶子花属) 紫茉莉科 35 种，产美国、墨西哥，草本。

*Abronia fragrans* Nuttall 芳香美花莉 美国印第安人药用植物。花：口服用于治疗胃痛。

*Abronia maritima* Nuttall 海滨美花莉 (红沙地马鞭草) 墨西哥药用植物。根皮：煎剂口服促进产后胎盘排出体外。美国印第安人药用植物。花：口服治疗胃痛。

*Abrus Adanson* 相思子属 蝶形花科 (豆科) 12 种，产热带地区。中国 4 种，产华南。

*Abrus cantoniensis* Hance (*A. fruticosus* Wall. ex Wight et Arn.) 广州相思子 (广东相思子) 产广东、广西。全草：清热解毒、利湿、活血祛瘀、舒肝止痛。用于胁肋不舒、胃脘胀痛、黄疸、慢性肝炎、传染性肝炎、肝硬化腹水、风湿痛、疮疥、乳腺炎。

*Abrus mollis* Hance 毛相思子 产福建到广西。全草：清热解毒、利湿、消积解暑。可用于治疗传染性肝炎、小儿疳积。外用治疗烧伤、烫伤、疮疥。

*Abrus precatorius* L. 相思子 产云南到台湾。种子：拔毒消肿、催吐、杀虫。用于治疗疥癣、痈疮、湿疹。根、茎叶：生津润肺、清热解毒、利尿。用于咽喉痛、肝炎、咳嗽痰喘。

*Abrus precatorius* L. ssp. *africanus* Verdc. 非洲相思子 非洲津巴布韦药用植物。用于治疗泌尿系统血吸虫病。

*Abrus precatorius* L. var. *alba* 白相思子 印度药用植物。叶：用于治疗水疱。根：提取物口服用于增强男女性欲。

*Abrus pulchellus* Wall. ex Thwaites 美丽相思子 产云南西双版纳、思茅、德宏。根：治黄疸型肝炎、外感风热。

*Abrus sandwithiana* Krukoff et Barneby 桑威相思子 产巴西亚马逊地区。用于消炎结痂剂。

*Abrus schimperiana* Hochst. ex Bentham 希氏相思子 坦桑尼亚药用植物。叶：茶剂口服治疗癫痫。

*Abuta Aublet* 阿布藤属 (阿卜他属) 防己科 35 种，主产南美洲。

*Abuta grandiflora* Mart. 大花阿布藤 树皮：秘鲁药用植物。浸剂口服用于利尿、糖尿病、子宫感染。

*Abuta grandifolia* (Mart.) Sandwith 大叶阿布藤 秘鲁、哥伦比亚药用植物。茎、茎皮：磨碎煎服用于治疗胃溃疡、伤寒、肺结核、结膜炎、子宫感染。叶：治疗疟疾。南美洲用于制备箭毒。

*Abuta grisebachii* Triana et Planchon 格氏阿布藤 产巴西亚马逊地区。用于制作箭毒。

*Abuta obovata* Diels 倒卵阿布藤 产拉丁美洲，为圭亚那等国印第安民族药。用于背痛。

*Abuta rufescens* Aublet 红阿布藤 秘鲁、巴西药用植物。茎皮：用于治疗泌尿系统疾病、糖尿病、胃痛、溃疡、肝病、疟疾。

*Abuta sandwithiana* Krukoff et Baneby 桑氏阿布藤 圭亚那药用植物。茎枝：用于治疗牙痛、龋齿。

*Abutilon* Miller 苘麻属 锦葵科 150 种，产热带和亚热带地区。中国 9 种，全国广布。

*Abutilon grandiflorum* G. Don 大花苘麻 坦桑尼亚传统药。用于治疗疟疾。

*Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet 大叶苘麻 阿根廷药用植物。根、茎皮、叶、花：用于解热、利尿、健胃、驱虱。

*Abutilon herzogianum* R. E. Fries 赫佐格苘麻 玻利维亚传统药用植物。嫩叶：口服用于治疗腹泻、痢疾。

*Abutilon hirtum* (Lamk.) Sweet 恶味苘麻 产云南金平、元江。根、种子：健脾消食、利水消肿、治饮食积滞、脾虚水肿。

*Abutilon indicum* (L.) Sweet 磨盘草 产福建到云南。根、种子：散风、清血热、开窍活血、滑肠通便、利尿下乳。

用于感冒、久热不退、耳鸣、耳聋、肺结核、小便不利。根：用于泄泻、疝气、淋证、臃肿、疔腮。种子：用于便秘、水肿、乳汁少、耳聋。

**Abutilon indicum (L.) Sweet var. forrestii (S. Y. Hu)**

**Fang** 小花磨盘草 产四川、云南。根、种子：辛、甘、寒，散风清血热、开窍活血、滑肠通便、利尿下乳。根：用于泄泻淋证、疝气、痈肿、瘾疹、疔腮。种子：用于便秘、水肿、乳汁少、耳聋。

**Abutilon indicum (L.) Sweet var. guineense (Schumach.)**

**Feng** 几内亚磨盘草 分布中国台湾、非洲药用植物。全株：用于耳聋、耳鸣、重听。

**Abutilon mauritianum (Jacq.) Medic.** 毛里求斯苘麻 乌干达药用植物。叶：口服治疗蛔虫病。

**Abutilon molle (Drtega) Sweet** 软苘麻 美国夏威夷药用植物。花、根皮：用于治疗胃病。

**Abutilon paniculatum Hand.-Mazz.** 圆锥苘麻 产云南。全株：清热消炎、补肾。治感冒发热、腮腺炎、耳鸣、甲状腺肿大、脑神经衰弱。

**Abutilon pauciflorum A. St.-Hil.** 少花苘麻 阿根廷药用灌木。叶、茎：用于治疗咳嗽。

**Abutilon sinense Oliv.** 华苘麻 产中南及西南各省。根皮：清热解毒、消炎、接骨。用于肝炎、淋巴腺炎、乳痈、疮疖、骨折、脚癣。

**Abutilon striatum Dicks.** 金铃花 产辽宁至云南。花：清热解毒、活血。叶：活血。用于治疗疔痈肿毒、跌打损伤。

**Abutilon terminale A. St.-Hil.** 顶生苘麻 阿根廷药用植物。全株：用于治疗咳嗽。

**Abutilon theophrastic Medic.** 苘麻 产中国。种子、全草：解毒消肿、止痢。用于治疗赤白痢疾、眼翳、痈肿、瘰癧、痈疽、疮毒、中耳炎、耳鸣、耳聋、关节酸痛。

**Abutilon trisuleatum (Jacq.) Urban** 三沟苘麻 产美洲墨西哥。叶：用于小儿气喘。

**Acacia Miller** 金合欢属 含羞草科(豆科)700种，产热带和亚热带。中国16种，产华南。

**Acacia abyssinica Hochst. ex Benth.** 埃塞俄比亚金合欢 乌干达兽药用植物。树皮、根、块茎：蛇咬伤、皱皮病。

**Acacia acapulcensis Kunth** 阿卡金合欢 墨西哥、巴西药用植物。树皮：用于收敛。

**Acacia adsurgens Maiden et Blakely** 上升金合欢 澳大利亚药用植物。茎、叶：用于治疗头痛。

**Acacia albicans Kunth** 白金合欢 墨西哥药用植物。果实：用于治疗痢疾。干叶粉：泥剂外敷治疗创伤。

**Acacia albicorticata Burkart** 白树皮金合欢 玻利维亚、阿根廷药用植物。花：糖浆剂口服治疗腹泻、咳嗽、支气管炎。树皮：用于治疗创伤、咽喉痛。

**Acacia albida Dil. ssp. raddiana (Savi) Brennan** 拉迪金合

欢 阿尔及利亚传统药用植物。树皮、果实、种子：口服用于治疗发热、气管炎、寒颤、糖尿病。

**Acacia ancistrocarpa Maiden** 钩果金合欢 澳大利亚植物药。治头痛、风湿、剑伤、防腐。

**Acacia angustissima (Miller) Kuntze** 极狭金合欢 墨西哥传统药。用于治疗肠胃道疾病的止泻药。

**Acacia aroma Gillies ex Hooker et Arn.** 香金合欢 阿根廷、玻利维亚药用植物。根：糊剂外敷用于消毒、肿胀。树皮：用于治疗痢疾、疖子、伤口感染、防治流感。枝顶：用于发热、肝病、充血、止咳。

**Acacia asak Willd.** 阿萨克金合欢 也门药用植物。茎皮：用于胃溃疡、胃痛、皮肤病。

**Acacia atramentaria Benth** 阿根廷金合欢 阿根廷药用植物。叶、茎皮、种子：用于收敛、咳嗽、风湿、创伤。

**Acacia auricaliformis A. Cunn. ex Benth.** 大叶相思(耳状金合欢) 原产澳大利亚及新西兰。广西、广东、福建有引种。澳大利亚用于治风湿肿胀。

**Acacia beauverdiana Ewart et Sharman** 博维金合欢 澳大利亚植物药。用作镇咳剂。

**Acacia benthami Meissn.** 本氏金合欢 印度药用植物。种子：用于降血糖。

**Acacia bivenosa DC.** 二脉金合欢 澳大利亚药用植物。叶：用于治疗感冒、咳嗽。

**Acacia bonariensis Gilles ex Hooker et Arn.** 布那金合欢 阿根廷药用植物。茎皮、根：用于清创、结痂、梅毒。

**Acacia brerispica Harms** 短穗金合欢 肯尼亚、坦桑尼亚民族药。根：煎剂口服用于胃痛、腹泻、驱虫、咳嗽、催欲、妇女不孕、毒蛇咬伤。

**Acacia bussei Harms ex Sjoestedt** 小金合欢 索马里民族药。鲜根：煎剂口服治疗胃炎、阴囊肿、睾丸炎。根：粉末拌粥吃治疗妇女不孕。茎皮：煎服治疗咳嗽。

**Acacia caesia (L.) Willd.** 尖叶相思(尖叶印度相思树) 产云南蒙自、勐腊、景洪。茎叶：印度用于支气管、咳嗽、瘰癧、麻疹、天花、肋膜炎。

**Acacia caffra (Thunb.) Willd.** 卡夫金合欢 南非民族药。叶：煎剂口服治疗发热、感冒。

**Acacia campylacantha Hochst.** 弯刺金合欢 乌干达、尼日利亚民族药。根：浸剂口服治疗结核病。枝：口嚼治疗咽喉肿痛、溃疡。

**Acacia catechu (L. f.) Willd.** 儿茶 产浙江至云南。枝茎干浸膏：清热生津、收湿、生肌、敛疮。用于治疗痰热咳嗽、口渴、急性扁桃体炎、湿疹、口疮、痔疮、痢疾、肺结核咯血、跌打损伤、外伤出血、烧烫伤、水肿、宫颈糜烂、溃疡不敛。

**Acacia catechu (L. f.) Willd. var. wallichiana (DC.) P. H. Huang** 无刺儿茶 用心材水煎汁液浓缩制成的干浸膏。清热生津、化痰敛疮、生血。用于水泻、肠黏膜炎、口腔破溃、湿疹、咳嗽、刀伤出血。

**Acacia cathbertsonii** Luehm. 卡伯金合欢 澳大利亚药用植物。用于治疗头痛、牙痛、风湿病。

**Acacia cavenia** (Mol.) Mol. 加芬相思树 阿根廷、智利民族药。叶：煎服治疗腹泻、咳嗽、气喘、百日咳。种子：口服作咖啡代用品，用于利尿、膀胱疾病、无尿症、血尿、阴道真菌病。根、花：煎剂外用治疗挫伤、创伤、皮肤病、毒蛇咬伤。

**Acacia cavenia** (Mol.) Mol. var. **microcarpa** (Speg.) **Bur-lart ex Ciald.** 小果金合欢 阿根廷药用植物。叶：外用于治疗创伤。

**Acacia cavenia** (Mol.) Mol. var. **stenocarpa** (Speg.) **Bur-lart ex Ciald.** 狭果金合欢 阿根廷药用植物。叶：煎剂口服用于腹泻、止咳、百日咳。

**Acacia confusa** Merr. 台湾相思 产中国台湾至云南。枝、叶：去腐生肌。用于治疗疮疡。嫩芽：用于跌打损伤。

**Acacia constricta** Benth. 收缩金合欢 墨西哥民族药。种子、叶：煎剂口服用于治疗翻胃、腹泻。

**Acacia cookii** Safford 库克金合欢 危地马拉药用植物。茎皮、花：用于腹泻、痢疾、胃肠疼痛。

**Acacia cornigera** (L.) Willd. 牛角相思树 墨西哥民族药。叶、枝：浸剂口服用于治疗腹泻。树皮：制剂用于控制分娩出血、臭虫咬伤。

**Acacia cyanophylla** Lindley 蓝叶金合欢 墨西哥栽培。种子：用作幻觉剂（魔术）。

**Acacia cyclops** A. Cunn. 巨相思树 墨西哥栽培。果实：用作幻觉剂（魔术）。

**Acacia dealbata** Link 银荆（银儿茶） 产云南昆明，祥云引种。树胶：代阿拉伯胶用。

**Acacia decurrens** Willd. 线叶金合欢（下延金合欢） 澳大利亚土著居民使用的植物药。可代替阿拉伯胶应用。树皮：收敛。用作收敛剂。

**Acacia decurrens** Willd. var. **mollis** Lindley 澳洲金合欢 产广西、云南。树胶：可代阿拉伯胶用。

**Acacia delavayi** Franch. 光叶金合欢（酸格刺） 产广西、贵州、云南。根、嫩枝、果实：消炎、健胃、止呕、解毒。枝叶：用于妊娠呕吐。根：用于腮腺炎、乳腺炎、扁桃腺炎。

**Acacia drepanolobium** B. Y. Sjostedt 镰荚金合欢 乌干达兽用药用植物。根：用于腹泻。树皮：用于蛇咬伤、牛瘟。

**Acacia edgeworthii** T. Anderson 埃氏金合欢 索马里药用植物。叶：口服治疗阳痿，外敷治疗创伤。

**Acacia elatior** Brenan ssp. **turcanae** Brenan 图湖金合欢 肯尼亚、埃塞俄比亚药用植物。茎皮：用于泡茶饮服。

**Acacia etbaica** Schweinf. 埃贝金合欢 埃塞俄比亚药用乔木。树胶：可食，用作口嚼胶。叶、树皮：口服用于治疗扁桃腺炎、淋病。

**Acacia falcata** Willd. 镰刀状金合欢 澳大利亚药用植物。

枝干、果汁：用于治疗皮肤病、疥癣。

**Acacia farnesiana** (L.) Willd. 金合欢（鸭皂树） 产浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、云南。全株：消肿排脓、收敛止血。煎汁可制儿茶。用于治疗跌打损伤、外伤出血、肺结核、冷性脓肿、风湿性关节炎、疟疾、眼痛。

**Acacia ferruginea** DC. 锈色金合欢 产墨西哥。茎皮：煎剂治疗蝎蛰伤。印度用木材油治疗疥疮、癌症。

**Acacia gerrardii** Benth. 杰氏金合欢 乌干达兽用药用植物。树皮：用于咳嗽。

**Acacia glaucophylla** Stend. ex A. Rich. 灰叶金合欢 坦桑尼亚药用植物。叶：燃烟吸入治疗癫痫。

**Acacia goetzei** Harms 戈策合金欢 非洲坦桑尼亚药用植物。树皮：用于治疗咳嗽、胸痛。

**Acacia gummifera** Willd. 摩洛哥橡胶树 摩洛哥药用植物。树脂：用于止咳、气管和肺部感染。

**Acacia hindsii** Benth. 亨兹金合欢 墨西哥药用植物。有解痉作用，治疗胃肠道疾病。

**Acacia hockii** De Wild. 霍克金合欢 肯尼亚、乌干达民族药。树皮：煎剂口服治疗胃痛、腹泻，外洗治疗麻疹、肿胀。花：粉末茶饮治疗黄疸、煎剂口服治疗贫血、小儿急腹症。根：粉末口服治疗腹泻、梅毒。叶：浸剂口服治疗疟疾、推入阴道、直肠治赘肉。

**Acacia holosericca** A. Cunn. ex G. Don 细丝毛金合欢 澳大利亚药用植物。用于治疗喉炎。

**Acacia horrida** Willd. 刺金合欢（非洲橡胶树） 南部非洲药用植物。茎皮渗出物用于制胶。

**Acacia implexa** Benth. 轻木相思树（纵错金合欢） 澳大利亚药用植物。用于治疗皮肤病、麻风。

**Acacia inaequilatera** Domin. 不等边金合欢 澳大利亚药用植物。用于治疗皮肤病、溃疡。

**Acacia intsia** (L.) Willd. 臭菜藤（藤相思树） 中国台湾药用植物。花：用于月经不调。荚果：烧灰，外用于肤痒。茎叶：避孕、截疟。

**Acacia ixophylla** 艾克叶金合欢 澳大利亚药用植物。用于治疗皮肤病。

**Acacia kamerunensis** Gand. 喀麦隆金合欢 加纳等国用于发热、睾丸炎。

**Acacia karroo** Hayne 卡路金合欢 津巴布韦药用植物。用于治疗泌尿系统血吸虫病。

**Acacia kempeana** F. Mueller 肯普金合欢 澳大利亚民族药。树皮、叶：用于治疗严重感冒、胸部感染。茎皮：药液洗治皮肤疾病。

**Acacia kirkii** Oliver 柯克金合欢 坦桑尼亚民族药。根、根皮：浸剂口服用于胃病、妇女不孕、癌症。茎皮：用于背痛。

**Acacia koa** A. Gray 柯阿金合欢 夏威夷药用植物。叶：用于卧病在床者。

**Acacia koaia** A. Gray 柯雅金合欢 夏威夷药用植物。叶：用于治疗皮肤病。

**Acacia laeta** R. Brown 愉快金合欢 产非洲苏丹。胶：有收敛作用。

**Acacia leptocarpa** A. Cunn. ex Benth. 细果金合欢 澳大利亚药用植物。用于润肤、治眼疾。

**Acacia leucophloea** (Roxb.) Willd. 白韧金合欢 印度民族药。茎皮：浸剂口服用于治疗毒蛇咬伤、月经病，性交前半小时口服用于避孕。树胶：男人口服增强性欲。叶：口服治疗尿道出血。

**Acacia ligulata** Cunn. Ex Benth. 具舌金合欢 澳大利亚植物药。用于治疗咳嗽，骨折用作支撑剂。

**Acacia lutea** (Miller) Britton 深黄金合欢 用于发热、腹泻、痢疾、溃疡、坏疽、体弱、衰老。

**Acacia lysiphloia** Cunn. ex Benth. 松皮金合欢 澳大利亚药用植物。用作镇咳药、解热药。

**Acacia macracantha** Homb. et Bonpl. et Willd. 大刺金合欢 厄瓜多尔、多米尼加药用植物。茎皮：煎剂口服治疗肾病、结膜炎、疝气、脱垂。果实：泡茶喝治疗月经过多。

**Acacia macrothyrsa** Harms 大锥花金合欢 乌干达民族药。根：抽烟提神，粉末口服治疗癫痫。

**Acacia martii** Benth. 马特金合欢 阿根廷药用植物。叶：用于治疗风湿病。

**Acacia mearnsii** De Wild. 黑荆树 澳大利亚药用植物。树胶：含鞣质，用于收敛和提取阿拉伯胶。

**Acacia megaladena** Desv. 钝叶金合欢 产云南、台湾。茎叶：避孕、截瘫。

**Acacia melanoxylon** R. Brown 黑木金合欢 澳大利亚土著居民使用的植物药。用于收敛止血、止瘙痒。

**Acacia mellifera** (Vahl) Benth. 具蜜金合欢 索马里、肯尼亚、坦桑尼亚民族药。茎皮：用于发热、肺炎、胃病、疟疾、癌症、耳炎、乳腺炎、梅毒、不育。根：煎剂口服用于腹泻、腹痛、脱肛、催欲、不育。

**Acacia milleriana** Standley 米勒金合欢 产墨西哥。收敛、止血、止痒。

**Acacia nilotica** L. 西非金合欢 产非洲西部的传统药。具有止泻作用。

**Acacia mollissima** Willd. 柔毛金合欢 对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用。

**Acacia monticola** T. M. Black 山地金合欢 澳大利亚土著居民使用的植物药。用于伤风感冒、驱蚊。

**Acacia murrayana** F. Mueller ex Benth. 默里金合欢 果实：用于治疗疥疮、皮肤病。

**Acacia negrii** Pichi-Sermolli 内利金合欢 也门药用植物。树胶：用于治疗咳嗽、气管炎、肺感染。

**Acacia nigrescens** Oliver 黑金合欢 坦桑尼亚民族药。根：煎剂口服用于增进性欲。

**Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Delile 阿拉伯金合欢 印度

及西亚药用植物。云南西双版纳引种栽培。嫩叶、树皮：收敛、利尿。用于腹泻、脱肛、白带、溃疡、小便不利。根：用于腹泻、疝气、妇女月经痛。树胶：用于糖尿病，并为阿拉伯胶之代用品。

**Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Dilile ssp. *indica* (Benth.) Brenan 印度金合欢 印度药用植物。叶：内服用于治疗黄疸。

**Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Dilile ssp. *kraussiana* (Benth.) Brenan 克劳斯金合欢 南非、也门药用植物。根、叶、树皮、树胶：用于呼吸系统疾患、肺结核、咳嗽、降血糖。

**Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Dilile ssp. *leiocarpa* Brenan 平滑果金合欢 根或根皮：用于止血、胃痛、痢疾、驱虫、胸部疾病、肺结核、淋病、阴囊肿、催欲。叶：用于感冒、肺炎、胸痛、眼炎、调经、腹泻、溃疡、出血、麻风。茎皮：用于发热、牙痛、兴奋神经、催欲、感冒、干咳、眼炎、腹泻、溃疡、出血、麻风。

**Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Dilile var. *adansonii* (Guill. et Perr.) O. Kuntze 亚当森金合欢 马里、布基纳法索药用植物。果实、叶、树皮、根皮：用于牙痛、牙龈炎、口腔溃疡、创伤。

**Acacia nubica** Benth. 努比亚金合欢 肯尼亚民族药。茎皮：浸剂口服用于治疗风湿病。

**Acacia oerfota** (Forsskal) Schweinf. 欧福金合欢 索马里、埃塞俄比亚民族药。根：煎剂口服治疗阳痿。全株：烧灰外敷治疗炭疽。嫩枝：咀嚼口服用于治疗牙痛。

**Acacia paniculata** Willd. 锥序金合欢 巴西东北部药用植物。

**Acacia paolli** Chiov. ssp. *paucijuga* Brenan 少韧金合欢 肯尼亚药用植物。茎皮：用于治疗风湿病。

**Acacia pennata** (L.) Willd. 羽叶金合欢 (南蛇筋藤) 产浙江至云南。根、茎：祛风湿、强筋骨、活血止痛。用于风湿痹痛、腰脊肌劳伤、跌打损伤、脊椎骨损伤。外用于急性、过敏性、渗出性皮炎。叶：用于难产。

**Acacia pennatula** (Schlecht. et Cham.) Benth. 羽金合欢 产墨西哥。墨西哥传统药。抗肿瘤。

**Acacia pentagona** (Schumacher et Thonn.) Hooker f. 五棱金合欢 产热带非洲。坦桑尼亚民族药。根：煎剂口服治疗月经不调。

**Acacia pleuripetala** 肋瓣金合欢 印度尼西亚苏门答腊用于治疗腹泻。

**Acacia polyacantha** Willd. 多花相思树 非洲坦桑尼亚用于治疗发热。

**Acacia polyacantha** Willd. ssp. *campylacantha* (Hochst. ex A. Rich.) Brenan 弯刺多花相思树 产南非和热带非洲。坦桑尼亚民族药。根：煎服用于胃痛、阴道闭塞，浸剂用于催欲，外服用于阴囊肿。

**Acacia praecox** Griseb. 早发金合欢 玻利维亚药用植物。

花：茶剂口服用于治疗肾炎、无尿症。

**Acacia pseudointsia Mig.** 印尼金合欢 印度尼西亚用于治疗头痛、疥疮、天花。

**Acacia pyrifolia Nakai** 梨叶金合欢 澳大利亚植物药。用于治疗创伤、溃疡。

**Acacia reficiens Waura ssp. misera (Vatke) Brenan (A. misera Vatke)** 粗金合欢 索马里民族药。叶：油剂外敷治疗头痛、精神不足。根：浸剂用于催欲，外敷治疗阴囊肿。

**Acacia rigidula Benth** 坚挺金合欢 墨西哥民族药。叶、根：煎剂口服用于流感、腹泻、便血。

**Acacia robusta Burch.** 粗壮合金欢 坦桑尼亚药用植物。根：用于治疗胃病、妇女分娩、肠虫病。

**Acacia robusta Burch. ssp. usambarensis (Taub.) Brenan** 乌桑巴拉山金合欢 坦桑尼亚药用植物、乔木。叶：用于治疗惊厥、口腔念珠菌病、皮肤真菌病。

**Acacia scorpioides A. Chev.** 蝎尾金合欢 尼日利亚民族药。茎皮、树胶：口嚼治疗龋齿、牙周炎、牙龈溃疡。

**Acacia senegal (L.) Willd.** 阿拉伯胶树 原产非洲、阿拉伯国家、亚洲印度。海南、云南有栽培。树皮：树胶收敛。用于腹泻、痢疾、发热、呼吸器官疾病、肾脏慢性疾病、子痫、衄血、水蛭咬伤出血不止。外用于发炎创面、乳头疾患、水火烫伤。既可作刺激缓和剂，又可作丸剂的润滑剂，亦常用作乳化剂、赋形剂、混悬剂。

**Acacia senegal (L.) Willd. var. fistula (Schweinf.) Oliver** 管状金合欢 乌干达民族药。茎皮、根：内服或外洗治疗癫痫、阿米巴病、毒蛇咬伤。

**Acacia senegal (L.) Willd. var. keniensis Schweinf.** 肯尼亚金合欢 肯尼亚药用植物。胶：可食用，用作咀嚼胶。

**Acacia seyal Delile** 多刺金合欢（塞伊耳相思树） 非洲药用植物。用于制造阿拉伯胶。

**Acacia sieberiana DC.** 西伯金合欢 南非、卢旺达、津巴布韦、埃塞俄比亚民族药。花、叶、根、根皮、茎皮：用于腹泻、淋病、炭疽、皮肤病、惊厥、眩晕。

**Acacia sieberiana DC. var. vermoesenii (De Wild) Keay** 弗莫金合欢 卢旺达民族药。叶、茎、根、根皮：用于抗真菌和抗病毒。

**Acacia sieberiana DC. var. woodii (Burt Davy) Keay et Brenan (A. woodii Davy)** 伍德金合欢 南非传统药用植物。树皮：浸剂口服治疗背部疼痛。叶：用于抗炎，具抗菌活性。

**Acacia sinuata (Lour.) Merr.** 藤金合欢 产江西至云南。全株、枝、叶：清热解毒、散血消肿、生发。用于痈肿疮毒、急剧腹痛、牙痛、生发剂。

**Acacia smallei Isely** 斯莫利金合欢 墨西哥民族药。树皮：煎剂口服用于治疗流行性感。根：压碎煎剂外洗治疗红眼病。

**Acacia stuhlmannii Taub.** 斯图金合欢 产非洲东部和南

部。坦桑尼亚民族药。根：煎剂或浸剂口服用于治疗阳痿、不育、精神失常。

**Acacia suma Kurz et Brendis** 苏马金合欢 产印度、斯里兰卡。根：用于喉病、淋病。

**Acacia sylvicola G. C. C. Gilbert et Boutique** 林金合欢 扎伊尔药用植物。

**Acacia tetragonophylla F. Mueller** 四棱叶金合欢 澳大利亚土著居民使用的植物药。用于镇痛、止咳、止痢、防腐、去疣。

**Acacia torta (Roxb.) Craib** 螺旋金合欢 印度民族药。树皮：浸剂口服用于治疗莽蛇咬伤。

**Acacia tortilis (Forssk.) Hayne** 易扭金合欢 墨西哥传统药。用于治疗胃肠道疾病，有解痉作用。

**Acacia tortuosa (L.) Willd.** 扭旋金合欢 多米尼加用于发热、腹泻、溃疡、坏疽、体弱、衰老。

**Acacia trachycarpa E. Pritz.** 粗果金合欢 澳大利亚土著居民用植物药。用作镇痛药、杀菌药。

**Acacia translucens A. Cunn. ex Hooker** 半透明金合欢 澳大利亚土著居民用植物药。治头痛、外伤、溃疡。

**Acacia turtuosa (L.) Willd.** 扭曲金合欢 墨西哥、巴西民族药。果实：口服治疗痢疾。叶：外敷治疗创伤。

**Acacia verrygini** 弗氏金合欢 尼日利亚药用植物。树胶：制取阿拉伯胶，用作片剂加工时的粘合剂。

**Acacia victoriae Benth** 胜利金合欢 产澳大利亚，澳大利亚民族药。提取物：口服用于抗癌、胃炎、肠炎。

**Acacia villosa Willd.** 毛金合欢 美洲加勒比海科拉索岛民族药。茎皮、叶：浸剂漱口治疗咽喉肿痛、溃疡。根：煎剂口服治疗胃病，漱口治疗口炎、喉炎、蜂窝组织炎。

**Acacia xanthophloea Benth** 黄皮金合欢 产非洲东部和南部。坦桑尼亚民族药。茎皮：煎剂口服治疗癌症、镰刀细胞贫血症。根：口服治疗腹痛。

**Acacia yunnanensis Franch.** 云南相思树 产云南、四川。藤、茎：用于疮毒。果实：通窍，外用于鼻炎。

**Acacia zanzibarica (S. Moore) Taub. (Phtheocolobium zanzibaricum S. Moore)** 桑给巴尔金合欢 坦桑尼亚、索马里民族药。干根皮：压碎磨粉外敷治疗创伤，煎剂口服治疗口腔念珠菌病、皮肤真菌感染。

**Acacia zanzibarica (S. Moore) Taub. var. microphylla Brenan** 小叶金合欢 索马里民族药。干根皮：煎剂口服用于治疗贫血。

**Acaena Mutis ex L.** 刺果薇属（无瓣薇属、无瓣蔷薇属）蔷薇科 100 种，主产南温带。

**Acaena argentea Ruiz et Pavon** 阿根廷刺果薇 阿根廷民族药。叶：浸剂口服用于健胃、肝病。全草：用于收敛、利尿、阴道疾病。

**Acaena magellanica Vahl** 马吉冷刺果薇 阿根廷野生药用植物。用于治疗泌尿系统疾病、支气管炎、胆囊炎。

**Acaena myriophylla Lindley** 多叶刺果薇 阿根廷药用植