

醫門法律 卷之三下

中醫門諸方

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

芒硝 連翹 薄荷 麻黃 山梔子

石膏 桔梗 黃芩 白朮 荆芥

甘草 滑石 各五分
右水二盞薑三片煎至八分服涎嗽加半夏生薑製開
結加大黃一錢破傷風加羌活全蝎各五分腰脇痛加
芒硝當歸各一錢

按此方乃表裏通治之輕劑用川芎當歸芍藥白朮以
和血益脾所以汗不傷表下不傷裏可多服也

(十四)祛風至寶膏 治諸風熱

防風一兩 半白朮一兩 芍藥二兩 芒硝五錢 石膏一兩

滑石

三兩

當歸

二兩半

黃芩

一兩

甘草

二兩

大黃

五錢

連翹

五錢

川芎

二兩

麻黃

五錢

水畜

天麻

一兩

山梔子

五錢

荆芥

五錢

黃柏

五錢

桔梗

一兩

薄荷

五錢

熟地黃

一兩

羌活

一兩

人參

一兩

全蝎

五錢

細辛

五錢

黃連

五錢

獨活

一兩

臥服

右爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨

按此方亦表裏通治卽前防風通聖散十七味更加熟地黃益血人參益氣黃柏黃連除熱羌活獨活天麻全蝎細辛去風乃中風門中不可移易之顓方又非前通用泛用之方比也

卷之三
中風門諸方

不換金丹，退風散熱治中風口喎。

羌活

半兩

僵蠶

一兩

天麻

一兩

甘草

一兩

荆芥穗

一兩

川芎

半兩

烏頭

半兩

蝎梢

半兩

防風

一兩

薄荷葉

三兩

白附子

半兩

藿香

葉半兩

右爲末，煉蜜丸，彈子大，每服一丸，細嚼茶酒任下。塗喎處亦可。

按此方驅風之力頗大，至清火散熱，殊未必然。大勢風而挾寒痰氣窒閉者，宜之。

三化湯 治中風外有六經之形證，先以加減續命湯主之。內有便溺之阻隔，此方主之。

厚朴

大黃

枳實

羌活

各等分

每服一兩水煎

按此乃攻裏之峻劑非堅實之體不可輕用蓋傷寒證
胃熱腸枯不得不用大承氣以開其結然且先之以小
承氣調胃承氣恐誤用不當即傷人也在中風證多有
虛氣上逆關隘阻閉之候斷無用大承氣之理古方取
藥積腹中不下以漸填其空竅俾內風自熄奈何今人
每開竅以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮也哉
④攝生飲調蘇合丸 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕
中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去皮
弦細辛生南星半夏爲末吹入鼻中俟其噴嚏卽進前

藥牙禁者中指點南星半夏細辛末并烏梅肉頻搽自

開

天南星

圓白者溫紙裹煨

南木香

蒼朮

甘草生用

石菖蒲

各一錢

細辛

半夏

頃一錢半百沸湯泡少

右七味剉散分二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱調蘇合香丸半丸灌下痰盛者加全蝎三枚炙按此方治卒中氣閉痰迷不得不不用之劑但正氣素虛之人不能當腦麝及辛香摧枯拉朽隨勢裁節而用十之三三可也其牛黃清心丸與蘇合香丸異治熱阻關竅可用牛黃丸開之寒阻關竅可用蘇合丸開之其口開手撒遺尿等死證急用人參附子峻補間有得生者若牛黃蘇合之藥入口卽斃此無異以千鈞鎮一絲也

(六)烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻及療癱瘓語言蹇澀腳氣步履多艱手足不遂先宜多服此藥以疏氣逆然後隨證投以風藥

麻黃

去節二兩

陳皮

去白二兩

烏藥

去木二兩

川芎

一兩

白僵蠶

炒去嘴一兩

白芷

一兩

甘草

一兩

枳壳

一兩

桔梗

一兩

乾薑

五錢

炒

右爲末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎憎寒壯熱頭痛身體倦怠加葱白三寸煎併服出汗或身體不能屈伸溫酒調服

按中風證多挾中氣不但卒中急證爲然凡是中風證皆有之嚴用和云人之元氣強壯營衛和平腠理緻密外邪焉能爲害或因七情飲食勞役致真氣先虛營衛

空疎邪氣乘虛而入故致此疾若內因七情而得者法當調氣不當治風外因六淫而得者亦當先調氣後依外感六氣治之此良法也宜八味順氣散嚴氏此說於理甚當其用八味順氣散乃人參白朮茯苓甘草陳皮六君子湯中用其五加烏藥青皮白芷共八味爲劑較前局方烏藥順氣散不用麻黃枳梗僵蠶等風藥正先治氣後治風之妙旨後人反惜其說有未備且謂方中不當雜入白芷吹毛責備詎知白芷香而不燥正和營衛之善藥也和劑合兩方取用乾薑川芎人參陳皮桔梗厚朴白芷甘草白朮麻黃更加葛根治感風頭痛鼻塞聲重尙爲合宜故知論方不可橫以已見也

⑤勻氣散 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮

二錢

天麻

五分

沉香

三分

白芷

三分

青皮

三分

甘草

三分

人參

五分

烏藥

一錢

紫蘇

三分

木瓜

三分

右水

二蓋

薑

三片

煎八分

服風氣腰痛亦宜服之

按勻氣之說甚長身內之氣有通無壅外風自不能久居而易於解散故知勻氣卽調氣之旨非有兩也

⑥稀涎散 治風涎不下喉中作聲狀如牽鋸或中濕腫滿

半夏

大者十

四枚

猪牙皂角

一個

右咀作一服水二蓋煎一蓋人生薑自然汁少許服不能嚥者徐徐灌之

按此以半夏治痰涎牙皂治風比而成方蓋因其無形

之風挾有形之涎膠結不解用此二物俾涎散而風出
也其有涎多難散又非小吐不可則用明礬合牙皂等
分爲末白湯調服吐之或用蘿蔔子合牙皂等分爲末
煎服半盞吐之其風多涎少人事不昏則用蝦半觔入
醬葱薑等料物水煮先喫蝦次喫汁後以鵝翎探引吐
之活法在心無施不當也

○加味六君子湯 治四肢不舉屬於脾土虛衰者須用此耑
治其本不可加入風藥

人參一錢 白朮一錢 茯苓一錢 甘草一錢 陳橘皮一錢
半夏一錢 麥冬三錢 加竹瀝半小盞

右用水二盞薑三片棗二枚煎六分溫服口渴去半夏

加葳蕤石膏虛甚不熱者加附子

按中風門中從不錄用此方所謂治末而忘其本也夫風淫末疾四肢不舉乃風淫於內虛者多實者少審其果虛則以六君子加甘寒藥如竹瀝麥冬之屬充爲治虛風之儀式也

三化湯 見第十六方

按經謂土太過則令人四肢不舉此真膏梁之疾非肝腎經虛之比其治瀉令氣弱陽虛土平斯愈而用三化湯及調胃承氣湯然上實之證十不見一非審諦無忒未可嘗試也

○二聖散 治中風手足拘攣口眼喎斜腳氣行步不正

當歸

酒洗炒爲末

玄胡索

微炒爲末

肉桂

去粗皮各等分

石爲末每服二錢空心溫酒調下

按此方治血虛風入之耑劑也故取以治口眼喎斜之左急右緩者然血藥中而加地黃白芍秦艽杜仲牛膝風藥中而加天麻防風羌活白芷細辛或加獨活以去腎間風加草薢以除下焦熱又在隨證酌量矣

勻氣散 見第十九方

取其方以治口眼喎斜之右急左緩者然倍用生熟甘草加苡仁以緩其急加麥冬葳蕤竹瀝以熄其風得効去白芷蘇葉可常服也

轉舌膏 治中風瘓癓舌蹇不語

用涼膈散加菖蒲遠志各等分蜜丸彈子大硃砂爲衣
薄荷湯化下臨卧或食後服 涼膈散見第三十八方
按此乃治心經蘊熱之方也

正舌散 治中風舌本強鞭轉語不正
蝎梢去毒二十七箇 茯苓一兩

右爲細末每服一錢食前溫酒調服又擦牙更効
按此乃治風涎壅塞之方也

資壽解語湯 治中風脾緩舌强不語半身不遂

防風一錢 附子一錢炮 天麻一錢 官桂八分 酸棗仁一錢

羌活五分 甘草五分 羚羊角八分 鎏

右水二盞煎八分入竹瀝二匙薑汁一滴食遠服

按此方乃治風入脾藏舌強不語之證至於少陰脉榮舌本腎虛風入舌不能言喫繁之候古今從無一方及

之

昌

每用此方去羌活加熟地何首烏枸杞子甘菊花

胡麻仁天門冬治之獲効今特識於此方之下聽臨病

之工酌用焉

後檢宣明方有地黃飲子治腎虛氣厥不至舌下先得我心補錄

胃風湯 見第四方 治虛風證能食手足麻木牙關急搐目內蠕瞞胃風面腫

按虛風入胃反能食者乃風入而助其胃之火熱故比平常食加進也此去痺成爲消中不遠此方但治其風不治其火熱殊不合內經之旨必於竹瀝麥冬花粉歲麩石膏生地梨汁甘寒藥中加入升麻葛根甘草爲劑

始克有當況風既入胃內經述其五變曰厥巔曰寒熱
曰消中曰飧泄曰癘風隨人之寒熱或上或下變病若
此其可畏奈何不習不察徒欲檢方而治病耶有志於
醫者自爲深造無寄後人籬下可矣

(医)瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風
熱燥煩之故也

當歸

川芎

梔子

羌活

大黃

防風

龍胆草

各三分

右爲末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

按此方以瀉青爲名者乃瀉東方甲乙之義也風入厥
陰風木之藏同氣相求其勢必盛所慮者虛而眩運熱

而燥煩虛也熱也其可以爲壯實而輕湯之乎審果壯
實乃可施此審屬虛熱必以四物湯全方加人參竹瀝
秦艽羌活八味爲劑始合法度也

毛愈風湯

初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也
又治中風證內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸
經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治
病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一氣之通利
如此乃常服之藥日久則清濁自分營衛自和矣

羌活

甘草

防風

當歸

川芎

蔓荆子

細辛

黃芪

枳壳

人參

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

知母

地骨皮 獨活

秦艽

黃芩

芍藥

蒼朮

生地黃

各四兩

肉桂

一兩

右咀每服一兩水二盞生薑三片空心煎服臨卧煎渣
服空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下四
白丹丸謂之輕劑 假令一氣之微汗用愈風湯三兩
加麻黃一兩作四服加薑空心服以粥投之得微汗則
住 如一氣之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作
四劑如前臨卧服得利爲度此藥常服之不可失四時
之輔春將至大寒後本方加半夏人參柴胡謂迎而奪
少陽之氣也 夏將至穀雨後本方加石膏黃芩知母
謂迎而奪陽明之氣也 季夏之月本方加防已白朮