

20123

2005 清点

S 2414
4
1

仲景歸真

楊氏

广州中医学院
圖書館
圖書

傷寒論歸真

五卷傷寒引正下

初學入門二十六訣

一 病因

二 經絡起止

三 傳經次第

四 傷寒摠脉

五 太陽經症

六 陽明經症

七 少陽經症

八 太陰經症

九 少陰經症

十 厥陰經症

十一 表症

十二 裡症

傷寒論歸真 卷五 目錄

十三 陰症

十四 陽症

十五 驗舌法

十六 夾食論

十七 忌參辨

十八 治病莫計日

十九 傷寒摠法

二十 傷寒摠方

二十一 三摠病四摠方

附用古方免誤
用方須知宜忌

二十二 各半方症

二十三 四症異同

二十四 併病合病

二十五 危急下症

二十六 夏無傷寒辨

傷寒引正下

傷寒入門二十六訣

一 病因

傷寒外感從外來。風寒生火卽三災。

邪在表間溫散治。入裡陽明作熱驅。

內火外風是陽症。陰症偏尋寒藏推。

陽藏逢傳多人府。陰藏若傳兩感居。

傷寒因病再招病。春夏秋冬不必拘。

但分表裡急拘逐。莫待傳經不測來。

傷寒論歸直卷五

二

夫曰傷寒曰外感。摠因風寒由外而來。雖有三百

九十餘症之名。然止因風寒變火三字之病。風寒

在表。作爲寒邪。例應溫散之藥。以發表。倘風寒之

邪傳入陽明之裡。卽作熱作火。例應清之下之矣。

凡人本有鬱火于內。另招風寒于外。而成傷寒者。

是爲陽症。若素來寒藏。外感寒邪。卽爲陰寒之症。

者。倘陽藏之人傷寒。若有傳經。多有人府可下之。

症。陰藏之人傷寒。設有傳經。亦不過卽傳于陰而

成兩感之病。而已斷無陽邪入府可下之例者矣。

陶節菴謂春夏秋三時之病。摠名外感。不算真正傷寒。此乃一偏之見耳。因傷寒之病。初因有病在內。復招風寒於外。始病也。如先有鬱火。或有鬱寒。皆可致病者。但視其邪在表在裡。急急驅逐。均勿留連。待其傳變而成不測可也。

○經絡起止

三陽俱從頭項落

陽明由面身前泊

少陽繞耳側身行

太陽項額夾腰脊

陽脉從頭至脚終

三陰從脚上腹作

風寒入人經絡傷

循行到處痛而惡

三陽者太陽陽明少陽也三陽之經絡俱係從頭

起至脚趾而止所分者陽明之經自頭角向面而

下行身之前少陽之經起於目外眦繞耳透耳底

落項行身之側太陽之經起於目之內眦上額至

傷寒論歸真卷五

四

項向後落頸循腰脊行身之背所謂三陽俱從頭

項落身至脚也至于太陰少陰厥陰謂之三陰這

三陰之經俱係自脚趾而起上腹而止凡人一身

為三陰三陽經脉封蓋倘為風寒所侵則經絡受

傷某經受病則某經之脉絡所到之處皆痛惡不

能如常之柔和順適者矣此条摠言六經之起止

者各經各症另列下

○傳經次第

初起太明及少陽

傳入太陰少厥鄉

陰若傳陽厥及少
少陰定必太陽出
傷寒初起傳經重
既傳入陰望轉陽

傷寒之病必初病于太陽至若傳經則自太陽而
傳陽明自陽明而傳少陽此傳經三陽之次第也
再若傳入三陰則由太陰傳少陰至終于厥陰此
傳陰經之次第也。總之傷寒有從陽傳陰亦有從
陰傳陽但從陰傳陽必從本經之府而傳者如厥
陰以少陽爲府太陰以陽明爲府少陰以太陽爲

傷寒論歸真卷五

五

府設使厥陰傳陽必傳少陽太陰必傳陽明少陰
必傳太陽此爲陰經傳陽之定例也。但凡傷寒初
起不傳經則輕若傳則重至若既傳入陰須要望
其復傳回陽從陽傳陰則重而凶從陰傳陽則輕
是退病之機故也。內經曰傷寒一日太陽受之二
日陽明受之三日少陽受之三日三陽爲盡四日
太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之六日三
陽三陰爲盡此雖大畧言之幾曾見有六日而傳
遍三陽三陰之事其間病一二日而愈或六七日

亦不傳入于陰而不愈不可不知。

又傷寒摠脉

傷寒脉必緊或數。

緊寒數熱天淵各。

陰脉細遲沉緊微。

三陽脉必浮洪數。

表裡須問脉浮沉。

脉靜身涼病不惡。

未汗身熱應浮洪。

汗後須防緊數樸。

太陽浮脉少陽弦。

陽明長大關中博。

太陰沉緩少沉微。

厥陰沉細須當學。

傷寒病亦病。傷寒脉亦脉也。非有異樣。傷寒病須。

傷寒論歸真卷五

六

分表裡陰陽。傷寒脉亦分表裡陰陽。脉症相配其。

病易治。脉症相反其病難醫。如陽症陽脉。謂之相。

配。陽症陰脉。或陰症陽脉。謂之相反。然而陽症陰

脉多凶。陰症陽脉多吉。何謂陽脉。如浮洪數大實。

長滑促等脉是也。何謂陰脉。如沉細微遲小虛短。

瀯結代等脉是也。至于傷寒初病之日。其脉浮緊。

浮數居多。然緊數二脉相似。但緊屬寒。數屬熱。相

去天淵。須當辨認。其餘浮為表脉。沉為裡脉。凡病

得遇脉靜身涼。可保平安。若初病未經發汗。其身

熱者其脈應該浮洪。此爲陽症。陽脈。倘身熱之病。已經發汗。自應脈靜。身涼。設或脈仍不靜。而且尙見緊數之脈。其病未曾退也。慮其傳經有變。

如太陽陽明少陽。這三陽之病。皆爲陽病。皆要陽脈爲合。但凡太陽之脈。必浮。因太陽爲表症。浮爲表脈。故也。所分者。浮緊則爲傷寒。浮緩則爲中風。浮數則爲表熱。倘或沉脈。卽爲相反矣。陽明之脈。必長。陽明乃胃府之經。故於關脈獨長。獨大爲合。然或病已入府。則有沉實有力之脈。亦爲陽症。陽

傷寒論歸真卷五

七

脈可下之症。少陽之脈。必弦。不浮不沉。是爲半表半裡之脈。症者。學者必要細心體認。

太陰之經。乃純陰之藏。其脈應該沉緩。之脈爲合。少陰之經。乃陰極之藏。其脈應該沉微。爲合。

厥陰之脈。沉細。摠之三陰之藏。屬陰。故三陰之脈。應沉。或見脈浮。是爲由藏出府。由陰轉陽。不可定也。但凡三陰之病。脈見浮洪數大滑實。各等陽脈。爲吉。所謂陰症。陽脈。其病易治者也。所慮者。陽症而見陰脈耳。何也。陽病者。邪盛之病也。陰脈者。元

氣虛衰之脉也。元氣既虛，何能當其邪盛之病。

太陽經症訣

太陽惡風發熱煩

頭項強痛骨節疼

手足仁冷氣喘嘔

有汗無汗分風寒

有汗浮緩桂枝解

無汗浮緊麻黃安

太陽症者，乃太陽一經之脉絡爲風寒所傷，則有如是之病症也。症者爲證據之証，一定不易之謂也。此經之脉絡起自兩目之內眥，上頂，往後落頸項，循腰夾脊，手足骨節，蓋遍周身。凡風寒侵人，其

傷寒論歸真卷五

八

論明抱症
必有如此

論風寒不
同

分中風

經必先受病，因此經所到之部位獨多之故。倘或此經受病，則有惡畏風寒，周身發熱，心腹煩躁，頭顱疼痛，頸項強勁，四肢骨節疼痛，氣粗鼻鳴，似喘乾嘔等症，見之矣。然有傷寒中風之別。傷于寒，則爲傷寒；傷于風，則名中風。以上等症，傷寒有之，中風亦有之。所辨者，其脉浮緩，身有汗出，手足熱，是爲中風；其脉浮緊，身無汗出，手足仁冷，是爲傷寒。但此經以有汗無汗辨症之大關，頭不可不察也。夫中風何以脉浮緩而有汗，傷寒何以脉浮緊而

分傷寒

無汗。此中陰陽各別也。夫風屬陽。衛亦屬陽。風之陽邪入于衛之陽分。故腠理爲陽邪所蒸。因致疎洩。而致汗出。且風性柔緩。脉亦因之而緩。治之之法。宜以桂枝湯。取其驅逐衛分之風邪。實肌表之腠理。而止汗者。夫寒屬陰。營亦屬陰。寒邪入于營之陰分。立府閉密。汗故不得出。寒性緊急。脉亦因之而緊急。治之之法。宜以麻黃湯。取其勇悍。以開閉密之肌膚。而使汗得出者。或問何以惡風寒曰。因受風寒。凌虐如傷。食惡。食傷。酒惡。酒有所傷。故

傷寒論歸義卷五

九

問惡風寒

問發熱

問頭身痛

問手足冷

有所惡也。何以發熱曰。因經脉受于風寒。所傷變而爲熱。熱蒸肌肉。故發熱也。何以頭痛項強腰脊骨節四肢筋骨皆見疼痛曰。此因太陽一經之脉。蓋遍周身。此經之脉既傷。所到之處皆痛也。何以手足自冷曰。邪熱壅閉中州。不能達于四肢。故乍冷。若邪熱既達于四肢。則又見大熱矣。何以煩躁喘嘔曰。肺合皮毛。風邪能入皮毛。卽能入于肺部。故有氣粗似喘。胸爲氣壅。邪入氣分。則胸中煩躁。而作嘔惡矣。以上等症。太陽一經皆有之症。然或

全見或不全見。但有見頭痛發熱。即是為太陽。凡風寒傷人。必先此經而入。不拘四季。皆同一律。所異者。冬月皮膚閉密。傷寒獨多。三時皮膚疎洩。中風獨多。冬月傷寒無汗。無麻黃湯。則不能發汗。三時中風有汗。無桂枝湯。亦不能止汗。

太陽經應用之方列于後

太陽中風有汗者。桂枝湯。夾熱者。陽旦湯。或桂

枝加葛根湯。

太陽傷寒無汗者。麻黃湯。夾熱者。麻黃杏仁甘

傷寒論歸真卷五

十

草石羔湯。

太陽寒風雨感。無汗。身痛煩躁。脈浮緊者。大青龍湯。如見有汗。六脈微緩。則禁用。

太陽風寒兩感。夾風水者。小青龍湯。小便利便。是。

太陽風寒如瘧。日二三度發。麻黃桂枝各半湯。太

陽風多寒。少有微汗出者。桂枝二麻黃一湯。

太陽停飲發渴。小便不利。脈浮身熱者。五苓散。

太陽合少陽者。桂枝合柴胡湯。若見嘔惡。往來

太陽表症。宜汗不宜。吐如反誤。行吐者便。見自汗出。不惡寒反。惡熱。飢不。欲食。朝食。暮吐。欲食。冷食欲近。衣此為轉。屬陽明之。表也。太陽以心。腹為裡陽。

明以心腹
為表

寒熱便是

太陽合陽明者桂枝合白虎湯或葛根湯或桂枝
合葛根湯

太陽合少陰者麻黃附子細辛湯 發熱脉沉細
但欲寐便是

太陽轉入陽明府者太承氣湯 譫語便硬大渴
便是

上陽明經症訣

陽明鼻乾不得眠 發熱目疼不惡寒

傷寒論歸真卷五

十一

煩躁汗多便硬渴 潮熱滿實與狂譫

在經葛根桂枝葛 八府議下用三承

陽明經脉自頭維下循面目傍鼻透頰歷頸項行

身之前此經受病則有鼻乾痛不得眠身發熱目

眦疼不惡寒或反惡熱煩躁不安汗出而多大使

硬結小便短赤大渴喜飲冷水或潮熱心下滿脹

實狂妄譫語等症見矣此經尚有經府之分在經

者如目疼鼻乾不得眠或無汗惡寒是也宜用葛

根湯有汗者桂枝加葛湯八府者謂入陽明胃

陽明以一
切熱症為
表惟以胃
實為裡陽
明表症宜
吐不宜汗
下如反誤
行汗下即
見心中憤
懣惕懣懷
煩躁舌胎
等症若仍
在陽明之
表仍宜施

府如潮熱譫狂躁結大渴汗多之類內經曰已入于府者可下而已正謂此也輕者白虎湯重者大承氣湯

陽明經應用之方列后

陽明經症有汗不惡熱桂枝加葛根湯白虎湯人參白虎湯

陽明經症無汗惡寒乃太陽未罷者葛根湯

陽明府症發渴白虎湯又白虎加人參湯有汗惡寒發渴小便利桂枝合白虎湯或桂枝湯加石

傷寒論歸真卷五

三

羌知母黃芩無汗惡寒而渴小便利麻杏石甘湯麻黃加石羔湯

少陽經症訣

少陽口苦目眩赤胸脇滿嘔往來熱耳聾悸渴腹中疼咽乾痞欬小柴傑

少陽經脉起于目之外眦環遶過耳透耳底循頰車項側而下入缺盤歷胸貫膈行身之側此經受病則有口苦目眩目赤胸滿脇痛喜嘔往來寒熱耳聾驚悸發渴腹中疼痛咽乾痞滿欬嗽等症見

也。此經素稱半表半裡。半陰半陽。有謂半表是太陽半裡是太陰。有謂少陽主春。其氣半居地。下半居地上。有謂二陽三陰之間。吾謂尚未分晰明白者。若以時候計。則主春是半近厥陰。半近太陽。若以傳經次第計。則由陽明而至少陽。少陽而至太陰。然則半近陽明。半近太陰也。若以部位計。則半表近太陽。半裡近陽明。吾故謂半表是指太陽。半裡是指陽明。何也。觀仲景所立方症。推之。其謂少陽發熱微惡寒。以小柴加桂枝。是加太陽半表藥。

傷寒論歸真卷五

三

也。又如心下急。鬱鬱微煩。潮熱未解。日晡潮熱。以大柴胡湯。此乃表裡之藥也。半裡之藥。用大黃。芒硝。豈非陽明之藥乎。倘謂半裡為太陰。何可擅用大黃乎。又此經汗吐下三法。皆禁者。因此經屬胆。多氣少血。為汗吐下三法。皆耗破津血。故禁之也。仲景雖禁。然亦有不禁者。如大柴胡湯。是為近於裡。亦用下法也。如柴胡桂枝干姜湯。柴胡加桂枝湯。是為近於表。亦用汗法也。豈非偏於表是兼太陽。可用汗。偏於裡是兼陽明。可用下者。且此經有

半表是太陽
陽半裡是
陽明向未
有人道過

寒熱往來。是因半人陽明則熱。半出太陽則寒。吾謂半表指太陽。半裡指陽明。信不誣也。

少陽經應用之方列于后

少陽經一切症候。皆用少柴胡湯。發熱微惡寒。

者。柴胡桂枝湯。胸脇痞結。柴胡桂枝干羌湯。

少陽症內實者。大柴胡湯。

少陽症外熱內寒者。黃連湯。

三太陰經症訣

太陰。腹滿。痛吐食。自利不渴。本藏寒。

傷寒論歸真卷五

十四

無熱無汗。亦無厥。寒格吐逆。羌芩連。

身痛。可用桂枝表。大實滿痛。承氣先。

太陰者。純陰之藏。此經受病。陰多陽少。論內太陰。

篇所用承氣症候。亦是三陽之病。轉入胃府之症。

居多。非太陰之症。有可用攻下之法者也。太陰之。

脈起自足之大指內側。上內踝。內臑。內臑上行至。

腹而止。故其經受病。則有腹滿。腹滿吐食。自利不。

渴之症。然此等皆屬寒症。惟傳經實邪。則有腹滿。

實痛而已。凡三陰之症。皆無發熱。無汗出。而太陰。

則無發厥。手足常溫。若表症未除。身体疼痛。可用枝湯。陽邪傳來。大滿大實者。始用承氣湯。若食入即吐出。名曰寒格。可用干菴芩連人參湯。

太陰經應用之方列于后

太陰腹痛。自利不渴。嘔吐諸等寒症。皆宜理中湯。四逆湯。

陽邪腹滿實痛。桂枝大黃湯。大承氣湯。濕痰嘔惡。厚朴干菴半夏甘草人參湯。寒格吐食。干菴黃芩黃連人參湯。

傷寒論歸真卷五

十五

身痛者。桂枝湯。表症未除也。

外熱者。以桂枝湯。亦是表症。

凡外熱內寒者。先以四逆溫其裡。後以桂枝解其表。

女少陰經症訣

少陰脉細。但欲寐。陰陽初病俱如此。

脉數口苦。是為陽。口和背寒。陰所繫。

初病發熱。為兩感。三陽傳來作陽例。

乾渴咽痛腹滿嘔。躁煩悸厥兼吐利。

以上等症有陰陽。利清咽燥須承氣。
陰症真武附子湯。陽症白虎猪苓記。

此經之脉起自足小指內側斜趨足心上循內踝。越足脛上脾入腹。歷抵咽喉。此經受病則有沉微之脉。但欲寐而不醒。卽爲少陰之症矣。但有陰陽未定。若脉沉細。倘見數澀。口苦。是爲陽症。若口和不苦。其背惡寒。其脉沉細遲微。卽爲陰症。凡初病發熱。脉沉欲寐。此爲太陽夾少陰。名爲兩感之例。若在三陽起病。四五日外。始見脉細欲寐。此爲

傷寒論歸真卷五

六

傳經之陽症也。至如口乾發渴。咽喉腫痛。腹滿嘔吐。煩躁驚悸。厥冷吐利。此等雜症。陰陽俱有。須細參詳。但係下利。純清水。咽喉乾燥。的是陽邪。急下之例。此經陰盡。陽生水火之藏。最危最急。狐疑遲緩。多致不救。辨別陰陽之法。脩錄于后。
欲寐。陰症。則時時昏迷。呼之雖應。隨應隨昏。欲寐。陽症。則但欲寐。隨喚隨省。不過面壁喜靜。不欲言語而已。

脉沉細。陰症。則微而遲。而澀。或細緊。