

同是少陰病。首條何其簡。本條何其贅耶。既曰少陰病。又曰屬少陰。長沙無此論調也。胡不刪卻一句耶。既具少陰之病情。便有少陰之病形矣。病形悉具句。○又何消說耶。吾謂正惟少陰之病之形具。而後不爲少陰危。正惟始則少陰病。繼則屬少陰。而後可爲少陰幸也。不然。下文死不治之少陰病。何嘗具此病形乎。何嘗一則曰少陰病。再則曰屬少陰乎。書少陰病。○尙未確定其屬少陰也。不屬少陰臟纔是屬少陰。屬臟則氣化無受邪之餘地。少陰不成問題者也。然則未屬少陰以前之病形又何若乎。書欲吐。言吐不言利。差幸免於利。曰不吐不曰復不能吐。且幸免於吐。書

讀過傷寒論卷十二

少陰篇詁解

二

心煩。言煩不言躁。又不至於躁。曰但欲寐不曰不得卧寐。不至於不寐。此得病之始。先具將屬少陰之病形者非歟。至五六日陰經已盡。少陰更有起色矣。書自利。自利與下利之比較。下利是寒邪下陷其氣化。從大便而亡。自利是氣化行使其餘邪。從二便而去。陰邪爲虐。曰下利。少陰爲政。曰自利也。餘邪聽命於少陰。當然爲陰樞所轉移。實指之曰屬少陰也。不屬臟也。屬臟其臟寒。寒邪與寒水濕邪多生臟寒則不渴故也。何以篇內下利之渴僅一見。自利而渴亦一見耶。寒固不渴。不寒未必渴。不虛固不渴。虛仍未必渴也。惟能引水自救之虛。則宜乎其渴。不能引水自救之虛。則無所用其渴。卽渴

亦非氣化與水澤相涵濡。究於虛狀無裨補。下文豬苓湯證是也。蓋非水能救虛也。虛能受水。足以供氣化之求。○以氣行水。故曰引水。○以少陰救少陰。故曰自救也。○苟窮於自救而乞靈於水。○彼下文四逆輩證之虛何待言。○試問一杯水能替代四逆等湯否乎。○且四逆輩證無渴字。○夫豈水漿概不入口哉。○特君火沉淪。○於此也。○所有四逆輩證無小便色白四字也。○源不潔者流不清。○水火混淆。古名之根之津○安得小便之白。○若小便色白者。顯見引水乃天然之挹注。正如甘霖之潦。○水到渠成者也。○氣化之洋溢可想而知矣。○從五六日後統計以前之病形。

讀過傷寒論卷十二

少陰篇略解

三

在本條爲少陰病形悉具者。在本篇爲少陰病形獨具矣。○雖然。○引水自救之故則已明。○小便色白之故似難喻也。○小便色白者。非下焦實有寒。乃下焦虛有寒。○瞬息便無寒矣。○少陰與下焦何涉耶。○少陰位處下焦者也。○下焦分清濁而主出。○陰邪假下焦爲出路。於是少陰有寒而無寒。○下焦無寒而有寒。○總言之曰虛有寒。○舉下焦可以例少陰也。○假令下焦實有寒。○則化熱者寒。○有真熱之色制水色。○小便無從白。否則其臟實有寒。○則重寒者熱。○有假熱之色制水色。○小便亦無從白。○是小便白又足徵其臟之不寒。○故與水氣無牴觸。○勿徒歸功於水也。○水不能制小便之赤色令其白。○必小便無醞

釀之熱色○邪色不能制水○故令色白也○此與厥陰病
異而同○彼證小便色白此熱除○本證小便色白爲寒去
○皆以小便之白不白爲標準○與太陰病又同而異○彼
證其臟有寒屬太陰○本證其臟無寒屬少陰○則以自利
之渴不渴爲標準也○

車李稿草第四輯

附子加桂枝

鷹房序而
多汗出者益甚也

卷十二

少陰篇解

少陰篇解

卷十二

之陽。舉凡少陰病大都不利於太陽。明指之曰亡陽。
陽氣猶易復。不明指之曰亡陽。陽氣未必易復。又不
能舉此以例彼也。彼有彼之屬少陰。此有此之屬少陰
也。蓋必太陽少陰相維繫。而後尺脈緊而見陽。寸脈
緊而見陰。可知緊脈乃少陰之牽動力使之然。汗出乃
太陽之反動力使之然。亡太陽者少陰也。非太陽也。
少陰不亡。賴有陰中之陽在。太陽之亡。因有陽中之
陰在。不便宜於太陽。而便宜於少陰。亟望長沙之立
法矣。本篇緊脈無治法也。下文脈緊七八日。明曰必
自愈。則本證之自愈不待言。陰病見陽脈者生。何庸
立法乎。惟有莫之致而致。莫之爲而爲之法。病人且
讀過傷寒論卷十二

少陰篇詒解

五

莫名其妙也。曰法當咽痛而復吐利。咽喉者水穀之道
也。在喉嚨之後。其下爲少陰太陽之畔界。餘邪爲太
少所不容。必上衝於咽。太陽之氣衝咽喉。氣高邪自
高也。何以咽痛耶。有少陰之脈在。則覺其痛。手少
陰脈從心系上挾咽也。胡爲復吐利耶。水穀之精氣。
能克復少陰所在地。則邪從吐利去矣。少陰由勝而復
○太陽因剝而復。復字有數義存焉也。此爲下文種種
咽痛吐利之陪客。他證有法便有方。本證無方卽是法
也。何以亡陽尙不加意耶。太少之病以脈爲前提。脈
法如操左券矣。論內無陽有死證。亡其陽有死證。亡
陽無死證也。

少陰病。○歎而下利。○譖語者。被火氣劫故也。○小便必難。○以強責少陰汗也。

一〇二二年九月

少陰何以不得有汗乎。○心液化爲汗。○手少陰正魄汗從出之原也。○明明有汗偏無汗。○無怪乎強責汗者一若爲少陰是問也。不知少陰無病。其汗則泛應而不窮。○少陰有病。其汗轉退藏而益密。○少陰篇無表證二字可悟也。○病在表而後可發汗。○有外證而後得有汗。○太陽篇謂純陰。陰平陽病結不得復有外證。病有寒溫本經悉入在裏。○已明言矣。○本篇下條謂病爲在裏。不可發汗。又明言矣。然則陰邪永無出路耶。○上文小便色白。○陰邪出路者一。○咽痛復吐利。○陰邪之出路者又一也。○獨本證歟之不已而下利。

嘆而下利以嘆爲主。○掌下利。○讀過傷寒論卷十二

少陰篇豁解

六

看似陰邪未肯干休者然。○髮鬚真武湯證具。○自下利者其人或歟也。○髮鬚四逆散證具。○泄利下重者其人或歟也。○又髮鬚豬苓湯證具。○下利六七日。○歟將六七日也。○要皆下利致歟。○祇可謂之下利而歟。○非歟而下利也。○諸方不中與之。○喜用火者有不肆行其間乎。○彼欲以火熏蒸其水。○令汗出津津如金上氣也。○以爲歟利半由於積水。○一旦爲火氣所轉移。○其效尤捷於真武也。○且火氣似與少陰無牴觸。○下文灸法凡三見。○何嘗以火劫獲咎乎。○孰意下焦之陽已升。○而加之以火。○是猶剪蒿蓬於秋陽之下而縱其火也。○清陽爲火邪所奪。○勢必轉具少陰所無之病形。○而爲陽氣昏亂之病形。○書譖語者

上承
肺腎皆積水
少陰病最難得下此陽外

太陽被火必譖語。少陰寧非被火乎。除卻被火氣劫無別故也。陰虛則小便難。尤爲火劫之明徵。得毋小便亦被火耶。非熱在下焦。或不因火而盛。小便之劫未可必。小便之難則可必。緣汗溺互爲其消長。劫汗則引小便以自救。直接劫汗。無殊間接劫小便也。何以不書汗出耶。以強責無形之汗爲有形。正劫汗於無形者也。惟徵諸小便難。始形出少陰汗自有而之無。必得小便利。始形出少陰汗自無而之有也。何以不立方耶。火氣盡庶譖語自有而之無。小便亦自難而之易耳。何以不渴耶。本論凡被火無渴證。水逆則渴。火逆不渴。水不勝火。故不渴。太陽被火諸證。無與。

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

七

水之例。卽與水亦無裨於小便也。假令欬利不止又何若。下利而欬者利陰欬亦陰。欬而下利者欬陽利亦陽。陽者天氣也。肺少陰病爲天氣所提攝。便從天氣而降。此乃地下之陽。與天上之陽相汲引。然後欬而下利也。上條陰病見陽脈者生。本條陰病得陽證。獨非旦夕可愈乎。惜動以火灸爲事者。反滋流弊耳。

少陰病。脈細沉數。病爲在裏。不可發汗。二四書少陰病。意者少陰病形悉具矣乎。非也。病形無一具。僅具病脈而已。多沉數二脈。爲上文所未言及。沉脈則下細脈而已。多沉數二脈。爲上文所未言及。沉脈則下文所有。數脈又下文所無。特脈法沉爲純陰。本論數

如婦女陰冷而子氣不相順。胎氣上逆。以致上衝偏亂。大如斗。因却汗。陰冷者真武湯主之。

則爲熱。細沈當然屬足少陰。少陰之標陰也。細數當然屬手少陰。少陰之本熱也。玩細字沉字數字形容少陰之脈。已繪盡少陰之證矣。少陰非裏病乎哉。病爲在裏句。又何消說耶。蓋對下文而言。下文二三日無裏證。則微發汗。未有曰脈細沉數也。彼證不言脈正見其在裏有遁形。本證但言脈。故申言其在裏無遁形也。獨是心部於表。腎治於裏。心爲陽。陽脈數有表矣。何云病爲在裏耶。正惟君火臨於少陰之表。陰邪淮心臟堅固而不能勝火不敢奪據表部爲病所。少陰篇所以言裏不言表也。不過有數脈在。則病沉而少陰之表未沉。無數脈在讀過傷寒論卷十二。
少陰篇豁解

八

病多至程句為承脈辨句泥有
當脉以為不至左程

有汗而數無汗。故太陽脈浮而數。立可發汗之條。少陰脈細沉數。又立不可發汗之條也。

少陰病。脈微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脈弱。濟者。復不可下之。

上條有細脈無微脈。本條有微脈無細脈。且非沉數。明明少陰病無裏證。可發汗矣乎。下文微發汗條下。又未有脈微二字也。太陽病脈微且有汗禁。况少陰病乎。何以太陽未嘗因發汗之故而亡陽。少陰又不因發汗之故而亡陰耶。太陽病在陽。尚有汗解之餘地。特發汗恐微陽不能爲陽汗之保障。亡汗故易於亡陽。少陰病在陰。既無得汗之足言。若發汗恐陰汗不能爲微汗。本論有汗。

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

九

陽之保障。亡陽故捷於亡汗也。何者是少陰之陽耶。少陰之本熱化爲陽耳。何以不曰亡其陽耶。其陽乃坎中之真陽。爲生陽之根本。枝葉之陽可亡。根本之陽不可亡也。何以上條不曰亡陽耶。上條脈數。不過微脈之變相耳。細沉脈搏之入裏。而微露其陽。在裏雖不至於亡。而數則爲虛。微數皆陽虛之候。其不能犯發汗之禁則一也。惟微細互見。斯陰陽兩得其平。庶幾可行微汗法耳。雖然。不可汗之脈。言之詳矣。不可下之脈未詳也。下文祇有脈遲不可下。其餘急下三證不言脈。倘遇口燥咽乾諸證行大承氣。得毋不必拘

拘於脈耶。吾謂少陰病無論可汗與可下。當先問其陽

之已虛與未虛。如陽已虛則陰無不虛。脈亦當然微。卽不微亦當然弱。太陽篇脈微弱爲無陽。脈微爲陰。陽俱虛。可知虛脈非微卽弱。不必寸微尺亦微。尺弱寸亦弱也。但言尺弱者。愈見微陽半藏於尺脈之中。與一線之陰相互根。而後軟弱塞濇兼見也。不滑夫非弱脈卽微脈之變相。濇脈卽細脈之變相乎。假令脈微弱而不濇。彼一線之陽。已不亡之亡矣。然弱濇而非不弱而濇。就令未經發汗。陽虛已不可掩。何可復下之以虛濇乎。再舉尺脈以示禁。總見微細纔是少陰之正脈。必微細中無虛象而有實象。而後可行下法。又不待言矣。

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

十

少陰病。脈緊。七八日。自下利。脈暴微。手足反溫。脈緊反去者。爲欲解也。雖煩下利。必自愈。二十六
少陰病脈陰陽俱緊爲陽脈。緊脈亦陽脈耶。緊爲寒。少陰之寒象益著。豈非上兩條之脈。尤勝於緊脈耶。不知脈愈細而愈沉。沉中僅見其數。脈愈微而愈弱。弱中僅見其濇。脈氣退縮而不前。少陰之不振可知矣。脈緊則不爲其縮而爲其伸。乃少陰與邪相搏之脈象。陰脈作陽脈論可也。太陽篇謂脈雖沉緊不得爲少陰。况不沉乎。換言之脈緊雖不得爲太陽。已不能小視。少陰矣。獨是脈緊反汗出則亡陽。脈緊不得汗又重壓其陽。脫令脈緊不去。邪從何解耶。惟有守不可發汗。

之戒。俟七八日陰消陽長之時。正升清降濁之時。其

從商氣

濁陰一降而自下利者。與臟寒之利無涉也。夫使協寒

陰

而利。則開始脈微。甚至無脈。且脈暴出與微續若天南。肺氣往還經氣來去。

此微字乃表少數微

而喜矣。以少陰病脈本微故也。上條脈微曰亡陽。曰陽

暴微也。本證脈微不爾也。是又非止樂觀其微。尤樂觀其

虛。本證脈微固出意外。手足溫尤出意外也。得

厥而反溫。脈暴微乃緊脈之變相耶。非也。由緊而微。尚有絲毫

之緊脈在。惟前後如出兩脈。覺脈微方來。脈緊反去者。又出意外也。蓋未自利之先。陰進而陽不前。手

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

十一

足諸陽爲陰掩。故脈緊。旣自利之後。陽升而陰不前。○手足諸陽逢陽王。故脈暴微。玩暴字。脈暴來者。其暫。卽不暴去亦去也。玩反字。反去必不來。無微而復緊之理。反溫必不厥。無溫而且厥之慮。反著轉之機。暴者緩之機。爲欲解未解之機也。解時則微脈。自從容而去矣。緣足少陰之脈已下行。不與手足諸陽相牽引。是脈緊先去之原因。手少陰之脈未外行。不與手足諸陽相順接。是微脈未去之原因。畢竟微陽爲陰病所持。不利。亦意中事。微脈不隨下利而去。發煩又意中事。微脈未去始有煩。微脈一去便無脈。下文白通加膽汁湯證何嘗不煩。無如微脈不復覩。真武湯證。

何嘗非自利又或下利○無如煩狀不可觀○且曰煩下利
不曰下利煩○下利煩是不堪邪擾之煩○無自愈之能力
○煩下利是急欲去邪之煩○有自愈之能力○勿疑其愈
煩愈下利也○雖煩下利必自愈也○

少陰病○下利○若利自止○惡寒而踴臥○手足溫者○可

治○十八、聖期之、傷行附子湯

上條自利手足溫○仍下利也○本條下利手足溫○已利
止也○上條手足之溫未免遲○本條手足之溫未免驟矣
○以下利未畢而利止○乃少陰之本熱自止其利○了卻
屬臟之邪○不得謂非強有力之少陰也○但少陰之本熱
太過○少陰之標陰又不前○故雖腎臟不受邪○而標陰

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

主

受邪○陰爲寒○惡寒是屬標陰之明徵○腎主卧○得卧
是不屬臟之明徵○然旣有少陰之本熱在○曷爲惡寒耶
○上條手足溫脈緊且不惡寒○何以不言脈緊○又一面
惡寒○一面手足溫耶○蓋下焦之陽一升○手少陰遂縱
橫其熱度○與手足諸陽相直接○而不與標陰相直接○
故溫自溫而寒自寒○惡寒是標陰不能禦寒之狀態○溫
乃本熱與手足相依之狀態也○獨是惡寒可也○卧亦可
也○胡踴臥耶○少陰主樞者也○前樞爲少陰之本○後
樞爲少陰之標○苟前後標本兩相稱○斯陰樞之兩端無
斷梗○亦不至於踴○篇內踴狀不多見○惡寒亦不多見

者○本微陽標亦微○標細本亦細○前後不相左故耳○下

下焦之陽以手少陰君火爲主相易
車輶通泄一點

助

少陰標陰主脊骨

身屬太陽主管故不惡寒者

身屬太陽主管故不惡寒者

臂為作過之官位乃多馬腎也

骨髓之氣骨髓之氣有虧是失

強

真心痛。耽鬱。死若。腎心痛乃
因腎而波及心而死治

文附子湯證背面與前面不相若則背惡寒。通脈四逆湯證裏寒與外熱相若則身反不惡寒者此也。何以下文惡寒而身踰一不治。惡寒而身踰一主死耶。彼證失强者其腎。攣曲者其躬。望而知其腎疾當病腰折之形。與腎心痛之偃僂相鬱鬱。故曰身踰。本證無身字。不過形容少陰雖伏之病態。氣化瑟縮而不支耳。且身踰與踰臥大有別。下文但欲臥至五六日不得卧寐者死。可見少陰病以入卧爲難得。况其卧而後踰。不卧未必踰乎。况其爲手足溫之踰臥乎。斷曰可治。非有一成不易之治法也。收回少陰之本熱。貫澈少陰之標陰。師其意以治之可也。卽不治之亦已腎治於裏矣。聽其讀過傷寒論卷十二。

少陰篇解

圭

臥治尤勝於誤治也。

本節仍可付附子湯

少陰病。惡寒而踰。時自煩。欲去衣被者。可治。

上條臥可治。溫可治。本條不言臥則臥不足言可知。

不言溫則溫不足言可知。烏乎可治。不知上條是少陰

之本熱過於伸。伸出手足則並於陽。陽氣不寒。故覺

其溫。本條是少陰之標陰過於縮。縮入腎臟則並於陰

○陰氣不安。故不書其臥耳。究未明言其不得臥也。

特上條踰臥明明無煩字。下文不得臥明明有煩字。是

最不便於臥者莫如煩。况曰自煩而不曰心煩。顯非不

堪邪擾之煩。純爲不得臥之故而自煩。幸在時自煩卻

非時時煩。尙有得臥之時間。大率多臥之時則煩少。

傷寒論傳一脉空是皆有端

言時時有分別

少卧之時則煩多焉已。○得毋煩時欲去衣被。○不煩時不欲去衣被耶。○又非時欲去衣被也。○第覺衣被對於惡寒如隔壁。○去之病形不加多。○不去之病形不加少也。○何

以上條不言欲去衣被耶。○彼證之惡寒。○流露於背膂。○貼近太陽署之底。少陰。○無去衣被之必要。○溫覆聊勝於不溫也。○本證之惡寒。○退藏於坎腎。臟。○非貼近太陽署之底。

無不去衣被之必要。○溫覆適形其太溫也。○本條與上條之比較。○與其溫而不煩。○不若煩而不溫。○與其跪而非卧。○不若卧而且跪。○要其前本後標之相失則一也。○皆非窮於方治者也。○上條少陰之標陰脫離其本位。○當消息腎息心部之表。○本條少陰之標陰脫離其本位。○當消息腎讀過傷寒論卷十二

少陰篇豁解

齒

治之裏。○互其法以處方可也。○且有無方之方在。○少陰內經不治取陽明。○未有胃和而卧不安之理。○以藥治之也可。○卽以水穀治之。○亦無不可矣。

少陰中風。○脈陽微陰浮者。○爲欲愈。二二醫期
風者寒之標。○陽之稱也。○以少陰之本熱。○直接寒邪之標陽。○不獨陰病得陽證。○直是少陰得陽病。○故特書少陰中風。○與太陽中風名同而實異。○異在太陽有頭痛。○少陰之脈不循頭。○無所謂發熱。○太陽有汗出。○有惡風。○少陰之熱非外浮。○無所謂發熱。○太陽有發熱。○少陰之既蟄封其汗。○並靜歛其風。○汗固無可出。○風亦無可惡也。○惟傷寒則曰體痛。附少陽。○曰惡寒。○曰反發熱。附少陽。○曰反汗出

○○傷寒且有太陽證○中風絕無太陽證○無證處便是證○此其所以爲少陰中風也○太陽中風陽浮而陰弱○少陰又陽微而陰浮○何以不曰脈陽浮陰微耶○假令陽脈浮○是病在陽○太陰脈微○是病在陰○豈非太少兩感乎○正惟其陽微○適肖其寸脈病在陰○正惟其陰浮○適形其尺脈病見陽○而後不涉太陽中風脈○不象少陰傷寒脈也○曰爲欲愈○何以無事桂枝湯耶○太陰中風四肢煩疼且不行桂枝○況全無桂枝證乎○太陰脈浮○發汗宜桂枝○少陰陰浮○又何取桂枝以強汗乎○上兩條可治尙不立方○况明明欲愈○何立方爲乎○元御闕者字非○嘉言者字易乃字尤非○

讀過傷寒論卷十二

少陰篇豁解

五

少陰病欲解時○從子至寅上○

少陽入相火一起而還卯
皆之可以治於裏者有相火生
每年死人最多為壬寅十月
育

畢竟子爲冬令○坎腎所司○少陰之夜氣猶帶寒○且衛氣行陰未盡○夜半不過爲陰中之陽耳○至寅上始有平旦之氣也○雖曰陰從陽解○仍不離乎陰從陰解也○

○○灸少陰七壯○

下文吐利一主死○一主欲死○脈不至亦主死○以少陰吐利無熱證○大都與死爲鄰○就令手足不逆冷○不過手足未死耳○脈不至則脈先死○脈既不足恃○手足尙

○可恃乎。欲向死中求其不死。又不能援手足反溫爲先例也。○吐利非徒自下利之比也。○惟不但反溫而反發熱。斯與上文脈暴微者不同論。勿認爲邪從少陰之本氣化熱也。○脈不數。○何得爲少陰以熱勝乎。勿認爲邪從太陽之標氣化熱也。○脈不浮。○何得爲太陽以熱爭乎。○又非如下文脈沉之反發熱。可行麻黃附子細辛也。亦非如不下文反不惡寒之外熱。當主通脈四逆也。素問熱論明明熱雖甚不死。然必尋出其所以發熱之原因。而後能確定其不死也。○緣十二經脈。皆少陰之本熱所構成。其在天爲熱者。在體爲脈。○熱在則脈無不至。脈不至則熱必不在。○經謂少陰。不至者厥。未有云少陰不至者熱也。○其熱度究從何部假借得來耶。吾謂少陰之本熱。不能自固其經。少陰而流散於絡。經者內連臟腑而主內。○絡者外連皮膚而主外。邪入於經。則熱浮於絡。脈法謂血寒則發熱。以極寒傷經之真相。反現極熱傷絡之假相。是絡熱卽經寒之反證也。○其所以名走極端者。吐利則手足少陰無兩全之地。手少陰脈因上吐而自去。足少陰脈因下利而不來。脈氣斷卽熱氣斷。手足不逆冷者寡矣。手足不冷而少陰冷。直是脈中無熱脈外熱。所謂是以知病之在脈者非歟。脈者火之神。惟火能入脈。灸少陰太谿二穴。引絡中之熱以入脈。逐經中之寒以出脈。庶不死誠非倖致耳。七壯始畢。

賣體易業論卷十二

卷之三

1

經數波諸斜紋浮面可見者為格

三陽而連腑而絡臟三陰而連臟而
絡腑
極寒是寒而化極極熱是寒
而化熱極寒傷經極熱傷絡
病很多為寒性少陰乃有不文

吐手サ陰為邪而害利足サ陰
為邪所害

○○逐經中之寒以出脈○○庶不死誠非倖致耳○○七肚始畢
○○惟火能入脈○○灸少陰太谿二穴○○引絡中之熱以入脈
○○熱脈外熱○○所謂是以知病之在脈者非歟○○脈者火之神
○○手足不逆冷者寡矣○○手足不冷而少陰冷○○直是脈中無
○○而自去○○足少陰脈因下利而不來○○脈氣斷卽熱氣斷○

者○在天之熱其數七○經盡之日亦其數七也○火與熱無牴觸耶○熱與火同氣○必少陰之熱生於火○而後少

陰之熱不死於熱○以其表面上之發熱○乃反寒爲熱○

轉瞬便反熱爲寒矣○反治之正慮其一再反也○

少陰病○八九日○一身手足盡熱者○以熱在膀胱○必便

血也○

少陰篇解

上條少陰經未盡而熱先盡○則反寒爲熱○本條少陰經盡而熱未盡○又非反熱爲寒矣○以病至八九日○當然醞釀成熟○度不過餘邪之灰燼耳○何居乎一身手足盡熱耶○豈非三陰三陽之熱狀○獨以本證爲最烈耶○本論發熱身熱潮熱不勝書○往來寒熱不勝書○大都手熱

讀過傷寒論卷十二

少陰篇解

七

人手厥脉生於左手掌所

居於右

瘡勞亦潮熱亦尺熱因雷龍

之火上竄也

有外感成瘡勞者因肉傷

於筋外感至陰盜石如舊即

成瘡勞

瘡勞無由於失精亡血爻

但今得

癰膿矣○熱不除者明明便膿血矣○何嘗盡熱耶○申言之曰以熱少陰熱在膀胱○則寒水不能勝熱火○宜其手足太陽之熱度無界線○獨是太陽熱結膀胱○其人如狂無身熱

○熱在下焦○其人發狂無身熱○熱不熱之相去○何逕庭若是耶○陽浮者熱自發○不浮則熱不發○彼證一則

太陽與熱結在膀胱○烏乎熱○一則太陽隨經鞭在小腹○

○烏乎熱○本證則在體之脈之熱○合少陰之病之熱○

桃核承氣湯抵當湯征固血肉瘀
狂牽筋血未成瘀別未狂
便血承膀胱諸列小便血非承
膀胱諸列大便血

洛陽經經淺于臟

脚腫兼用人扇之者必安其真武
為燒或加龍虎不可易方此症
得愈者亦少若下利而熱不著
可免

充類而及於太陽。烏得不一身盡熱乎。何以熱不在腎而殃及膀胱耶。膀胱者州都之官。熱流膀胱亦其常。且八九日少陰經氣旁礴。餘邪亦不久留。遂藉衝脈爲導線。從少陰之大絡入胞中。其熱非由腎臟出膀胱。乃由血海注膀胱也。熱而不狂者。血未成瘀耳。何爲必便血耶。內經胞移熱於膀胱則癃溺血。金匱熱在下焦者則尿血。正惟膀胱之熱。奪胞中之血。故不下血而便血也。夫使下利便膿血。又少陰臟寒而血泄。腎經熱漲則臟寒縮。餘邪與腎家無涉。反假道太陽之水府而出。則盡熱處仍是餘邪出路之端倪。本條與上條讀過傷寒論卷十二

少陰篇豁解

大

之比較。彼證熱盡則不死亦死。灸之所以留無盡之藏。留本熱○本證熱盡則有生而無死。灸之必立盡其無盡之藏。○上條之熱是反觀。本條之熱。又上條之熱之反觀也。○少陰病。但厥無汗。而強發之。必動其血。未知從何道出。○或從口鼻。○或從目出。○是名下厥上竭。爲難治。附本熱○上言吐利。當厥而不厥。反發熱以掩其厥。本證不言熱。○駭人處在便血。本證手足但厥。惑人處在無汗。○與其假道便血以去邪。毋寧假道微汗以去邪。以其但厥無汗。○髮鬚少陰病有表證。○髮鬚少陰病無裏證。似乎發汗無所害也。○厥陰篇諸四逆厥不可下。禁下有明