

皇漢醫學叢書

證治摘要

中川成章 編

皇漢醫學叢書

證

治

摘

要

人民衛生出版社

皇漢醫學叢書
證治摘要

開本: 787 X 1092/32 印張: 5 字數: 81千字

中川成章 編

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區綾子胡同三十六號 •

人民衛生出版社印刷 • 新華書店發行
長春印刷廠

統一書號: 14048 • 0788

定價: (9) 0.60元

1955年11月新1版—第1次印刷

1956年5月新1版—第2次印刷

(長春版)印數: 3,001—6,000

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

證治摘要目次

卷上

傷寒	一	癲癇狂健忘驚悸不寐	三〇
傷風	三	勞病失精盜汗陰痿	三二
瘟附斑疹	三	肺痿肺癰	三四
中寒	四	腸癰	三六
喝霍亂	五	諸失血	三七
中濕	七	痰飲咳嗽	三九
瘡	八	喘哮	四二
痢	一〇	眩暈	四三
泄瀉	一三	大便閉	四四
傷食宿食	一四	小便閉	四四
嘔吐反胃膈噎	一四	淋	四五
噦	一八	消渴	四七
水腫	一九	中風	四八
鼓脹腹滿	二二	腳氣痿躄	五二
黃疸	二四	痛風鶴膝風	五四
黃胖	二六	頭痛	五六
癰疽疔	二六	肩背痛	五八
蟲	二九	心痛胸痺結胸	五八

腹痛	六〇	疳癰	九六
腰痛	六二	痘瘡	九八
眼	六三	麻疹	一〇二
耳	六五	打撲金瘡破傷風	一〇三
鼻	六六	蟲獸傷	一〇六
牙齒	六八	湯火傷灸瘡漆瘡	一〇八
口舌	七〇	諸骨哽竹木刺	一〇九
咽喉	七二	微瘡	一一〇
卷下		癰疽	一一三
妊娠	七五	疔瘡	一一五
產前後	七六	瘰癧	一一六
經閉	八〇	疥癬臙瘡	一一九
赤白帶下崩中漏下	八二	痔脫肛	一二一
乳病	八四	卒死	一二五
小兒初生雜治	八七	癰	一二八
鵝口	九〇	附錄	
吐衄	九〇	家方	一三〇
丹毒	九一	製鐵粉法	一三二
夜啼客忤	九二	方輿所載後世方	一三三
馬脾風	九三	辨附子暝眩與中毒	一三五
急慢驚	九四		

證治摘要卷上

東都 中川成義著 裴卿譯

傷寒

夫傷風寒治法。本論已盡矣。傷寒論。則吾門日夜所講習也。今雖似蛇足。爲蒙生記傷寒傷風治法之梗概。如左。

麻黃湯 大青龍湯 傷寒。頭痛發熱。身疼腰痛。無汗者。用麻黃湯。發汗。

汗出而煩躁。脈浮緊者。用大青龍湯。又初麻黃湯症。而有渴者。又發熱。

而渴。不惡寒。脈浮者。皆用大青龍湯而發汗。汗流則以手巾拭之。休息。

半時許。而復取汗。如此凡三日三夜而止。至四日有頭痛。微惡寒。微。

渴。寒熱往來等證。則用小柴胡加桂枝石膏湯等。

小柴胡湯 大柴胡湯 傷寒五六日。往來寒熱。胸脇苦滿。心下痞硬而。

嘔者。用小柴胡湯。若鬱鬱微煩。大便鞭者。兼用大柴胡湯。若清便自調。

而有渴者。小柴胡加石膏湯。漸加渴者。小柴胡合白虎湯。

小承氣湯 調胃承氣湯 張子和曰。一日一便。乃常度也。按病人亦然。

殊傷寒者。以大便快通爲佳。故陽明篇曰。大便鞭則譫語。小承氣湯主。

之。若一服譫語止。更莫復服。又曰。胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。

方極以腹滿。與急迫區別此二方。凡用柴胡及白虎等之症。宜腹滿而。

大便鞭者。兼用小承氣湯。急迫而大便鞭者。兼用調胃承氣湯也。

白虎湯 大承氣湯 傷寒六七日。大渴引飲。舌上乾燥而煩者。用白虎湯。至七八日。舌上黑胎乾燥。潮熱便秘。腹滿譫語者。用大承氣湯。此症而有。大渴引飲。則白虎承氣並用。重者白虎五貼。承氣五貼。胃實甚者。用承氣五貼。而僅有大便一行。此症強人可治。羸者危矣。是初用達原飲。及柴胡桂枝湯等。而失取汗。是以十分之邪氣。皆輻湊腹。故見此症。初起用麻黃大青龍。而三日發汗。則邪氣半從汗去。決不至此重症也。余累試累驗。凡傷寒陽症初起。十之八九宜用大青龍。麻黃分量極多。發汗之神方。無長於斯。但大便滑利。一二行者。亦有變陰疑。故用麻黃湯為佳。近來信吳又可徒。不知發汗有效於外邪。初與達原輩而誤人性命者多矣。故表而出之。至汗下後變症之治法。則詳于本論。故不贅于此。

麻黃附子細辛湯 麻黃附子甘草湯 陰症初發。以此二湯。微汗之。若陰陽疑似之症。則先用麻黃湯。服後不微汗。但惡寒者。宜撰用此二湯。微汗後。變症之治法。詳于本論。

按外臺祕要。療大行病及溫病。一二日者。用麻黃石膏葛根等。厚覆取汗。以當知吳又可之非。

千金方云。傷寒雅士之辭云。天行溫疫。是田舍間號耳。肘後方云。貴勝雅言。總呼傷寒。世俗因號為時行。外臺許仁則論。天行病云。此病方家呼為傷寒。傷寒論集成云。王叔和以冬時者。為傷寒。以他時者。為時行。

寒疫。大非古義也。蓋疫卽傷寒。傷寒卽疫。其謂之疫。取諸役役不住。其謂之傷寒。取諸所感之源。略下按溫疫論。邪在膜原之說。如捕風捉影。妄誕附會。迷後人。不可從矣。

傷風

本事方云。今傷風。古謂之中風。按後世又謂之感冒。

桂枝湯 太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。

桂枝加葛根湯 太陽病。項背強几几。反汗出惡風者。

桂枝加厚朴杏子湯 桂枝湯證。而胸滿微喘者。

葛根湯 太陽病。項背強几几。無汗惡風者。

桂枝麻黃各半湯 桂枝湯。麻黃湯。二方證相合者。

桂枝二麻黃一湯 桂枝湯證多。麻黃湯證少者。

桂枝二越婢一湯 桂枝湯證多。越婢湯證少者。

柴胡桂枝湯 小柴胡湯。與桂枝湯二方證相合者。

小柴胡湯 胸脇苦滿。或寒熱往來。或嘔者。

柴胡姜桂湯 小柴胡湯症。而不嘔不痞。上衝而渴。腹中有動者。

小柴胡加桂枝湯 小柴胡湯證。而上衝者。

小青龍湯 或加石膏 咳喘上衝。頭痛發熱惡風。乾嘔者。

瘟附班疹

大青龍湯 葛根湯加石膏。或桔梗。小柴胡加石膏湯。大柴胡湯。或

加芒消石膏。 蟬針。 表裏俱解。腫不消者。日以水蛭八九枚。令吮腫上。

白虎湯。 治發班口燥。煩躁而渴者。 應鐘散。

按丹溪。耳下頤頰腫爲蝦蟆瘟。回春。頭頂腫起。曰大頭瘟。正宗合二症。名時毒。曰夫時毒者。天行時氣之病也。初起與風寒相類。惟頭面耳項發腫爲眞。云云初用大青龍。而發汗。後小柴胡加石膏湯。施蟬針。十二三日而愈。偶有膿潰者。宜從外治之法。發班初發。葛根湯。熱劇者大青龍湯。煩躁而渴者。白虎湯。或兼用犀角。後藤香川二翁。治時毒。初用七味敗毒散。十味敗毒去人參前胡獨活。和田氏療時毒內陷咽喉腫痛者。用桔梗湯或涼膈加石膏湯。 方輿載六物敗毒散。及連翹湯。牛蒡芩連湯。

中寒

附子理中湯。 治五藏中寒。口噤四肢強直。失音不語。昔有武士守邊。大雪出帳外。觀瞻。忽然暈倒。時林繼作隨行。醫官灌以此藥兩劑。遂醒。乾姜附子湯。 治中寒卒然暈倒。或吐逆涎沫。狀如暗風。手脚攣搐。口噤。四肢厥冷。或復燥熱。三因方只載此二方。中寒病門。蓋始于此。

中寒之證。由平素體氣虛弱。冬月出外。一時爲嚴寒所中。則口噤失音。偏體拘急。四肢厥冷。畏寒腹痛。脈息沉微。昏沉不知人事者。宜急用熱酒入生薑汁和而灌之。候少甦醒。然用姜酒。脈出者生。不出者死。灸法。神闕。丹

田、關元用艾火。各灸三七壯。手足暖。脈至。知人事。汗出。卽生。如無汗。手足不暖。不省人事者死。危證簡便。 謙齋曰。中寒者。後世所謂傷寒直中陰症也。有持亦云。

按病源千金及翼外臺聖濟皆無中寒病門。至宋末始立一病門。予意中寒者。凍死之輕者也。良山翁云。中寒者。凍病也。櫟窓先生編輯急救選方。合中寒與凍死爲一病門。大得予意。世俗稱中寒者。傷風症。或兼痧者。間亦有焉。宜隨證治之。方輿載桂枝湯及桂枝人參湯。當歸四逆。同加吳茱萸生薑湯。四逆湯。

喝霍亂 宜與傷食門參考

白虎加人參湯 金匱云。太陽中熱者。喝是也。汗出惡寒。身熱而渴。

按聖濟中喝門。初載白虎湯。其主治云。治中熱。喝。頭痛。汗出。惡寒。發熱而渴。

五苓散 脈浮。小便不利。微熱。消渴者。治傷暑煩渴。引飲無度。三因方

治傷暑身熱。口乾煩渴。心神恍惚。小便赤澀。大便泄瀉者。回春 按水瀉加滑石效。

霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。理中丸主之。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。按嘔吐或加半夏生薑。去桂。

理中湯 按千金霍亂門。治中湯。卽此方也。方後文云。若轉筋者。加石膏

三兩。三因方亦加石膏。醫通云。脈雖沉細而轉筋。煩躁發熱者。當作熱治。大抵霍亂一毫口渴轉筋者。卽係熱症。謙齋云。轉筋皆熱症。聖濟霍

亂轉筋門。無附子劑。外治有淋足附子湯。東郭云。四逆湯證。有轉筋。輕而不甚者也。別錄及活人書。濟世本草。轉筋或用附子劑。宜詳察而處方也。

吳茱萸湯 少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。

按此方。主嘔吐煩躁。四逆湯主下利厥冷。有持曰。霍亂後。手足厥逆者。四逆湯之所主也。此症而嘔不止。煩躁者。吳茱萸湯症也。此湯以嘔吐爲準。世醫用小半夏等無效。術盡束手時。用此方。奏意外之效。然藥苦烈。宜少少頻服之。

桂枝湯 吐利止而身痛不休者。

小半夏湯 或加茯苓 茯苓四逆湯 四逆湯或加參 通脈四逆加

豬膽汁湯。

雞屎白散 治轉筋入腹者。治霍亂轉筋入腹欲死。聖傳

生姜五兩切 右一味。用無灰酒一升。煎取八合。頓服。便差。

灸足外踝骨尖。上七壯。治轉筋十指拘攣。不能屈伸。景岳

霍亂吐瀉不已。灸天樞氣海中脘。四穴立愈。正傳

霍亂已死。而胸中尚有煖氣者。灸之立甦。其法以鹽填滿臍孔。灸之。不計

壯數。正傳

按此灸極妙。吐利厥冷。煩躁。冷汗出者。灸神闕數十壯。屢得效。霍亂治法。無捷於斯。

轉筋不止起死之方。灸承筋。又不止。則灸湧泉。針經

又轉筋灸承山。

指南

千金方霍亂治四逆吐少嘔多者。用附子粳米湯。心下痞。用甘草瀉心湯。凡此病。定一日不食爲佳。

備急圓 大承氣湯 此二方治乾霍亂。

乾霍亂之狀。心腹脹滿。攪刺疼痛。煩悶不可忍。手足逆冷。甚者。流汗如水。大小便不通。求吐不出。求利不下。須臾不救。便有性命之慮。宜急與巴豆等。三味丸服之。服取快利。

外臺許仁則論。三味丸即備急丸也。

病源云。其腸胃先挾實。故不

吐利。名爲乾霍亂也。案奇效厚朴湯。療乾霍亂。即大承氣加良姜湯也。

千金治乾霍亂。有鹽吐方。正傳云。乾霍亂。死在須臾。升降不通故也。宜吐

以提其氣。最良法。景岳舌捲囊縮。轉筋入腹者死。門入和田氏轉筋甚者。

用良方吳茱萸湯。吳茱萸。木瓜。食鹽。三味。等分。同炒令焦。水煎服。回春

云。夏月有四證傷寒。傷風。中暑。熱病。疑似難明。

按夏月不拘遠行家居。壯熱無汗者。傷風寒之類也。宜用麻黃大青龍等。而發汗也。有汗而渴者。中喝也。宜用白虎五苓等也。古云。暑傷氣

分汗如傾。方輿載香薷飲及消暑湯生脈散。

中濕

麻黃加朮湯 濕家身煩疼。發其汗爲宜。

麻黃杏仁薏苡甘草湯 一身盡痛。發熱日晡所劇者。濕家始得病時。

可與此方。外臺

桂枝附子湯 身體疼煩不能自轉側者。

桂枝附子去桂加朮湯 前方證而大便堅小便自利者。

甘草附子湯 主治見痛風。

病因考及說約中濕門載五苓散香川氏云小便不利四肢浮腫而渴者艮山翁云濕氣從小便去也和田氏中濕初發有汗者用桂枝加朮湯。

按金匱云中濕之脈沉而細小便不利大便反快此中濕之一候也中濕初一身盡痛不異痛風然如法施治則不踰月而瘥不似痛風荏苒彌歲月金匱謂中濕死症者因其誤治也意中濕者痛風之輕者也。

瘧

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

柴胡桂枝

湯

柴胡姜桂湯

瘧瘧為陽瘧宜撰用此二方。

柴胡去半夏加枳實湯

瘧病發渴者

亦治久瘧。

柴胡加芒消湯

欲成瘧母者

白虎加桂枝湯

溫瘧者

牡蠣湯 蜀漆散

夾鐘丸

大柴胡湯

張會卿云小柴胡湯加常山

二錢截瘧如神。

截瘧湯方

常山 草菓

知母

貝母 各等分。

右四味以酒三勺漬之夜露

一宿發日早晨以水二合煮取一合服臨發查再煎服或草菓代檳榔

最效。

又截瘧方 發日早晨。用備急丸一分。或用吐劑亦效。

按外臺有單常山湯。煎法服法如截瘧湯。間日瘧五六發。則宜服截菓。每日發者。宜候十四五日後。邪氣漸衰。而截之。截菓宜陽瘧。不宜陰瘧。陰瘧者。宜候數發之後。爲陽瘧而截之。陰陽謂晝夜也。小兒瘧疾。因蟲者。或兼服鷓鴣菜湯。瘧用附子劑者。希有焉。千金瘧門有附子劑三方。外臺八方。宜隨證治之。凡瘧瘥後。禁飲酒房事遠行。瘧并瘧母灸法。脊際自七九至十三四椎。瘧振寒少熱。面青大便澹泄者。用菓附

湯。生瘧和田氏截瘧灸法。灸大椎尖頭七壯。或灸章門。不截則灸承山。尙無效者。灸湧泉。又云。凡瘧者。惡寒始於足指頭。有此症者。瘧症不具。亦爲瘧治而可也。又云。瘧用常山劑。不愈者。化毒丸二分。發日早

晨。冷水服。有效者。必下黑便也。若暝眩則輕者。用冷水。重者。冷水內朱或石膏。攪服。或藍葉煎服。又云。瘧母。用鼈甲類。難治者。用化毒丸二分。效。按醫方考云。瘧發時。獨寒無熱。脈遲者。用七棗湯。卽附子大棗

生姜也。又云。瘧發時。頭疼身熱。脊強脈浮者。大陽症也。麻黃羌活湯主之。麻黃羌活。防風。甘草。四味也。瘧疾寒熱轉大者。從卯至午發。宜

柴胡湯。從午至酉發者。邪在內。宜大承氣湯。從酉至子。或至寅發者。邪在血。宜桃仁承氣湯。下之微利後。更以小柴胡湯。撤其邪可也。藥方規矩

治瘧病苦渴。外烏梅二十右一味。以水三盞。煎取一盞半。去烏梅和蜜一

匙分二服。瘧脈弦而緊宜下。浮大者宜吐。弦遲者宜溫。傳正 牛山云。凡瘧疾。二三發之中。宜用發散劑。方輿載柴胡鼈甲湯。及鼈甲一味。酒服散菓。

痢

葛根湯 痢有表證者。用此湯。三四日宜發汗。

葛根加半夏湯 前方證而嘔者。

葛根黃連黃芩湯 痢惡寒止。有熱者。或下利脈促。喘而汗出者。

黃芩湯 痢腹拘急。心下痞者。

黃芩加半夏生薑湯 前方症而嘔者。

大柴胡湯 心下痛。有身熱者。

論曰。發熱。云云 心下痞。嘔吐而下利者。按之心下滿痛者。

厚朴七物湯 痢腹滿者。或中脘否塞者。紀

大承氣湯 身熱腹滿。心下痛甚。口舌乾燥者。論曰。自利清水。云云 心下

必痛。口乾燥者。下利三部。云云 按之心下堅者。下利脈遲而滑者。

白頭翁湯 熱利下重者。下利欲飲水者。以有熱故也。熱多難用下

劑者。紀

白頭翁加甘草阿膠湯 熱利下重。帶膿血者。產後下利虛極。金匱 按產

後痢妙。

黃連湯 半夏瀉心湯 熱解痢減。心下痞。或痞嘔。食不進者。宜撰用此

二方。

大物黃芩湯 桂枝人參湯 真武湯 痢陰症或遺尿者。

桂枝加芍藥大黃湯 大實痛者。

小建中湯 桃花湯 赤石脂禹餘糧湯 禹餘糧丸 方家 治久痢久瀉。

無熱無後重。用附子不止。灸腹不愈。飲湯直下。食粥直下。日羸瘦向死

者。禹餘糧 赤石脂 各五分 阿片 小豆粒許 輕上品

右三味糊丸。一劑二度白湯下。即愈。起死回生。累用累驗。勿多服。多服

則發嘔吐。

黃連阿膠湯 久痢。心下悸而煩。不得眠。便膿血者。

大黃牡丹皮湯 膿血痢。下赤白如魚腦者。

桃核承氣湯 下紫黑色腹痛後重。異常者。瘀血也。 門入

鯽魚鱸 痢五六日。腹痛不止者。承氣丸。

紫丸 痢腹痛甚者。

輿村翁云。痢疾久不愈者。腸中裏面。外皮爛。而下赤白如魚腦。用大黃牡

丹湯。或薏苡附子敗醬散等。則速愈。此微腸離之治法者也。和田氏贊之

曰。卓見也。按和田氏實候而下如魚腦者。用牡丹湯。虛候者。用千金駐

車湯。其方。黃連六兩。當歸阿膠各三兩。乾姜二兩。右四味煎服。凡此二方。

及右之諸方。皆痛在臍以上。只桃花湯。及禹餘糧湯。禹餘糧丸者。痛少少

在小腹者也。痛在臍以上者。禁用止瀉之藥。常識此勿誤。入門云。凡痢