

北京市药品标准

(1996年版)

北京市卫生局 编

化学工业出版社

北京市药品标准

(1996 年版)

北京市卫生局 编

化学工业出版社

· 北 京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

北京市药品标准:1996 年版/北京市卫生局编.-北京:
化学工业出版社,1996.9
ISBN 7-5025-1761-8

I. 北… II. 北… III. 药品-地方标准-北京-汇编-1996
IV. R926

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14208 号

出版发行: 化学工业出版社(北京市朝阳区惠新里 3 号)

社长: 俸培宗 总编辑: 蔡剑秋

经 销: 新华书店北京发行所

印 刷: 北京市通县京华印刷厂

装 订: 三河市前程装订厂

版 次: 1996 年 11 月第 1 版

印 次: 1996 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 $1/16$

印 张: 23 $\frac{3}{4}$

字 数: 608 千字

印 数: 1—3000

定 价: 78.00 元

编写人员名单

于魁一
韦文瑞
周立春
赵 林
冀学芳

马丽云
刘瑞玲
周淑平
袁 林

王承芬
刘燕鲁
张 伟
徐 英

王秀敏
孙玉德
张学武
凌大奎

前 言

药品标准是国家对药品质量规格和检验方法所作的技术规定,是药品生产、供应、使用、检验和管理部门必须共同遵守的法定依据。制订和颁发药品质量标准是加强药品质量监督管理,促进药品生产与发展,保证人民用药安全有效的一项重要措施。

根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定及卫生部关于制订地方标准的指示精神,我局组织有关部门,在《北京市药品标准(1983年版)》的基础上,对我市1995年底以前批复的西药药品地方标准进行筛选、整理和修订,编印成《北京市药品标准(1996年版)》,作为我市药品质量监督检验的法定标准。

本版标准共收载化学药品、抗生素药品、生化药品及其制剂等共计446种,包括我市已批准生产而中国药典、卫生部药品标准未收载的品种。过去我市批准的药品质量标准,凡与本版标准不符者,均按本版标准的规定执行。凡未收载入本版标准的品种,仍按市卫生局批文所附质量标准执行。

为了加强药品名称的规范化管理,在制订本版标准时,根据卫生部颁发的《药品命名原则》对所载药品进行了统一的修订,原批准的名称放在括号内,以供参考核对使用。

本版标准在执行过程中,如有不完善或错误之处,望及时提出意见,以便修订完善。

北京市卫生局

1996年9月

凡 例

一、本标准收载 1995 年底以前由北京市卫生局批准生产的药品(不包括中国药典、卫生部药品标准的品种)共 446 种。

二、药品的名称、按照卫生部药典会编纂,由化学工业出版社出版的《药名词汇》,对原批准的药品名称进行了修订,如痛灭定钠片,正名修订为托美丁钠,副名为痛灭定钠。

三、正文部分按药品中文名笔划顺序排列。

四、本标准所用的专门术语、度量衡、温度、试药、试液、缓冲液、指示剂、标准溶液及共同性操作方法等,除另有规定外,均以中国药典及卫生部药品标准现行版的凡例和附录为依据。

五、本标准收载的品种,其鉴别、检查及含量测定等项,均按本标准规定方法进行检验,如需采用其他方法,应将该方法与本标准规定的方法作比较试验,根据试验结果掌握使用,但在仲裁时,仍以本标准规定方法为准。

六、本标准收载的药品,除另有规定外,均应符合卫生部颁发的“药品卫生标准”的有关规定。

七、本标准中各种制剂所用原料及辅料均应符合中国药典、卫生部药品标准及卫生部的有关规定。

八、本标准检验方法中所采用的标准品、对照品,除卫生部颁发的以外,其他须经北京市药品检验所审查同意后方可使用。

九、本标准中收载的颗粒剂品种系指原冲剂和干糖浆的品种。

十、本标准的解释和修订权属北京市卫生局。

目 录

正文品名

一画		乙		山梨酸钾	25
				口腔溃疡灵胶囊	25
				大蒜素胶丸	26
乙双吗啉胶囊		1		四画	
二画		十人力丁		天 贝 风 无 止 中 王 牙 双	
十一烯酸癣药水		1		L-天门冬氨酸	27
十二烷基硫酸镁		2		贝诺酯胶囊(扑炎痛胶囊)	28
人胎盘片		3		风湿松片(瑞培林片)	29
力勃隆片		3		无味黄连素	30
丁维钙粉		4		止痒清凉油(速效止痒油)	30
三画		小 三 山 口 大		止咳酮	31
小儿无味黄连素片		5		止咳酮片	32
小儿双嘧啶片		5		止咳酮胶囊	32
小儿对乙酰氨基酚灌肠液		6		止痒乳	33
小儿克感敏颗粒剂		7		止喘消痰片	33
小儿补血颗粒剂		8		中性蛋白酶片	34
小儿多维钙颗粒剂		9		王浆软胶囊	35
小儿双扑片(儿童退热片)		9		牙周康药膏	36
小儿消炎散		10		牙痛水	37
小儿消食片		11		牙痛安胶囊	38
小儿消咳新片		12		双氯芬酸钠(双氯灭痛)	39
小儿速效感冒片		13		双氯芬酸钠片(双氯灭痛片)	40
小儿速效感冒颗粒剂		14		双氯芬酸钠注射液(双氯灭痛注射液)	41
小儿息喘酚片		16		双嘧啶颗粒剂(增效磺胺嘧啶颗粒剂)	41
小儿复方磺胺甲噁唑颗粒剂(小儿复方				五画	
新诺明冲剂)		16		乐 可 尼 艾 四 布 石 乌	
小儿联磺甲氧苄啶颗粒剂(小儿增效联磺				皮 扑 对 去 甲 丙 甘 左 长 占	
冲剂)		18		乐口福钙糖片	42
三水杨酸胆碱镁片(痛炎宁片)		19		乐得胃片	43
三尖杉酯碱		20		可尔消炎止痒液	45
三尖杉酯碱注射液		21		可乐定贴片	46
三合激素注射液		22		尼可地尔(硝烟酯)	47
三磷酸胞苷二钠		23		尼可地尔片(硝烟酯片)	48
三磷酸胞苷二钠注射液		24		艾司唑仑注射液(舒乐安定注射液)	48
				四合维生素片	49
				四环素醋酸可的松眼膏	50

布洛芬胶囊	51	肌昔口服液	82
布酚宁(盐酸苯丙酚胺)	52	肌昔颗粒剂	82
布酚宁片(盐酸苯丙酚胺片)	53	多抗甲素口服液	83
石杉碱甲	53	多抗甲素片	85
乌洛托品片	54	多种钙片	86
乌洛托品注射液	55	多维钙颗粒剂	86
皮肤软膏	55	多维葡萄糖	87
皮炎平软膏	56	合成天麻素	88
皮炎宁酊	57	合成天麻素片	89
皮康霜	57	合成天麻素注射液	89
皮癣净	58	合成天麻素胶囊	90
扑热安片	59	西咪替丁注射液(甲氰咪胍注射液)	91
对乙酰氨基酚婴儿滴剂	60	灰指甲药水(美尔指)	91
对乙酰氨基酚糖浆	60	托美丁钠胶囊(痛灭定钠胶囊)	92
去痛胶囊	61	安妥明丙二酯	93
甲净贴	62	安尿通胶囊	94
甲氧苄啶注射液	63	安热静注射液	95
甲硝唑胶囊	64	安腹痛注射液	96
丙硫咪唑片	64	安痛定片	97
丙硫咪唑胶囊	65	安搏律定片	98
丙硫咪唑颗粒剂(小儿驱虫干糖浆)	66	创伤贴	99
丙缙草酰胺(癫健安)	67	灯盏花素片	99
甘草锌胶囊	68	杀烈癣霜膏	100
甘氯喘含片	68	齐墩果酸胶囊	100
甘露醇烟酸酯片	69	红霉素栓	101
左旋多巴注射液	69	红霉素胶囊	101
长春胺片	70		
占替诺烟酸盐片(脑脉康片)	71		

六画

优 伤 百 曲 吗 亚 肌 多 合 西 灰 托 安 创 灯 杀 齐 红

优力肤霜	72
优降糖片	72
优福定片	73
伤风止咳颗粒剂	74
百生胍片	75
百喘朋片	76
曲匹布通(乙氧苯酮酸)	77
曲匹布通片(乙氧苯酮酸片)	78
吗多明	78
吗多明片	79
吗多明气雾剂	80
亚油酸丸	81
亚硒酸钠片	81

七画

抗 肝 医 芬 吡 改 咧 味 谷 鸡 尿 乳 苏 克 阿 利 妊 角

抗栓灵含片	102
抗炎松	103
抗炎松片	104
抗炎松软膏	104
抗敏止痒水	104
抗敏鼻炎片	105
抗痛灵	107
抗痛灵片	108
肝宁片	109
肝安颗粒剂	109
医用不粘纱布	110
医用橡皮膏	111
芬那露	111
芬那露片	112
吡拉西坦颗粒剂(乙酰胺吡咯烷酮干糖浆)	

.....	113	γ-苯丙氨酸甲酸酯片(强筋松片)	144
吡哌酸颗粒剂	113	苯氧布洛芬钙片	145
改性纤维素	114	昆明神衰果素片(豆腐果甙片)	145
吡啶拉辛胶囊	115	法可林(障眼净)	146
吠拉扎勃片(去脂舒片)	115	法可林滴眼液(障眼净滴眼液)	147
吠喃妥因肠溶胶囊(吠喃坦啶肠溶胶囊)	116	细辛脑片	148
谷氨酸钠	117	细辛脑注射液	148
鸡眼膏	117	宝肤灵	149
尿素硬膏(剥甲硬膏)	118	金刚感冒胶囊	150
乳酸钙口嚼片	119	肠炎灵胶囊	150
乳酸钙颗粒剂	119	果味维生素C片	151
乳酸菌素片	120	肤疾宁硬膏	152
乳酸菌素颗粒剂	120	肤康松药水	152
L-苏氨酸	121	注射用三磷酸胞苷二钠	153
克菌定	122	注射用乳酸依沙吡啶(注射用利凡诺)	154
克菌定含片	123		154
克感敏片(含非那西丁)	123	注射用血管舒缓素	155
克感敏颗粒剂(含对乙酰氨基酚)	124	注射用酒石酸吉他霉素(注射用酒石酸白霉素)	155
阿司匹林肠溶胶囊	126		155
阿苯片(阿司匹林苯巴比妥片)	127	注射用吠脲苄青霉素钾	156
阿苯糖丸(小儿退热糖丸)	128	注射用穿琥宁	158
阿莫西林颗粒剂	129	注射用P-转移因子	159
阿咖片	129	注射用B-转移因子	161
阿咖散	131	注射用前列腺素E ₁	162
阿魏酸钠片(心血康片)	132	注射用抗乙肝核糖核酸(抗乙型肝炎iRNA)	163
利巴韦林(三氮唑核苷)	132		163
利巴韦林气雾剂(三氮唑核苷气雾剂)	133	注射用抗胃癌核糖核酸(抗胃癌免疫iRNA)	164
利巴韦林眼膏(三氮唑核苷眼膏)	134		164
利巴韦林滴眼液(三氮唑核苷滴眼液)	135	注射用胸腺肽	166
利巴韦林滴鼻液(三氮唑核苷滴鼻液)	136	注射用盐酸环胞苷	168
利血生片	136	注射用盐酸哌甲酯	169
利肝生片	137	注射用盐酸氯胺酮	169
利胆酸片	138	注射用磷霉素钠	170
利胆醇胶丸	138	炎特灵片	171
利福平口腔膜(甲哌力复霉素口腔膜)	139	制银灵片	172
利福平外用膜(甲哌力复霉素外用膜)	140	制霉素栓	173
利福定胶囊(异丁基哌嗪利福霉素胶囊)	141	快诺孕酮片(甲基快诺酮速效避孕片)	174
妊娠素	142	帕吉林片(优降宁片)	175
妊娠素片	142		
角鲨烯胶丸	143		

八画

苯 昆 法 细 宝 金
肠 果 肤 注 炎 制 炔 帕

γ-苯丙氨酸甲酸酯(强筋松) 144

九画

胞 冠 复 食 美
络 氢 香 柳 亮 胃 肺

胞二磷胆碱注射液 175
冠心舒片 176
复方丁氯喘片 177

复方土槿皮酊	178
复方叶酸注射液	178
复方头孢氨苄片(复方苯甘孢霉素片)	179
复方头孢氨苄胶囊(复方苯甘孢霉素胶囊)	180
复方头孢氨苄颗粒剂(复方苯甘孢霉素颗 粒剂)	181
复方利福平胶囊(复方甲哌力复霉素胶囊)	182
复方尿囊素片	183
复方异烟肼片	184
复方长效氨茶碱片	185
复方甲硝唑片	186
复方红霉素片	187
复方谷维素片	188
复方乳酸钠注射液	189
复方阿司匹林散(头痛粉)	190
复方苯甲酸软膏	191
复方金刚烷胺片	192
复方氟尿嘧啶多相脂质体口服液	193
复方哌嗪片	194
复方枸橼酸钠注射液	195
复方吡哆美辛片	196
复方盐酸二氧丙噻片(复方克咳敏片)	197
复方盐酸吗啡酏散	198
复方盐酸利多卡因注射液	199
复方脑安泰片	200
复方益康宁片	200
复方维生素E胶丸	202
复方氯霉素阴道泡腾片(妇炎灵阴道泡腾片)	203
复方硫酸庆大霉素注射液	204
复方硫酸新霉素滴耳液	205
复方联苯双酯片	205
复方联苯双酯颗粒剂	206
复方硝酸戊四醇酯片	208
复方催压降片	208
复方L-盐酸赖氨酸片	210
复方葡醛内酯片(肝荣片)	211
复方磺胺甲噁唑颗粒剂(增效新明磺颗粒剂)	212
复方磺胺甲噁唑胶囊(复方新诺明胶囊)	213
复方磺胺对甲氧嘧啶片	214
复合维生素B、C片	215
复合支链氨基酸注射液(3)	216
复合氨基酸注射液(6)	216
复合氨基酸注射液(9)	217
复合氨基酸注射液(11)	218
复合氨基酸注射液(14)	220
复合氨基酸注射液(15)	221
复合氨基酸注射液(17)	222
复方氨基比林注射液(安痛定注射液)	223
食母生片	224
美索巴莫片(舒筋灵片)	224
络合碘溶液(强力碘溶液)	225
氢化可的松琥珀酸钠	226
氢溴酸苯扎托品(氢溴酸苯甲托品)	227
氢溴酸苯扎托品片(氢溴酸苯甲托品片)	227
氢溴酸高乌甲素片	228
氢溴酸高乌甲素注射液	229
香菇菌多糖片	229
柳酚癣药水(黑白癣药水)	230
亮菌甲素片	230
胃可必舒	231
胃乐片	232
胃宁片	233
胃速乐片	234
胃得乐片	234
胃得乐胶囊	236
胃蛋白酶片	237
胃膜素胶囊	238
肺保三效片	238
十画	
息 氮 氢 烟 速 高	
消 铁 脱 核 盐	
息热痛注射液	239
息喘酚片	240
氧化淀粉	241
氧烯洛尔(心得平)	242
氧烯洛尔片(心得平片)	243
氨甲苯酸片(止血芳酸片)	243
氨肽素片	244
氨苄西林颗粒剂	244
氨咖片	245
氨基丁二醇注射液(缓血酸铵注射液)	246
氨基乙磺酸片(牛磺酸片)	247
氨基乙磺酸注射液(牛磺酸注射液)	247
氨基乙磺酸胶囊(牛磺酸胶囊)	248
氨基乙磺酸滴眼液(牛磺酸滴眼液)	248

十画

高 速 烟 氨 氧 患
盐 核 胱 铁 消

联苯双酯片	312
联苯双酯胶囊	312
联磺甲氧苄啶胶囊(增效联磺胶囊)	313
联磺甲噻啶散(新小儿安)	315
喃氟啶片	316
喃氟啶栓	317
喃氟啶胶囊	317
痛经栓	318
痛热清片	319
葡萄糖氯化钙注射液	320
葡萄糖酸己定软膏(家乐软膏)	321
硫必利片(泰必利片)	321
硫酸卡那霉素片	322
硫酸卡那霉素胶囊	323
硫酸卡那霉素软膏	323
硫酸延胡索乙素片	324
硫酸钡混悬液	324
硫酸镁葡萄糖注射液	325
棕榈氯霉素颗粒剂(无味氯霉素颗粒剂)	326

十三画

新溴愈硼感酮鹅解

新脚气膏	327
溴甲烷阿托品片(胃疡平片)	328
溴化异丙基阿托品气雾剂	328
愈创木酚甘油醚糖浆	329
愈裂霜	330
愈癣药水(甘露癣药水)	330
硼砂甘油钾溶液(康肤裂药水)	331
感冒通片	332
感冒敏胶囊	333
酮洛芬片(酮基布洛芬片)	334
鹅掌疯药膏	334
解热头痛散	335
解热去痛散	336

十四画

聚鲜腺腐精

聚乙烯醇	337
聚肌胞注射液	339
鲜王浆	340
腺苷辅酶维生素 B ₁₂ 注射液	341

腐植酸钠	342
腐植酸钠片	343
腐植酸钠栓(妇治栓)	343
腐植酸钠软膏	344
腐植酸钠胶囊(腐敏胶囊)	344
腐植酸钠颗粒剂	345
精制维酶素	345
精制维酶素片	346

十五画

增 醋

增效硫酸卡那霉素注射液	347
增效黄连素片	347
增效黄连素胶囊	348
醋酸可的松滴眼液	349
醋酸曲安奈德-尿素软膏	350
醋酸钠	352
醋酸氯己定溶液(醋酸洗必泰溶液)	353
醋酸氯己定漱口剂(醋酸洗必泰漱口剂)	353
醋酸泼尼松软膏	354
醋酸氟轻松酊(肤万酊)	355

十六画

琥 糖 橙 磷

琥玉红	356
琥玉红片	357
糖盐钾注射液	357
橙维 C 片	358
橙维 C 颗粒剂	359
磷酸川芎嗪	359
磷酸川芎嗪片	360
磷酸川芎嗪胶囊	361
磷酸川芎嗪注射液	361
磷霉素钙颗粒剂	362
磷霉素钙片	363
磷霉素钙胶囊	363

附 录

半微量定氮法	365
试液、溶液、显色液	366
缓冲液	367
指示剂与指示液	367

乙双吗啉胶囊

Yishuang Malin Jiaonang
CAPSULAE BIMOLANI

本品含乙双吗啉($C_{20}H_{32}N_6O_6$)应为标示量的 90.0~110.0%。

【性状】 本品为胶囊剂,内容物为白色或类白色粉末。

【鉴别】 (1)取本品的内容物适量(约相当于乙双吗啉0.2g),加氢氧化钠试液 10ml,煮沸约 1 分钟,即发生氨臭。

(2)取本品的内容物适量(约相当于乙双吗啉 2mg),置白色磁点滴板上。加 2%盐酸对苯二胺溶液 1 滴、12%醋酸溶液及 3%过氧化氢溶液各 2 滴,逐渐显紫褐色。

【检查】 干燥失重 取本品的内容物,在 80℃干燥至恒重,减失重量不得过 1.5%(中国药典 1995 年版二部附录)。

其他 应符合胶囊剂项下有关的各项规定(中国药典 1995 年版二部附录)。

【含量测定】 取装量差异项下的内容物,混合均匀。精密称出适量(约相当于乙双吗啉 0.1g),置凯氏瓶中,加无水硫酸钠 2g、硫酸铜 0.2g,及硫酸 8ml,加热消化,放冷,移入 100ml 量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取 5ml,照半微量定氮法(附录)测定。每 1ml 的盐酸液(0.01mol/L)相当于 0.7542mg 的 $C_{20}H_{32}N_6O_6$ 。

【作用与用途】 免疫抑制剂。用于皮肤科银屑病,眼科葡萄膜炎等。

【用法与用量】 口服 银屑病 一次 0.2g 一日 0.6~0.8g

眼葡萄膜炎 一次 0.4g 一日 1.2g

【注意】 肝、肾功能不全者及溃疡病患者慎用;孕妇及哺乳期妇女禁用。

【规格】 0.2g

【贮藏】 密闭,在干燥处保存。

十一烯酸癣药水

Shiyixisuan Xuanyaoshui

本品含十一烯酸($C_{11}H_{20}O_2$)不得少于标示量的 92.0%。

【性状】 本品为淡黄色澄明液体;有特臭;易挥发。

【鉴别】 取本品约 1ml,加高锰酸钾试液数滴,颜色即消失。

【含量测定】 精密量取本品 5ml(约相当于十一烯酸 0.5g),置锥形瓶中,加酚酞指示液数滴,用氢氧化钠液(0.1mol/L)滴定,即得。每 1ml 的氢氧化钠液(0.1mol/L)相当于 18.43mg 的 $C_{11}H_{20}O_2$ 。

【作用与用途】 有抗霉菌作用,用于霉菌性皮肤病及癣症,如头部白癣、干癣、秃癣、黄癣、爪甲白癣、脚癣、水泡性斑状白癣、汗泡状白癣、趾指湿疹等症。

【用法与用量】 外用 涂擦于患处 一日 2~3 次


【规格】 10%

【贮藏】 密闭,置凉处保存。

十二烷基硫酸镁

Shierwanjiliusuanmei

MAGNESII LAURYLI SULFAS



$(\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{O}_4\text{S})_2\text{Mg}$ 555.08

本品为双十二烷基硫酸酯的镁盐,按干燥品计算,含镁(Mg)应为 4.2~4.5%,含总醇应为 63.0~69.0%。

【性状】 本品为白色或类白色粉末,在甲醇或乙醇中易溶,在温水中溶解,有吸湿性。

【鉴别】 本品的水溶液显镁盐与硫酸盐的鉴别反应(中国药典 1995 年版二部附录)。

【检查】 酸度 取本品 1g,加水 50ml 溶解后,加甲基红指示液 1 滴,如显红色,用氢氧化钠液(0.1mol/L)滴定,消耗氢氧化钠液(0.1mol/L)不得过 0.2ml。

重金属 取本品 1g,加乙醇 10ml,加水至 25ml 溶解后,依法检查(中国药典 1995 年版二部附录第一法),含重金属不得过百万分之二十。

氯化镁 取本品 1g,加水 50ml 溶解后,加铬酸钾指示液 1ml,用硝酸银液(0.1mol/L)滴定至溶液呈砖红色,即得。每 1ml 的硝酸银液(0.1mol/L)相当于 4.761mg 的 MgCl_2 ,含氯化镁不得过 0.5%。

硫酸镁 取本品 2g,置分液漏斗中,加盐酸液(0.2mol/L)40ml 振摇,再加正戊醇 10ml 与乙醚 10ml,振摇提取,静置分层,下层液分置烧杯中,用盐酸液(0.5mol/L)10ml 洗上层溶液。待分层后合并下层洗液于烧杯中,加氯化钡试液 5ml,在水浴上加热 30 分钟,放置过夜,用定量滤纸滤过,用水洗沉淀至洗液中无氯离子,沉淀和滤纸放入恒重的坩埚中,干燥后灼烧至恒重,精密称定,与 0.5157 相乘即得供试量中含 MgSO_4 的质量,含硫酸镁不得过 1.0%。

未磺化醇 取本品 10g,置 200ml 烧杯中,加水 50ml 与乙醇 25ml 搅拌溶解后,转移至分液漏斗中,再用乙醇 25ml 分两次洗涤烧杯,洗液并入分液漏斗中,用石油醚振摇提取三次(40、30、30ml),合并石油醚液,用饱和氯化钠溶液 20ml 洗涤,再用水洗涤 2 次,每次 20ml,弃去洗液。将石油醚液移至恒重的三角瓶中。置热水浴上蒸馏除去石油醚,残渣于 105℃干燥 3 小时,精密称定。即得供试量中含有未磺化醇的质量。含未磺化醇不得过 1.3%。

干燥失重 取本品,在 105℃干燥至恒重(约 13 小时),减失重量不得过 2.0%(中国药典 1995 年版二部附录)。

【含量测定】 镁 取本品约 0.25g,精密称定,置三角瓶中,加水 20ml 与乙醇 10ml,溶解后,加氨-氯化铵缓冲液(pH=10.0)10ml 与铬黑 T 指示剂少许。用乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)滴定,至溶液由紫红色转变为纯蓝色,即得。每 1ml 的乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)相当于 1.215mg 的 Mg。

总醇量 取本品约 2.5g,精密称定,置 250ml 磨口圆底烧瓶中,加水 75ml 与浓盐酸 25ml,附回流冷凝器,加热回馏 4 小时,放冷,用乙醚 20ml 冲洗冷凝器,内容物移入 250ml 分液漏斗中,用乙醚分两次洗涤烧瓶,每次 15ml,洗液并入分液漏斗中,振摇提取。静置分层。分离醚层置恒重的三角瓶中。再用乙醚提取两次,每次 40ml,合并乙醚液,置温水浴上蒸馏除去乙醚,残渣于 105℃干燥 30 分钟,精密称定,即得供试量中含总醇的重量。

【作用与用途】 用作片剂的水溶性润滑剂。

【用法与用量】 根据片剂中所含药物的性质加以选用,探讨适宜用量。

【注意】 对片剂中所含药物有影响时忌用。

【贮藏】 密封,在干燥处保存。

人 胎 盘 片

Ren Taipan Pian

TABELLAE HUMANUM PLACENTALE

本品系新鲜健康人胎盘,经提取烘干制得。每片含球蛋白折合成氨基氮应为 7.5~9.5mg。

【性状】 本品为糖衣片,片心呈棕褐色;味腥。

【鉴别】 (1)取本品 10 片,研细,加水 100ml,混匀,置沸水浴中加热 30 分钟,放冷至室温,滤过,取续滤液 2ml,加茚三酮试液 1ml,混匀,置沸水浴中加热 5~10 分钟,即呈现蓝紫色。

(2)取上述澄清滤液,加等体积 10% 磺基水杨酸,即产生白色混浊。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典 1995 年版二部附录)。

【含量测定】 取本品 10 片研细,用盐酸液(4mol/L)60ml 分次移至锥形瓶中,置水浴中加热 30 分钟。取出,放冷至室温,移入 100ml 量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取 10ml,用氢氧化钠液(2mol/L)调节溶液至 pH7.0,加甲醛溶液(pH9.0)10ml,摇匀,用氢氧化钠液(0.1mol/L)滴定至 pH9.0,并将滴定的结果用空白试验校正。每 1ml 氢氧化钠液(0.1mol/L)相当于 1.401mg 氨基氮。

【作用与用途】 本品为一般滋补剂,用于神经衰弱、发育不良、体弱、贫血等症。

【用法与用量】 口服 一次 2~4 片 一日 3 次

【规格】 0.25g

【贮藏】 阴凉干燥处保存。

力 勃 隆 片

Libolong Pian

TABELLAE EXTRACTI HEPATIS COMPOSITAE

本品每片含枸橼酸铁铵以铁(Fe)计算应为 25~33mg。

【处方】 肝浸膏粉	4.58g	磷酸氢钙	6.355g
枸橼酸铁铵	13.3g	维生素 B ₁	0.02g
维生素 B ₂	0.007g	干酵母粉	0.715g
辅 料	适量		

制 成

1 000 片

【制法】 (1)肝浸膏粉,取肝浸膏、磷酸氢钙混合成粗颗粒状,然后再将淀粉加入混合,过 10 目筛,用 60℃~80℃干燥,粉碎均匀,过 60 目筛备用。

(2)先将维生素与干酵母粉混合均匀,再加入肝浸膏粉及枸橼酸铁铵,混匀,加入适量淀

粉糊,制粒,烘干,压片,包糖衣即得。

【性状】 本品为糖衣片,片心为淡棕色;味微涩。

【鉴别】 (1)取本品 2 片,研细,加水 10ml 溶解,滤过,滤液加过量的氢氧化钾试液煮沸即发生氨臭,滤过,滤液显枸橼酸盐的鉴别反应(中国药典 1995 年版二部附录)。

(2)取本品研细,加热炭化,残渣加稀盐酸溶解,溶液显钠盐的鉴别反应(中国药典 1995 年版二部附录)。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典 1995 年版二部附录)。

【含量测定】 取本品 20 片,除去糖衣,研细,精密称取适量(约相当于枸橼酸铁铵 0.5g),置烧杯中,加水 20ml,搅拌,滤过。用水 20ml 分 2 次洗涤残渣,洗液与滤液合并,置碘瓶中,加盐酸 10ml 与碘化钾 2g,密塞,于暗处放置 15 分钟,加水 50ml,用硫代硫酸钠液(0.1mol/L)滴定,近终点加淀粉指示液 2ml,继续滴定至蓝色消失,滴定结果用空白试验校正,即得。每 1ml 硫代硫酸钠液(0.1mol/L)相当于 5.585mg 的 Fe。

【作用与用途】 适用于贫血、食欲不振及缺乏维生素 B 引起的疾病。

【用法与用量】 口服 一次 3~5 片 一日 3 次

【注意】 服药后忌饮茶。

【规格】 每片含枸橼酸铁铵 0.133g

【贮藏】 密闭,阴凉处保存。

丁 维 钙 粉

Dingweigai Fen

本品含葡萄糖酸钙($C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$)应为标示量的 90.0~110.0%。

【处方】 葡萄糖酸钙	300g	葡萄糖	300g
维生素 D ₂	140 000U	香蕉香精	0.8g(1.0ml)
蔗糖粉	400g	乙醇(95%)	适量

制 成

1 000g

【性状】 本品为白色粉末;味甜。

【鉴别】 (1)取本品约 0.5g,加水 5ml,加热溶解后,缓缓滴入温热的碱性酒石酸铜试液中,即发生氧化亚铜的红色沉淀。

(2)取本品约 0.5g,加水 10ml,加热溶解后,加三氯化铁试液 1~2 滴,显深黄色。

(3)取本品约 10g,加氯仿适量,振摇,使骨化醇溶解。滤过,滤液浓缩至 5ml 左右。加醋酐 0.3ml 与浓硫酸 0.1ml,振摇,显红色,迅即变为紫堇色,最后变为绿色。

(4)本品的水溶液显钙盐的鉴别反应(中国药典 1995 年版二部附录)。

【含量测定】 取本品约 0.75g,精密称定,置锥形瓶中,加水 50ml,加热溶解,放冷至室温。另取水 10ml,加氨-氯化铵缓冲液(pH=10.0)10ml,稀硫酸镁试液 1 滴,铬黑 T 指示剂少许,滴加乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)至溶液显纯蓝色,将溶液倾入锥形瓶中,用乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)滴定,至溶液自紫红色变为纯蓝色。即得。每 1ml 的乙二胺四醋酸二钠液(0.05mol/L)相当于 22.42mg 的 $C_{12}H_{22}CaO_{14} \cdot H_2O$ 。

【作用与用途】 用于妊娠和哺乳期妇女、哺乳婴儿、发育期儿童的钙质补充,或其他缺钙病症。

【用法与用量】 口服。一次1~1.5g,一日3次。用开水冲服,亦可与适量白糖一同调入食品中。不宜与牛奶、豆浆等混合。

【贮藏】 遮光,密闭,置干燥阴凉处保存。

小儿无味黄连素片

Xiaor Wuwei huang liansu Pian

TABELLAE BERBERINI TANNAS PRO INFANTIBUS

本品含黄连素($C_{20}H_{19}NO_5$)应为鞣酸黄连素标示量的25.0~32.0%。

【性状】 本品为黄色片;无臭,无味。

【鉴别】 取本品的细粉适量(约相当于无味黄连素0.1g)照无味黄连素项下鉴别(1)、(2)、(3)项试验,应显相同反应。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典1995年二部附录)。

【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称出适量(约相当于无味黄连素50mg),照无味黄连素项下的方法进行测定。

【作用与用途】 收敛抗菌药。对痢疾杆菌、葡萄球菌等均有抑制作用。用于肠道感染。

【用法与用量】 口服 一次:1~2岁1片;2~4岁1.5片;4~6岁2片;6~9岁3片;9~14岁4片 一日3次

【规格】 0.1g

【贮藏】 遮光,密封保存。

小儿双嘧啶片

Xiaor Shuangmiding Pian

本品每片含磺胺嘧啶($C_{10}H_{10}N_4O_2S$)应为0.19~0.21g,含甲氧苄啶($C_{14}H_{18}N_4O_3$)应为0.0225~0.0275g,含碳酸氢钠($NaHCO_3$)应为0.1425~0.1575g。

【处方】	磺胺嘧啶	200g
	甲氧苄啶	25g
	碳酸氢钠	150g

制 成 1 000 片

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 (1)取本品的细粉适量(约相当于磺胺嘧啶0.1g),加稀盐酸5ml,缓缓加热使溶解,冷却,滤过,滤液中加入亚硝酸钠液(0.1mol/L)1ml,加碱性β-萘酚试液数滴,即发生红色沉淀。

(2)取本品的细粉适量(约相当于甲氧苄啶0.05g),加稀硫酸5ml,振摇使溶解,滤过,滤液加数滴碘试液,即发生棕红色沉淀。

(3)取本品的细粉适量,加水振摇,滤过,滤液显钠盐与碳酸氢盐的鉴别反应(中国药典1995年版二部附录)。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(中国药典1995年版二部附录)。

【含量测定】 取本品30片,精密称定,研细,备用。