

妇产科学 分册

临床医学多选题

湖南医科大学临床学院编 ■

湖南科学技术出版社 ■

临床医学多选题 妇产科学分册

主 编：李素华

副主编：林秋华 成应玮

编 者：(以姓氏笔画为序)

方小玲 李素华 成应玮

肖根秀 林秋华 林宜珍

张琼英 徐立礼 张志胜

审 稿：张志胜

湖南科学技术出版社

临床医学多选题丛书

妇产科学分册

编 者：湖南医科大学临床学院

责任编辑：王一方 李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路3号

印 刷：湖南省新华印刷二厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 码：422001

经 销：湖南省新华书店

出版日期：1996年5月第1版第2次

开 本：850×1168毫米 1/32

印 张：7

插 页：2

字 数：178,000

印 数：5,101—10,100

ISBN 7—5357—1460—9/R·292

定 价：8.50元

前 言

考试是真实地评价和客观地检验医师的学识水平和医学生知识能力的主要方法之一。美国等许多国家长期以来采用多选题 (Multiple Choice Question, MCQ) 的形式进行领取医师执照和注册考试。我国医学教育界自 80 年代初开始运用多选题考试来检测学生学业成绩, 近些年来, 各级医师晋升考试也引进了大量的多选题。

湖南医科大学曾于 1994 年 6 月参加由卫生部医学考试中心认可、在美国医学考试委员会指导下进行的全国十七所高等医学院校临床医学标准化联合考试, 并取得了优异成绩。联合考试采用了国外使用较多并被公认的新题型, 即 A₁、A₂、A₃、A₄、B 型题, 这种新的题型既可考察基础理论知识, 又可紧密地结合临床情景考察临床理论知识与技能状态, 考题更具实用性。为了帮助广大的医务工作者及医学生全面系统地掌握临床医学知识和技能, 同时帮助他们熟悉新的多选题型, 以适应各种医学考试, 我们组织湖南医科大学的专家教授编写了这套《临床医学多选题》丛书。本书的编写除根据全国联考大纲及教学大纲外, 还增加了不少新的内容, 并配有影像资料。丛书分内科学、外科学、妇产科学、儿科学及传染病学四个分册, 共计 9500 题, 其中妇

FD85/05

产科学 1300 题，试题按 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、B 型题顺序排列，每章后均附有标准答案，并对部分难题进行注解，以帮助读者深刻理解题意，获得更多的知识。

本书内容多，且有一定的广度和深度，可作为临床医师医疗工作指导用书、教师教学辅导用书，更是医师晋升考试、国家医师执照考试、研究生入学考试和在校医学生应考的理想参考书。

由于时间紧促，难免存在不足之处，欢迎批评指正。

编 者

1995 年 3 月

使用说明

考试是检测被试者知识水平的主要方法。根据医学教育的特点，目前世界各国从事医学教育研究的学者将认知领域目标分为回忆（Ⅰ级）、解释（Ⅱ级）和问题解决（Ⅲ级）三个层次，因此我们在设计试题中特别注意考查读者对这三个层次的认知水平，以客观地检测受试者的知识结构与能力。Ⅰ级（即回忆型）是指对特定的事实、概念、原理、过程、方法、术语等具体的知识进行直接的回忆，这是认知领域最初级的行为，其主要是测试考生的记忆力；Ⅱ级（即解释型）是指经对多方面的事实或一系列症状、体征或检查结果进行综合分析后得出一个正确结论的过程，其主要是测试应试者的综合分析能力，较Ⅰ级提高了一个层次；Ⅲ级（即问题解决型）是指应用理解的知识，解释现象，综合分析得出正确的判断后选择下一步应采取的措施，其主要是测试受试者解决问题的能力，即临床决策这一高层次的认知行为。以上三个层次认知水平的测试均可在本书各种类型的多选题中出现，应试者在答题中应予以注意各题测试的旨意在哪一层次。

现将本书中多选题类型及答题要求介绍如下：

一、A型题

A型题即最佳选择题（One Best Answer），是

最常用的多选题。其组成是在一段叙述性的题干后，写出 A、B、C、D、E 五个备选答案，应试者按主体的目的和要求从五个备选答案中选出最合适的答案即最佳答案，其余的答案可能部分正确或者不正确，具有一定的迷惑性，为干扰答案。应试者应精心推敲，排除干扰答案，选择一个最合适的答案。A 型题又分 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 四种类型。

A_1 型题 即肯定的单个最佳选择题 (Single Item A_1)。它是根据题干要求从五个备选答案中排除似乎有道理而实际上是不恰当的干扰答案，选择一个肯定意义的最佳答案，此类试题常具有比较意义。例如：

血浆中最重要的生理性抗凝物质是：

- A. α_2 -巨球蛋白
- B. α_1 -抗凝蛋白酶
- C. 肝素
- D. 抗凝血酶-Ⅲ
- E. 蛋白 C 系统

正确答案：D

A_2 型题 即否定的单个最佳选择题 (Single Item A_2)。它所设五个备选答案中除一个外都是正确的，要求应试者选出最不适用的，用得最少的或者在某方面是例外的一个备选答案。在回答此类题型时要特别注意“最少、最不恰当、无关、错误、不符、除外”等否定词的表达，是要从备选答案中选择一个否定的最佳答案。例如：

下列哪项与诊断血友病甲不符合？

- A. 凝血时间延长
- B. 出血时间延长
- C. Ⅷ因子缺乏
- D. 白陶土部分凝血活酶时间延长
- E. 凝血酶原时间正常

正确答案：B

A_3 型题 即病例组的 A 型题 (Multiple Item Sets)。试题的形

式是以一个病人的临床情况为题干，然后从不同的角度提出多个问题，问题通常是一个肯定的短语陈述形式，也可以是一个否定的陈述形式。每个问题都与题干中描述的病人的临床情景有关，在回答这些问题时只需要根据题干的资料去分析和选择答案。回答此类试题与回答单个的A₁、A₂型题是同样的，只是运用同一个题干。例如：

问题 1~3

某女，19岁，晨起两手指间关节和掌指关节强直4个月，伴运动时疼痛，肿胀10天，给予阿司匹林及其他非类固醇类抗炎药和金制剂等治疗，均未见效，且病情渐恶化，出现乏力，食欲不振，体重减轻及不规则发热，两肘关节有运动障碍，血清 γ -球蛋白1.6%，类风湿因子++。

1. 该患者诊断考虑为：

- A. 类风湿性关节炎
- B. 风湿性关节炎
- C. 原发性骨关节病
- D. 痛风
- E. 系统性红斑狼疮

2. 该患者用一般抗风湿药无效的主要原因是：

- A. 为非风湿性疾病
- B. 有并发症的风湿性疾病
- C. 病情属中晚期，关节变形，病情进行性加剧，顽固的炎症
- D. 抗风湿药选择和用法不当
- E. 体质差异

3. 应首选的治疗方法：

- A. 免疫抑制剂
- B. D-青霉胺
- C. 类固醇
- D. 关节手术
- E. 支持疗法

正确答案 1. A 2. C 3. A

A₁ 型题 即病例串的 A 型题 (Case Clusters)。试题形式也是以一个病人或家族为中心的临床情景为题干, 然后提出多个相关的问题, 在每个问题前逐步按病情发生发展的顺序提供一些信息资料, 也可以是与病例主题有关的, 但与病例中叙述的具体病人并不一定有联系的信息 (如假设的条件)。回答此类问题与回答单个的 A₁ 或 A₂ 型题一样, 只是需要根据中间加入的临床资料和条件去选择最佳答案。例如:

问题 4~7

某女, 18 岁, 皮肤反复紫癜和瘀斑, 月经量多已有 2 年, 既往经常关节疼痛, 10 岁起经常刷牙出血。

4. 如果你要补充追问病史可不必问及:

- A. 家族中有无类似病史
- B. 有无其他引起出血的原发病
- C. 有无特殊物质接触史及过敏史
- D. 患者出血的地点
- E. 患者出血的部位、性质和程度

若病人曾因关节疼痛经常服用保泰松等药物, 家族中无类似疾患。

5. 为寻找出血原因你首选下列哪组检查?

- A. 血小板计数, 毛细血管脆性试验, 出血时间, 凝血时间, 血清凝血酶原时间
- B. 血小板计数, 毛细血管脆性试验, 血小板粘附聚集试验、BT、CT
- C. 血小板计数, BT、CT、毛细血管脆性试验, 血小板因子 3 测定
- D. 血小板计数, BT、CT、毛细血管脆性试验, 血块退缩试验, 部分凝血活酶时间, 血浆凝血酶原时间, 凝血酶时间
- E. 血小板计数、BT 和 CT、毛细血管脆性试验, 简易凝血活酶生成试验 (SIGT)

实验室检查结果: Pt $100 \times 10^9/L_2$, BT 6', 血块退缩不良, 部

分凝血活酶时间及血浆凝血酶原时间正常，毛细血管脆性试验阳性。

6. 该患者最可能的诊断是：
- A. 原发性血小板减少性紫癜 (ITP)
 - B. 血友病甲
 - C. 继发性血小板减少性紫癜
 - D. 纤维蛋白原缺乏症
 - E. 血小板功能不良
7. 为确诊应进一步选择哪项检查？
- A. 阿司匹林耐量试验
 - B. 血小板聚集试验及粘附试验
 - C. 血小板相关抗体测定
 - D. 血小板因子 4 测定
 - E. 复钙时间

正确答案：4. D 5. D 6. E 7. B

二、B 型题

B 型题为配伍题 (Matching Sets)。本类试题形式是，先列出五个备选答案 (B₁ 型) 或者五个以上的备选答案 (B₂ 型题) 后接着提出多个问题。要求应试者给每一个问题从前面的备选答案中选配一个最合适的，最正确的答案。B 型题与 A 型题的区别在于 A 型题是一个问题后有五个备选答案，而 B 型题是多个问题共用同一组五个或五个以上的备选答案，每个备选答案可选一次或几次，也可一次也不选，此类题主要测试知识密切相关的一些问题，多用于鉴别类似疾病的症状、体征和相关药物的作用和应用等。例如：

问题 8~9

- A. 淋巴瘤
- B. 淋巴结结核
- C. 癌症
- D. 化脓性扁桃体炎
- E. 急性传染性单核细胞增多症

8. 男, 21 岁, 高热, 畏寒, 咽痛 1 周, 全身浅表淋巴结如蚕豆、红枣大小不一, 质中, 有压痛, 无融合, 无红肿, 肝、脾肋下 1cm. 血常规: WBC $11.5 \times 10^9/L$, N 0.45, L 0.43, M 0.01, 异型淋巴细胞 0.11
9. 男, 29 岁, 高热, 盗汗, 颈部无痛性肿大 3 个月, 全身浅表淋巴结均肿大, 尤以颈部为甚, 质中有融合, 无压痛, 肝肋下 3cm, 脾肋下 2cm, 血常规正常

正确答案: 8. E 9. A

《临床医学多选题》丛书编委会

主 编：陈进伟 凌奇荷

编 委：（以姓氏笔画为序）

王爱芳 王洪林 王修文

王秀英 文明星 陈进伟

刘瑞洪 李素华 李永国

李贺君 李允山 杨 旭

余孝良 张小青 罗季安

林秋华 郑宜鹤 凌奇荷

主 审：刘海林 卫生部科教司

张其亮 湖南医科大学

目 录

第一章 妇产科基础知识	(1)
第一节 女性生殖系统解剖.....	(1)
第二节 女性生殖系统生理.....	(6)
标准答案.....	(16)
注 解.....	(17)
第二章 生理产科	(20)
第一节 妊娠生理.....	(20)
第二节 妊娠诊断.....	(24)
第三节 正常分娩.....	(28)
标准答案.....	(39)
注 解.....	(39)
第三章 病理产科	(45)
第一节 病理妊娠.....	(45)
第二节 妊娠合并症.....	(73)
第三节 高危妊娠.....	(85)
第四节 异常分娩.....	(91)
第五节 分娩合并症.....	(113)
第六节 产褥感染.....	(120)
标准答案.....	(123)
注 解.....	(126)
第四章 妇科疾病	(133)
第一节 外阴白色病变.....	(133)

第二节	女性生殖系统炎症·····	(134)
第三节	外阴癌、宫颈癌·····	(143)
第四节	子宫肌瘤·····	(151)
第五节	子宫内膜癌、卵巢肿瘤·····	(155)
第六节	妊娠滋养细胞疾病·····	(166)
第七节	子宫内膜异位症·····	(174)
第八节	月经失调·····	(177)
第九节	闭经、多囊卵巢综合征·····	(184)
第十节	女性生殖器官损伤性疾病·····	(190)
第十一节	不孕症·····	(196)
第十二节	计划生育·····	(200)
标准答案	·····	(204)
注 解	·····	(207)

第一章

妇产科基础知识

第一节 女性生殖系统解剖

【A₁型题】

1. 我国妇女以哪种骨盆类型最常见?
 - A. 妇女型
 - B. 男子型
 - C. 扁平型
 - D. 混合型
 - E. 类人猿型
2. 关于女性骨盆, 下列哪项是正确的?
 - A. 入口平面的前后径大于横径
 - B. 中骨盆横径大于前后径
 - C. 骨盆最大平面的横径是坐骨棘间径
 - D. 骨盆最小平面即中骨盆平面
 - E. 出口平面的大小决定于骨盆出口前后径
3. 关于女性外生殖器的解剖, 下列哪项是正确的?
 - A. 女性外生殖器即会阴
 - B. 耻骨阜即阴阜
 - C. 双侧小阴唇前端为腹股沟韧带终止点
 - D. 前庭大腺称斯氏腺
 - E. 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区
4. 一位少女骑自行车不慎跌倒, 伤及外阴部位, 如出现外阴血肿最易发生在:
 - A. 小阴唇
 - B. 大阴唇
 - C. 会阴部
 - D. 阴阜部
 - E. 阴蒂部
5. 子宫最狭窄的部分是:
 - A. 组织学内口

- B. 解剖学内口
 - C. 子宫颈管
 - D. 子宫峡部
 - E. 子宫外口
6. 维持子宫在正常位置, 是由:
- A. 盆底肌肉及其上下筋膜支配
 - B. 膀胱和直肠的支配
 - C. 子宫四对韧带及盆底肌肉, 筋膜的支托作用
 - D. 腹腔压力作用
 - E. 子宫四对韧带的作用
7. 维持子宫前位的主要韧带是:
- A. 子宫圆韧带
 - B. 阔韧带
 - C. 卵巢固有韧带
 - D. 主韧带
 - E. 子宫骶骨韧带
8. 间接维持子宫前位的韧带是:
- A. 圆韧带
 - B. 阔韧带
 - C. 卵巢固有韧带
 - D. 主韧带
 - E. 子宫骶骨韧带
9. 关于子宫韧带的解剖, 下列哪项是正确的?
- A. 圆韧带起于子宫角, 止于腹股沟
 - B. 阔韧带富有肌纤维与子宫体肌纤维相接
 - C. 卵巢固有韧带使子宫倾向后方
 - D. 主韧带是横行于子宫颈两侧和骨盆壁之间
 - E. 子宫骶骨韧带使子宫侧向后方
10. 作子宫与附件切除时, 切断下述哪根韧带容易损伤输尿管?
- A. 骨盆漏斗韧带
 - B. 骶骨韧带
 - C. 主韧带
 - D. 阔韧带
 - E. 圆韧带
11. 行子宫全切及左附件切除时应离断哪些韧带?
- A. 双圆韧带、双阔韧带、左卵巢固有韧带
 - B. 双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、左卵巢固有韧带
 - C. 双圆韧带、双阔韧带、左卵巢悬韧带、右卵巢固有韧带
 - D. 双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、双子宫骶骨韧带、左卵巢悬韧带、右卵巢固有韧带
 - E. 双圆韧带、双阔韧带、双子宫骶骨韧带
12. 关于输卵管的解剖生理, 下

- 列哪项是正确的？
- 全长为 6~8cm
 - 伞端有腹膜遮盖
 - 平滑肌收缩时输卵管由近端向远端蠕动
 - 内壁为复层柱状上皮
 - 粘膜受性激素影响有周期性变化
- 左侧卵巢动脉可来自：
 - 左髂内动脉
 - 左肾动脉
 - 左髂外动脉
 - 右髂外动脉
 - 阴部内动脉
 - 卵巢动静脉经什么韧带进入卵巢门？
 - 圆韧带
 - 骨盆漏斗韧带
 - 主韧带
 - 子宫骶韧带
 - 卵巢固有韧带
 - 当测量骨盆出口横径 $<8\text{cm}$ 时，应进一步测量：
 - 骶耻内径
 - 骶耻外径
 - 出口前矢状径
 - 出口后矢状径
 - 耻骨弓角度
 - 骶耻外径的距离是指：
 - 耻骨联合至 5 腰椎棘突
 - 耻骨联合中点至髂后上棘联线中点上 1.5cm
 - 耻骨联合中点至米氏菱形窝上角下 1.5cm
 - 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝上角上 1.5cm
 - 耻骨联合上缘中点至 5 腰椎棘突下
 - 骨盆出口后矢状径是指：
 - 坐骨棘联线中点至 4、5 骶椎间的距离
 - 坐骨棘联线中点至尾骨尖的距离
 - 坐骨结节联线中点至 4、5 骶椎间的距离
 - 坐骨结节联线中点至骶尾关节间的距离
 - 坐骨结节联线中点至尾骨尖的距离

【A₁ 型题】

- 关于女性骨盆重要径线正常值，下列哪项是错误的？
 - 入口平面是前后径为 11cm
 - 中骨盆平面是横径为 10cm
 - 出口平面其重要径线是横径为 9cm
 - 出口平面后矢状径为 8~