

学苑出版社

# 常用中药临证指要（二）

杨鹏举 / 主编

# 常用中药临证指要

杨鹏举 主编

学苑出版社

(京) 新登字 151 号

**常用中药临证指要**

---

主 编：杨鹏举

责任编辑：陈 辉

封面设计：李 戎

出版发行：学苑出版社 邮政编码：100036

社 址：北京市海淀区万寿中西街 11 号

印 刷：石家庄市中愿印刷厂

经 销：全国各地新华书店

开 本：850×1168 1/32

印 张：8.125 字数：190 千字

印 数：0001—3000

版 次：1995 年 1 月北京第 1 版第 1 次

ISBN7—5077—0869—1/R · 142

定 价：7.80 元

---

学苑版图书印、装错误可随时退换。

常用中藥臨證指要

呂炳奎題



**主 编** 杨鹏举

**副 主 编** 张一昕 李春香  
周爱民 郭启云  
狄玉敏 韩军

**编 委 会** (以姓氏笔画为序)

马彦玲 方朝义 冯金珠  
刘惠聪 杨鹏举 李春香  
狄玉敏 张一昕 周爱民  
赵洪恩 郭启云 陶桂芳  
韩军 姬承武 蔡晓琦

## 目 录

<b>第十一章 止血药</b> .....	( 1 )
<b>第一节 涼血止血药</b> .....	( 2 )
大薊 .....	( 2 )
小薊 .....	( 4 )
地榆 .....	( 5 )
三麻根 .....	( 7 )
侧柏叶 .....	( 8 )
茜草 .....	( 9 )
<b>第二节 收敛止血药</b> .....	(11)
仙鹤草 .....	(11)
白及 .....	(13)
<b>第三节 化瘀止血药</b> .....	(15)
三七 .....	(15)
蒲黄 .....	(18)
<b>第四节 温经止血药</b> .....	(20)
艾叶 .....	(20)
灶心土 .....	(22)
止血药鉴别小结 .....	(23)
<b>第十二章 活血祛瘀药</b> .....	(25)
川芎 .....	(25)
乳香 .....	(28)
没药 .....	(29)
延胡索 .....	(30)
郁金 .....	(32)

三棱	(34)
丹参	(35)
益母草	(38)
桃仁	(41)
红花	(42)
五灵脂	(44)
牛膝	(46)
穿山甲	(48)
䗪虫	(50)
水蛭	(51)
干漆	(53)
活血祛瘀药鉴别小结	(54)
<b>第十三章 化痰止咳平喘药</b>	<b>(56)</b>
<b>第一节 温化寒痰药</b>	<b>(57)</b>
半夏	(57)
天南星	(60)
白附子	(62)
白前	(64)
旋复花	(65)
白芥子	(66)
<b>第二节 清化热痰药</b>	<b>(68)</b>
桔梗	(68)
前胡	(70)
瓜蒌	(71)
贝母	(73)
竹茹	(74)
天竹黄	(75)
海蛤壳	(77)

礞石	.....	(78)
昆布	.....	(79)
<b>第三节 止咳平喘药</b>	.....	(80)
杏仁	.....	(80)
百部	.....	(82)
紫菀	.....	(84)
桑白皮	.....	(85)
葶苈子	.....	(86)
枇杷叶	.....	(88)
化痰止咳平喘药鉴别小结	.....	(90)
<b>第十四章 安神药</b>	.....	(92)
朱砂	.....	(93)
磁石	.....	(94)
龙骨	.....	(96)
琥珀	.....	(97)
酸枣仁	.....	(98)
柏子仁	.....	(100)
远志	.....	(100)
合欢皮	.....	(102)
安神药鉴别小结	.....	(103)
<b>第十五章 平肝熄风药</b>	.....	(104)
<b>第一节 平肝潜阳药</b>	.....	(104)
石决明	.....	(105)
牡蛎	.....	(106)
珍珠母	.....	(107)
代赭石	.....	(108)
刺蒺藜	.....	(111)
<b>第二节 息风止痉药</b>	.....	(112)

羚羊角	(112)
天麻	(115)
钩藤	(116)
全蝎	(117)
蜈蚣	(119)
白僵蚕	(121)
地龙	(122)
平肝熄风药鉴别小结	(124)
<b>第十六章 开窍药</b>	(125)
麝香	(126)
冰片	(128)
苏合香	(129)
石菖蒲	(130)
开窍药鉴别小结	(131)
<b>第十七章 补益药</b>	(132)
<b>第一节 补气药</b>	(133)
人参	(133)
党参	(137)
黄芪	(139)
白术	(141)
西洋参	(143)
太子参	(145)
甘草	(146)
山药	(149)
大枣	(151)
饴糖	(152)
<b>第三节 补阳药</b>	(154)
鹿茸	(154)

仙茅	(156)
淫羊藿	(157)
巴戟天	(158)
肉苁蓉	(159)
补骨脂	(161)
益智仁	(162)
杜仲	(164)
续断	(165)
狗脊	(166)
蛤蚧	(168)
紫河车	(169)
菟丝子	(171)
沙苑子	(172)
<b>第三节 补血药</b>	(173)
当归	(174)
熟地黄	(175)
何首乌	(177)
白芍	(179)
阿胶	(180)
龙眼肉	(182)
<b>第四节 补阴药</b>	(183)
麦门冬	(183)
沙参	(185)
石斛	(186)
玉竹	(187)
百合	(189)
枸杞子	(190)
女贞子	(191)

墨旱莲	(193)
鳖甲	(194)
龟板	(195)
补益药鉴别小结	(197)
<b>第十八章 收涩药</b>	(201)
五味子	(201)
乌梅	(204)
五倍子	(205)
樗根皮	(208)
诃子	(209)
肉豆蔻	(211)
赤石脂	(212)
罂粟壳	(213)
莲子	(215)
山茱萸	(216)
金樱子	(218)
乌贼骨	(219)
收涩药鉴别小结	(221)
<b>第十九章 涌吐药</b>	(222)
藜芦	(222)
常山	(224)
瓜蒂	(225)
涌吐药鉴别小结	(226)
<b>第二十章 外用药</b>	(227)
硫黄	(227)
铅丹	(229)
斑蝥	(230)
蟾酥	(232)

炉甘石	(234)
硼砂	(235)
蛇床子	(236)
露蜂房	(238)
血竭	(239)
孩儿茶	(240)
外用药鉴别小结	(242)
附 中药音序索引	(1)
中药笔画索引	(4)

## 第十一章 止 血 药

凡能制止体内外出血，治疗出血证为主要作用的药物，称为止血药。

止血药物虽均具有止血的作用，但根据其性能、功效及主治的不同，将其分为以下四类。

凉血止血药 其性寒凉、宜治血热妄行，或阴虚阳亢，虚火上炎所引起的出血。

收敛止血药 味多苦涩，宜治虚损不足及外伤所引起的出血。

化瘀止血药 其既能化瘀，又能止血、宜治瘀血与出血现象并存的病证。

温经止血药 其药性多温燥，宜治虚寒性出血。

总之，止血药可以治疗咯血、吐血、衄血、便血、尿血、崩漏、紫癜及创伤出血等多种出血病证。

凡出血病证，轻则损耗阴血，可致头晕眼花、乏力，重则导致气随血脱，而危及生命，所以，一旦发现出血，应及时有效的制止，以体现其重要意义。出血可因多种原因所致，并有不同的表现，所以，止血药多为治标之品，应根据不同的原因和证候，并根据各止血药的特点，以准确选用，并应予以适当的配伍，以治其本，增强疗效，达到预期的效果。如因血热出血者，宜配清热凉血药；如阴虚阳亢而致的出血，应配滋阴潜阳药；如因气虚或阳虚不能摄血而引起的出血，当伍益气温阳药；如因瘀血阻滞所引起的出血，可伍活血行气药。如出血过多，气随血脱，此时除用止血药外，还应根据气与血的相互关系，当用大补元气之药，急以固脱。

古人认为，某些止血药制成炭剂，其止血作用增强，的确，炭

剂能增强收敛及吸附止血的作用，实践证明，但不尽然，因部分止血药炒炭后的止血效果反而不如生品者，故不可拘于一说。

在使用凉血止血药及收敛止血药时，应做到，既止血又不留瘀，并注意如有瘀血未尽者，应配加活血祛瘀药，以免有留瘀之弊。

## 第一节 凉血止血药

具有凉血止血为主要作用的药物，称为凉血止血药。

本类药物性多寒凉，主入心、肝二经血分而清热凉血，主要治疗血热妄行引的出血证，多表现为：血色鲜红，且浓稠，伴有烦躁，面红或绎，脉数有力或数细等。

应用本类药物的同时，须配伍清热凉血药，既治本，又加强了治标之功；血热出血，每每伤阴，所以，兼阴虚者，则配伍养阴药，阴液足，又助热除。由于本类药多寒凉，内服大剂量后又影响气血流通，可致血瘀气滞，故使用本类药时，应适当配伍活血止血药及理气药。

### 大 薊

〔来 源〕 为菊科多年生宿根草本植物大薊的根或全草。全国各地均产。夏秋花期采集全草，秋末挖取根部、晒干，切成段，生用或炒炭用。

〔处方用名〕 大薊 鲜大薊 大薊炭 大薊根 大薊草

〔性味归经〕 甘、苦、凉。入心、肝经。

〔功效主治〕

凉血止血 主治血热妄行所致的各种出血证。可单味应用，《圣惠方》单用鲜品，捣、绞取汁，每服一小盏，治心热吐血，口干。《本草汇言》单用大薊大握，捣绞取汁，服半升，治吐血、衄血、崩中下血。

**散瘀消肿** (1) 主治跌打损伤之瘀血。《本草汇言》用大薊汁和热酒饮治跌打损伤之瘀血。(2) 主治热毒所致的疮痈。《闽东本草》用鲜大薊四两，煎汤，治肺痈。《福间民间草药》用鲜大薊根和冬蜜捣匀，贴患处，日换两次，治疗疖疮痈有灼热赤肿者；或单用鲜大薊根，用冷开水洗净后捣烂，包麻布炖热，绞汁涂抹，每日二、三次，治汤、火烫伤。又，“×患者，因将沸汤倾于两下肢，立起水泡，部分表皮脱落，先急用陈猪油涂沫，病势不减，再用龙胆紫，硼酸软膏、碘胺类软膏治疗半月，效果不佳。余嘱取大薊鲜根，不拘多少，洗去泥土，捣细用纱布绞汁滤净，盛放碗中，其汁紫红色，过一、二小时，成灰色似胶冻，用新鲜药汁敷患处或捣烂不绞敷用，药已干燥随即更换，日4—5次，施用2、3日，肿退痛止结痂，1周后痊愈。”（《江苏中医杂志》，1980年第6期）

#### 〔配伍效应〕

**大薊配伍生地** 大薊清热凉血止血；生地清热凉血，二者相伍，共奏清热凉血止血之功，以治热邪所致的各种出血。

**大薊配伍车前草** 大薊清热凉血；车前草清热利湿。二者相伍，共清热利湿止血之功，以治湿热所致的尿血或高血压。

**〔用量用法〕** 10~15克；鲜品30~60克。外用适量，捣敷患处。

**〔注意事项〕** 虚寒出血忌用。

#### 〔按语〕

大薊性寒以清热，入心、肝血分，故有清热凉血止血之功，以治血热妄行所引起的多种出血证。一般认为鲜品清热凉血之功的较佳，故因热之出血常用鲜品。炒炭则止血之功较强，但无凉血之功，但以单纯止血为目的，现代药理研究发现，其炒炭可使出血时间明显缩短。

另，其苦通泄则活血，可用治创伤瘀血，借其苦凉之性以清热消痈，用治热毒疮肿。现代药理实验，发现其对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎

球菌等有抑制作用

又，近年来单用本品治疗阴虚血热型高血压病，有一定的疗效。现代药理实验，亦予以证实。

## 小 薊

**〔来 源〕** 为菊科多年生草本植物刺儿菜、刻叶刺儿菜的全草或地下茎。产于我国南北各地。夏季花期采集，洗净，晒干，切段，生用或鲜。

**〔处方用名〕** 小薊 小薊根 小薊草 刺薊

**〔性味归经〕** 甘、苦，凉。入心、肝经。

**〔功效主治〕**

**凉血止血** 主治血热妄行所致的各种出血。《本草图经》单用生品根捣、绞汁服、治吐血、衄血、下血。又，“一少年每年吐血，反复三、四次，数年不愈，诊其脉，血热火盛，俾用鲜根 100 克，煮汤数蛊，当茶饮之，连饮 20 余日，其病从此除根。”（《医学衷中参西录》）

**解毒消痈** 主治热毒所致的疮痈。可单用服，亦可用鲜品捣烂外敷。

**〔配伍效应〕**

**小薊配伍白茅根** 小薊清热凉血；白茅根清热凉血而利尿。二者相配，共奏清热凉血利尿之功，以治湿热所致血淋。

**小薊配伍生地、蒲黄** 小薊清热凉血止血；生地清热凉血；蒲黄收敛止血而利尿。三者相伍，共奏清热凉血止血之功，以治热邪所致的血淋，或月经过多。

**小薊配伍大薊** 均凉血止血消痈，二者相须力用，其功更著，以治血热之各种出血及热毒所致的疮痈。

**〔用量用法〕** 10~15 克；鲜品 30~60 克。外用适量。无热出血用炭，有热出血用生品或鲜品。

〔注意事项〕 虚寒性出血忌服。

〔按语〕

小蓟性味甘苦凉，善清血分之热，使火清血凉而血不妄行，所以用其治血热所致的各种出血，可获良效。

近年来报道，单用本品浸膏治疗子宫收缩不全 45 例，证明其确有收缩子宫、制止出血的作用。治疗血崩 30 例，大部分 2 天后血止，或显著减少。现代药理研究发现，本品浸剂可使收缩血管，出血时间明显缩短。借其寒凉之性以清热毒，热毒除痈肿自消。现代药理研究发现，其对溶血性链球菌、肺炎球菌等有抑制作用。

## 地 榆

〔释名〕 《本草纲目》引弘景曰：“其叶似榆而长，初生布地，故名。”

〔来源〕 为蔷薇科多年生草本植物地榆的根。我国南北均有分布，但主产于浙江、安徽、湖北、山东、湖南。春秋采挖、除去须根、洗净、干燥；或趁鲜切片，干燥。生用、或炒炭用。

〔处方用名〕 地榆 地榆炭 生地榆

〔性味归经〕 苦、酸，微寒。入肝、胃、大肠经。

〔功效主治〕

凉血止血 主治血热所致的各种出血。尤宜治血热所致的下焦出血。可单用，如《圣惠方》治妇人漏下赤色不止，用地榆二两，用醋一升煮之，沸，去渣，食前稍热服一合。又“江××，男，36 岁。大便后下血盈余，病历 5 年，经向各中西医服药治疗，均无效验。经用地榆一味，每日 30 克煎服，3 次服用，过 4 日，该患痊愈，迄今未发。”（《实用经效单方》）再，“孔氏，务农，解放前，分娩次数多，曾患血崩症，大出血，自称多可盈盆。面色苍白，神疲乏力，困顿在床，气息奄奄，病情危急。余上山坡采得地榆根后，洗净，取一握约 20 余克，放在锅膛灰中，烧之存性如炭，入砂锅加水煎透，取汁，加红糖予以适量内服，血崩乃止。”