

实用中草药 彩色图集

第七册

罗献瑞 主编




世界图书出版公司

实用中草药彩色图集

第七册

主 编 罗献瑞
本册主编 聂绍荃
编 委 聂绍荃 刘祥君
穆丽蔷 赵丽芬
聂江力
绘 图 曹亚范 李 弘
摄 影 张 继

 世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

实用中草药彩色图集. 第7册 / 罗献瑞主编. — 广州:
广东世界图书出版有限公司, 2001.10
ISBN 7-5062-4618-X

I. 实...
II. 罗...
III. 中草药—图集
IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第072527号

实用中草药彩色图集(第七册)

出版发行: 广东世界图书出版公司
(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)
电 话: 020-84451969 84451010
E-mail: gzwpagd@public1.guangzhou.gd.cn
经 销: 各地新华书店
印 刷: 中国人民解放军第四二二二工厂
(广东省湛江市霞山菜塘路61号 邮编: 524002)
版 次: 2001年10月第1版
2001年10月第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/32
印 张: 14.75
印 数: 1-10 000册
书 号: ISBN 7-5062-4618-X/R·0021
出版社注册号: 粤014
定 价: 38.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

内 容 简 介

本图集第七册本着实用的宗旨，植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。本册收载东北地区产的中草药210种，其中植物药203种，每种均附彩图，部分有药材图，动物药6种，矿物药1种，仅附药材彩图。对东北及其邻近地区从事中草药生产、经营、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物及药材，均有很好的参考价值。

编写说明

1. 本册收载中草药 210 种，其中植物药 203 种、动物药 6 种、矿物药 1 种。原植物和药材彩图 210 幅。
2. 动物药仅收录药材部分，并附药材彩图，原动物图形和形态描述均从略。
3. 《中华人民共和国药典》(一部)，简称《药典》，本册中均指 1995 年版。
4. 本册编写体例同于前六册。不再赘述。

续编写前言

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于2种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1998年8月于广州

目 录

一、全草类	1	地构叶	48
二叶舞鹤草	2	回回蒜	50
三楞草	4	羊耳蒜	52
大丁草	6	血经草	54
大马蓼	8	关当药	56
大酸溜溜	10	关甜地丁	58
山梗菜	12	红旱莲	60
飞廉	14	红花鹿蹄草	62
女菀	16	两栖蓼	64
马先蒿	18	角蒿	66
木贼	20	鸡眼草	68
火绒草	22	苦地丁	70
水苦葵	24	刺蓼	72
石淋草	26	刺沙蓬	74
打碗花	28	雨韭	76
东风菜	30	斩龙草	78
北血见愁	32	委陵菜	80
北瓦韦	34	兔儿伞	82
白屈菜	36	狗舌草	84
瓜子金	38	狗筋蔓	86
对叶莲	40	细辛	88
老鹤草	42	哈拉海	90
列当	44	挖耳草	92
地椒	46	点地梅	94

星星草	96
苕菜	98
圆叶茅膏菜	100
铁扇子	102
铃兰	104
透骨草	106
赶山鞭	108
黄莲花	110
萝藦	112
梅花草	114
眼子菜	116
野大豆	118
野芝麻	120
野决明	122
蛇含	124
旋花	126
葎草	128
景天三七	130
蓝布正	132
蓬子菜	134
睡菜	136
福寿草	138
辟汗草	140
聚花风铃草	142
漆姑草	144
漏斗菜	146
鼈菜	148
糖芥	150

繁缕	152
翻白草	154
二、根和根状茎类	156
人参	157
三棵针	160
三棱	162
土木香	164
土贝母	166
上天梯	168
山银柴胡	170
山紫菀	172
牛尾菜	174
天南星	176
升麻	178
手掌参	180
玉竹	182
石防风	184
龙胆	186
平贝母	188
北玄参	190
北续断	192
四块瓦	194
白芷	196
白首乌	198
白附子	200
白藓皮	202
羊蹄	204

关白附	206	柴胡	262
关百合	208	蛇葡萄	264
关苍术	210	狼毒	266
关延胡索	212	黄芪	268
红药子	214	黄芩花	270
红狼毒	216	绵马贯众	272
延龄草	218	黑三棱	274
赤芍	220	黑藜芦	276
两头尖	222	酸模	278
旱麦瓶草	224	鲜黄连	280
刺五加	226	漏芦	282
刺楸	228	樱草根	284
和尚菜	230	缬草	286
知母	232	菴白	288
京大戟	234	藁本	290
毒芹	236		
草乌	238	三、茎、枝和树皮类	293
茜草	240	长白瑞香	294
荚果蕨贯众	242	芒	296
威灵仙	244	关木通	298
鸦葱	246	灯心草	300
香加皮	248	红瑞木	302
芥苳	250	鸡树条	304
禹州漏芦	252	刺老鸦	306
穿山龙	254	刺南蛇藤	308
秦艽	256	鬼箭羽	310
荷青花	258	秦皮	312
桂皮紫萁	260	桦树皮	314

接骨木	316	六、果实和种子类	365
黄柏	318	千金子	366
紫杉	320	千金榆	368
照山白	322	马兜铃	370
暴马子皮	324	天仙子	372
槲寄生	326	火麻仁	374
四、叶类	329	北五味子	376
大青叶	330	地肤子	378
白山苔	332	关鹤虱	380
罗布麻叶	334	灯笼果	382
野艾	336	赤虬	384
越桔	338	连翘	386
紫丁香	340	沙苑子	388
满山红	342	刺玫	390
五、花类	345	郁李仁	392
东北蚰蒿	346	荞麦	394
北洋金花	348	胡卢巴	396
松花粉	350	胡桃楸仁	398
金莲花	352	梓实	400
金银忍冬	354	野亚麻仁	402
旋覆花	356	锦灯笼	404
啤酒花	358	鼠李	406
款冬花	360	榛子	408
紫葳	362	薏仁	410
		螫实	412
		七、藻类和菌类	415
		木耳	416

海藻 418

八、动物和矿物药类 421

马宝 422

马鹿尾 422

麦饭石 424

驴鞭 424

阿胶 426

狗茸 426

海螺 428

中文名索引 429

拉丁名索引 442

一、全草类



二叶舞鹤草

别名 舞鹤草。

来源 本品为百合科植物二叶舞鹤草 *Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmi. 的干燥全草。

原植物 二叶舞鹤草(图1)为多年生矮小草本,高8~25cm,根状茎细弱匍匐;茎直立,不分枝,基部具白色膜质叶鞘。基生叶一枚,早落,茎生叶2枚,互生于茎的上部;叶片三角状卵形,长3~10cm,宽2~5(9)cm,基部心形,先端锐尖,边缘生柔毛或有锯齿状乳头突起,下面脉上有柔毛或微毛;叶柄长1~2cm,有柔毛。总状花序顶生,长3~5cm,有20朵花左右,总花轴有柔毛或乳突状毛;花白色,花梗细,基部有宿存苞片,顶端有关节;花被片4,长约2mm,矩圆形,有1脉,外展或下弯;雄蕊4,花药长0.5mm。浆果球形,成熟时红色至紫红色。种子卵圆形,种皮黄白色,有皱纹。

生于林下。分布于我国东北、西北、华北及四川等省区;朝鲜、日本、俄罗斯远东地区、欧洲、北美也有。

采收加工 夏季采挖,晒干。

药材性状 根茎细长呈圆柱形,黄棕色,有节,节上生有须根,上部残存的鳞叶和叶柄呈纤维状,棕褐色;质脆,易折断,断面类白色。茎纤细,直径约1mm,长8~25cm,具纵棱,绿褐色,下部常有黑紫色斑。叶2枚,常卷曲,展平后为卵状心形,叶缘具细睫毛,弧形叶脉,下表面叶脉有粗毛,绿色或黄绿色。总状花序。浆果球形,熟时污棕色,有种子1~2粒。气微,味酸、涩。

性味和功用 酸、涩、微寒。凉血,止血。用于外伤出血,吐血,尿血,月经过多。常用量25~50g;外用适量,研末外敷。

附注 东北地区资源丰富,易于采挖。




图1 二叶舞鹤草

三 楞 草

来源 本品为莎草科植物球穗莎草 *Cyperus difformis* L. 的干燥全草。

原植物 球穗莎草(图2)为1年生草本,高10~60cm。具须根。秆丛生,扁三棱状,光滑。叶基生,短于秆,条形,宽2~6mm。苞片2,少为3,叶状,长于花序。辐射枝3~9,生于叶状苞片之上,不等长,最长约3.5cm,短者几乎与苞片基部合生;小穗多数,密集成直径约5~15mm的头状花序,小穗条形或披针形,长2~8mm,宽约1mm,有8~30朵花;鳞片膜质,近扁圆形,长不及1mm,顶端圆,中间淡黄色,两侧深紫红色,边缘白色透明,有3脉;雄蕊2(1);花柱极短,柱头3。小坚果倒卵状椭圆形,有三棱,与鳞片近等长,淡黄色。

生于稻田及河边湿地。分布于东北、华北、西北、华南、华东、华中、西南各省区;朝鲜、日本、印度、马来西亚、大洋洲、非洲、北美洲也有。

采收加工 夏、秋采收,晒干。

药材性状 全草长10~60cm。须根多数,黄白色或红褐色,质脆,易折断,断面类白色。茎丛生,呈三棱形,黄棕色或黄褐色。叶线形,长15~25cm,宽2~6mm,黄绿色或黄棕色,叶鞘长筒状,褐色。苞叶2~3枚,比花序长,小穗条形或披针形,暗褐色。气微,味微苦。

性味和功用 咸、微苦,凉。归心、肝、肺、膀胱经。行气利水,通淋,活血。用于热淋,小便不通,跌打损伤,吐血。常用量15~30g。



图2 球穗莎草
1. 植株; 2. 小穗; 3. 小坚果

大 丁 草

别名 小火草、藤草。

来源 本品为菊科植物大丁草 *Leibnitzia anandria* (L.) Turcz. 的干燥全草。

原植物 大丁草(图3)为多年生草本。根状茎短,下生多数细长须根,具辛辣味。有春秋二型植株,春型植株矮小,基生叶丛生,莲座状,有长柄;叶片椭圆状宽卵形,长2~5.5cm,宽1.5~4.5cm,先端圆钝,基部心形,边缘浅齿状或基部羽裂;春夏间抽花葶,高8~19cm,初有白色蛛丝毛密生,后渐脱落;头状花序单生,直径约2cm;边花舌状,淡紫红色,中央花管状,黄色。秋型植株较高大,基生叶倒披针状长椭圆形或椭圆状广卵形,长5~16cm,宽3~5.5cm,基部逐渐变窄成柄,边缘提琴状羽裂,上面绿色,下面密生白色蛛丝毛;秋季成花,花葶高30~60cm,仅有管状花。瘦果纺锤形,两端收缩。

生于山坡、沟谷、路旁及林下草丛中。我国南北各省均有分布。

采收加工 春、秋两季采收,洗净,晒干。

药材性状 全草卷缩成团,长6~60cm,全株被白色蛛丝状毛。根茎短,生有许多细长须根,表面棕色,易折断,断面黄白色,味辛辣。叶基生,呈莲座状,皱缩或破碎,灰绿色或褐绿色。花葶1~3个,每葶顶生一个头状花序。总苞筒状钟形,管状花黄色,冠毛污白色。瘦果紫褐色。以叶色绿、有花者为佳。

性味和功用 苦,寒。祛风除湿、解毒消肿。用于风湿痹痛、肢体麻木、疮痍肿毒、肺热咳喘、外伤出血。常用量15~25g;外用适量、捣烂敷患处。