

皇漢醫學叢書

醫救

急

略

選

抄方

R. 3

丹波元簡 編

皇漢醫學叢書

救急選方

人民衛生出版社

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」~~以及~~稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

凡例

一是書端爲拯急救危之備焉。凡閒暇之時。宜繙閱之。知某法可以療某病。某物可以理某證。留心記憶。或預畜。或預製。一遇危急。察脈揣腹。審辨甄別。卽與拯救耳。卒病暴疾。或有萬無生機。而翻然致甦者。則呻吟窘迫。呼吸危亡之際。須竭心力。死中求活。此仁人之心術。先府君所以深望於醫家輩。簡區區。所以著此書之一大關鍵也。

一病有陰陽塞脫之不同。倉猝之際。或難辨認者。間揭其厓略。以爲蒙學指南。

一中風脚氣之類。證候多端。茲彙輯倉皇拯救諸方而已。其稍涉輕緩。可以從容調理者。概置不錄。

一輯仲景而降。歷代諸方。旁及本邦所傳。有一證而臚列數方者。非驚博也。地異產殊。時移物換。此之所有。彼之所無。欲因便取材耳。是乃拯急救危之本意也。

一每方各註所出書目。然多隨見採摘。未遑一一尋究。恐未免差錯。且如拯救諸法。有疎于前。而詳于後者。今特採其詳。而切乎施用者。不拘於出典之前後。又如本草綱目附方。盡載出典。而其元書佚于今。而無由

乎。讎對詳明者。姑以本草附方四字概之。

一金瘡癰。撲打瘡。獨輯內科方。至如貼傳膏散等。責在瘍醫。故一概不錄。一分兩升合。隨時更變。輕重不等。今每方直依元書而載之。不敢以意改易。用者當視病淺深。察藥柔峻。酌古準今。以從俗便。

一藁本未繪。及門府催傳佈。藏工入梓。如其遺漏。當爲續方而刪刻。

邦袂元簡識

救急選方上卷

丹波元簡 醫方類聚

諸卒死門

三物備急丸

金匱

主心腹卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣

急口噤。停尸卒死。

大黃

一兩

乾薑

一兩

巴豆

一兩去皮心熬外研如脂

右藥各須精新。先擣大黃乾薑爲末。研巴豆內中合治。二千餘用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令洩氣。主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以煖水若酒服。服三許三四丸。或不下。捧頭起灌令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下便差。若口噤。亦須折齒灌之。案古今錄驗。司空三物備急散。療卒死及感忤。口噤不開者。卽本方爲散。

服如大豆二枚。

還魂湯

金匱

救卒死客忤死。

麻黃

三兩

杏仁

七十箇

甘草

一兩

右三味。以水八升。煮取三升。去滓。分令咽之。通療諸感忤。裏實者。用

備急丸。表實者。用還魂湯。金匱

救卒死方金匱雄雞冠割取血管吹內鼻中。薤搗汁灌鼻中。

又方肘後半夏末如大豆許吹鼻中。案此千金療五絕法。心下溫者。一日亦可治。

又方同上灸臍中百壯。又方令人痛爪其人人中取醒。又方以細繩圍

其人肘腕中男左女右伸繩從背脊上大椎度以下行脊上灸繩頭。五十壯。一云。

又從此灸橫行各半繩此凡三灸各灸三壯即起。又方灸鼻下人中

三壯。又方並兩足大指爪甲聚毛中七壯此華陀法。一云三七壯。

又方秘方集驗燒炭火一杓以醋燒之令患人鼻受醋氣即甦。

救卒死而壯熱者。金匱礬石半斤以水一升半煮消以漬腳令沒踝。

救卒死而張目反折方。金匱灸手足兩爪後各十四壯了飲以五毒諸膏散

有巴豆者。

救卒死而四肢不收失便者方。金匱馬屎一升水三斗煮取二斗洗之。又以

牛洞一升溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯差

小兒卒死。本草附方無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或嚏即活。

卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡之類。肘後取葱中央心

刺鼻令入七八寸無苦使目中血出乃佳。一云耳中血出佳。又方令

二人以衣壅口吹其兩耳極則易人亦可以葦筒吹之並捧其肩側

身遠之莫臨死入上。又方以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難

原
书
缺
页

原
书
缺
页

針入二分。

鍼暈者。神氣虛也。不可起鍼。以鍼補之。急用袖掩病人口鼻回氣。內與熱湯飲之。卽甦。良久再鍼。甚者鍼手膊上側陷中。卽蝦蟆肉上。惺惺穴。或三里。卽甦。若起鍼壞人。門入

入浴暈倒。

本朝經驗

以冷水噴面。及燒周身。苦酒一鍾。灌口鼻中。或醒後。衄者。

蘇子降氣湯。調辰砂末飲之。

苓朮湯。

因三

治暑濕鬱發。或入浴暈倒。口眼喎邪。手足譫曳。皆濕溫類也。

附子

茯苓

白朮

乾薑

澤瀉

桂心

右等分。水煎服。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈遍照其身。若是小瘡。卽是其毒。宜急用萬靈奪命丹之類。瘍醫大全。方出疔瘡門。

中惡門

朱犀散。

得効

治中惡中忤鬼氣。其證暮夜或登廁。或出郊野。或遊空冷屋室。

或人所不至之地。忽然眼見鬼物。鼻口吸着惡氣。驚然倒地。四肢厥冷。兩手握拳。鼻口出清血。性命逡巡。須臾不救。此證與尸厥同。但腹不鳴。心脇俱暖。凡切勿移動其屍。卽令親戚圍繞。燒麝香安息香樟木之類。直候醒知事。方可移歸。

犀角末五錢

麝香

硃砂各二錢半

右爲末。每服二錢。井水調下。如無前藥。用雄黃末。服一錢。煎桃枝湯調灌。

走馬湯金匱附方療中惡心痛腹脹。大便不通。

杏仁二枚

巴豆二枚

右二味。以綿纏。搥令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊。

又方外臺仰臥以物塞兩耳。以兩個竹筒。內死人鼻中。使兩人痛吹之。塞口

傍無令氣得出。半日所。死人噫噫。勿復吹也。

又方肘後灸兩足大拇指上甲後聚毛中。各灸二七壯。卽愈。又方。灸右肩

高骨上。隨年壯良。

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不

守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。皆不知人。卽是卒厥客忤。飛尸

鬼擊。弔死悶喪。入廟登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。方見中風候稍甦。服調

氣平胃散。要訣

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二兩

藿香

甘草各八兩

砂仁四兩

蒼朮八兩

厚朴

陳皮各二兩

右姜棗水煎入鹽十捻。

五絕死門

療五絕死方

金千

夫五絕者。一曰自縊。二曰墻壁壓死。三曰溺水。四曰魘寐。

五曰產乳絕。皆取半夏一兩。細下篩。吹一大豆許。內鼻中。卽活。心下溫

者。一日亦可活。

案夷堅續志。添無病卒死。爲六絕死。亦主此方。又醫說。載劉大丞曉陵人。有鄰家朱之質。有一子。年三十一歲。忽然卒死。脈全無。大丞取齊州半

夏細末一大豆許。細鼻中良久身微暖。氣更甦。人問卒死大丞單方半夏。如何得活死人。答曰。此南岳魏夫人方。○此方三因。名半夏散。療五絕及諸暴絕證。

救自縊死法

金千

旦至暮。雖已冷必可療。暮至旦。小難也。恐此當言陰氣盛

故也。然夏時夜短於晝。又熱。猶應可療。又云。心下若微溫者。一日以上

猶可活。

醫學心悟曰。予嘗見自縊至旦。而猶救活者。不可輕棄也。

徐徐抱解。不得截繩。上下安被臥之。一

人以腳踏其兩肩。手少挽其髮。常弦弦勿縱之。一人以手按揉胸上。數

動之。一人摩捋臂脛屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。并按其腹。如此一

炊頃。氣從口出。呼吸眼開。而猶引按莫置。亦勿苦勞之。須令可少桂湯。

及粥清食與之。令濡喉。漸漸能嚥。乃稍止。兼令兩人以兩管吹其兩耳。

彌好。

千金云。以藍純覆口鼻。兩人吹其兩耳。

此法最善。無不活也。

又方

金千

皂莢末。葱葉吹其兩鼻孔中。逆出復內之。又方。以藍青汁灌之。

又極須安定身心。徐徐緩解。慎勿割繩。抱取心下猶溫者。刺鷄冠血滴

口中。卽活。男用雌鷄。女用雄鷄。又方。鷄屎白。以棗許酒半盞和。灌口

鼻中卽活。又方。梁上塵。如大豆。各內一筒中。四人各一筒。同時吹兩耳鼻中。極力吹之。

又方。顧體集凡自縊之人。若繩細痕深者。最稱難救。須急令人抱。將結解開。

切勿割斷繩子。以手揉其項痕。撚圓氣管。并摩按胸腹。或用手捫其口鼻。或用口對口接氣。令一人以脚踏其兩肩。手挽其髮。常令扯急。不可使頭低下。再令一人。以膝蓋或手厚裹衣服。緊緊抵住穀道。婦人并抵陰戶。勿令泄氣。若手脚已經僵直。必須盤曲。如僧打坐之狀。急以兩管吹其兩耳。再碾生半夏末皂角末。吹入鼻孔。以針尖刺鼻下人中穴。以艾灸腳心湧泉穴。男左女右。各三醮。男刺雌雞冠血。女刺雄雞冠血。滴入口中。以安心神。再以薑湯化蘇合丸灌之。如無蘇合丸。以濃薑湯灌之。其一切治法。必待氣從口出。呼吸眼開。方可歇手。甦醒後。只宜少飲粥湯。潤其咽喉。不可驟與飯食。依此拯救。再無不活之理。傷醫大全云。必須心口向溫。大便未下。舌未伸出者。救治。

又方。管氏五絕治法徐徐放下。將喉氣管捻圓。揪髮向上揉擦。用口對口接氣。糞門

用火筒吹之。以半夏皂角搐鼻。以薑汁調蘇合香丸灌之。或煎木香細

辛湯調灌亦得。如甦可治。繩小痕深過時身冷者。不治。

用救法活。却用降氣湯三和湯蘇合香丸灌之。居家必用

救壓死法

因三

以死人安著。將手袖掩其口鼻眼上。一食頃活。眼開。仍與熱

小便。若初覺氣絕而不能言。可急劈口開。以熱小便灌之。打撲者亦用此。

療壓死。及墜跌死。心頭溫者。

奇效單方

急扶起。將手提其髮。用半夏末吹入鼻

內。少甦。以薑汁同香油。打勻灌之。次取藥服。

又方

萬全續方

以雄雞一隻刺血。以好酒一碗。攪勻熱飲。外用連根葱。炒爛傳

上包裹之。冷再換。

餘當與顯撰門互考。

救溺死法

金匱

取竈中灰兩石餘。以埋人。從頭至足。水出七孔。即活。

李時珍云。用竈灰一石。

埋之。從頭至足。惟露七孔。良久即甦。凡蠲溺水死。試以灰埋之。少頃即便活甚驗。蓋灰性暖。而能拔水也。

又方

肘後

取甕傾之。以死者伏甕上。令口臨甕口。以蘆火二七把。燒甕中。當

死人心下。令煙出。少入死者鼻口中。鼻口中水出盡。則活。蘆盡更益爲

之。取活而止。常以手候死人身及甕。勿令甚熱。冬天常令火氣能使死

人心下足得煖。若卒無甕。可就岸穿地。令如甕。燒之令煖。乃以死人著

上亦可。又方。便脫取煖釜覆之。取溺人伏上。腹中出水。便活也。

又方

千金

屈兩脚。著生人兩肩上。死人背向生人背。即負持走行。吐出水。便

活。又方。解死人衣。灸臍中。凡落水經一宿。猶可活。又方。綿裹皂笊。

內下部中。須與出水。又裹石灰。內下部中。水出盡則活。

又方

得効

用酒壘一箇。以紙錢一把。燒放壘中。急以壘口覆溺水人口面上。

或臍上。冷則再燒紙錢於壘內。覆口面臍上。去水卽活。奈人不諳曉。多以爲氣絕。而不與救療可憐。

又方

奇効

將醋半盞。灌鼻中。案本朝經驗。用熱醋一椀。奇効。

凡遇溺水者。視其心坎尙溫。以圓器覆地下。置門一扇於上。令溺者仰臥。

以鴨血灌之口中。或大小便出水。卽甦。廣筆記

凡人溺水。往往壁泥覆罨。或倒提出水。皆未全驗。惟用鹽。不拘多少。使強有力者。自頂及踵。四肢腹背用力摩擦。須臾水自百毛孔中出。良久漲

消氣甦。雖過時可活。

博開類纂

又方

本朝與藥察方

雄鷄冠血。將一茶鍾灌之。少頃水出卽活。神驗。

凡水溺之人。夏月可救。冬天難救。撈起時。切勿倒控。急急將口撬開。橫啣

筋一雙。使可出水。以竹管吹其兩耳。脹生半夏末。吹其鼻孔。皂角末置

管中。吹其穀道。如係夏月。用牛一隻。將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊

使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水。自然從口中并大小便流出。再用

蘇合丸。化開灌之。或生薑汁灌之。若無牛。以活人仰臥。令溺人如前將

肚皮橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時無牛。兼活

人不肯拯救。或覆鍋一口。將溺人覆於鍋上。亦可。如係冬月。急將濕衣

解去。一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。肚下墊以縣枕一個。仍以灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰墜於眼內。其撬口啣筋。灌蘇合丸。生薑湯。吹耳鼻。穀道等事。俱照夏天救法。冬天醒後。宜少飲溫酒。夏天醒後。宜少飲粥湯。顧體集

溺水死。若五孔有血者。不活。五絕療法

救魘死法。肘後臥忽不寤。勿以火照之。殺人。但痛齧其腳踵。及足拇指甲際。

而多唾其面。則覺也。又方。皂莢末。以竹筒吹兩鼻孔中。即起。又方。

以蘆管吹兩耳。

又方。外臺以鹽湯飲之。多少任意。又方。雄黃細篩。管吹兩鼻中。

又方。千金翼灸兩足大指聚毛中。二十一壯。

救魘死。不得着燈火照。亦不得近前急喚。多殺人。若原有燈。即存。得効○醫學心悟云。

以處原有燈。則存。如無燈。切不可。可以燈照其面。只可遠遠點燈耳。

雄朱散。得效治魘死。其證初到客舍。或館驛。及久無人居冷房中。睡覺鬼物

魘魅。或聞其人吃吃作聲。便令人叫喚。如叫不醒者。此乃鬼魘。須臾不

救即死。

牛黃

雄黃各一錢

硃砂半錢

右爲末和勻。先挑一錢許燒。次挑一錢用酒調灌之。

斃絕者。神虛氣濁。風痰客于心肺。所以得夢不覺。濁氣閉塞而死。氣動不甦。面青黑者不活。急以搐鼻散。引出膈痰。次以蘇合丸。導動清氣。身動則甦。若身靜色陷者不療。五絕療法

搐鼻通天散

猪牙皂角

去皮弦一兩

細辛

半夏

各五錢

共爲極細末。每用一二分。吹鼻中。得嚏則甦。

救產乳絕法。救法。出下婦人急證門。

卒中風門

療卒中法

直指

天南星

木香

蒼朮

半夏

細辛

甘草

石菖蒲

各一錢

生薑七厚片。水煎。乘熱調蘇合香圓三圓灌下。痰盛者加全蝎二枚炙。療一切卒中初作皆可用此。先以皂角。去弦皮。細辛或生南星半夏爲末。搗以管子。吹入鼻中。候其噴嚏。卽進前藥。牙噤者。中指點南星細辛末并烏梅肉。頻擦自開。又方

木香

二錢

南星

七片

生薑

七片

石菖蒲

二寸

右水煎乘熱調木香末一錢。蘇合香圓三圓與之。