

河北藥材

河北省 卫生厅 编
商业厅 医药局

河北人民出版社

河 北 药 材

河北省卫生厅编
商业厅医药局

河北人民出版社出版 (保定市裕华东路) 河北省书刊出版业营业许可证第三号
河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168 $\frac{1}{32}$ ·13 $\frac{5}{8}$ 印张·200,000字 印数: 1—17,500册 1959年6月第一版
1959年6月第一次印刷 统一书号: T14086·52 定价: (8) 1.37元

序

藥物學是祖國醫學的重要組成部分。我國藥物的特點，主要是採用植物、動物和礦物的入藥部分，尤其是採用植物性的天然藥物，品種最多。所以中國藥物學稱為“本草學”。

河北省是祖先活動最早的地區之一。從周口店中國猿人、山頂洞人的骨骸化石推測，遠在石器時代，河北省西北部地區就有祖先的活動。蘇聯生理學家巴甫洛夫說：“有了人類就有醫療的活動……。”由此可見，河北省地區的人民醫療活動，有深遠的歷史。

人民的醫療活動，是和藥物的利用分不開的。隨著人類生產勞動的進化，物質文化生活的不斷提高，對自然藥物的利用範圍，也不斷地擴大，品種也不斷地增多。很多植物性的藥物，由野生變為人工栽種，藥用野禽、野獸、昆蟲，變為家養。這些天然藥物的利用，是我國勞動人民在生產生活鬥爭中防治疾病的經驗總結；是我國人民文化科學史上燦爛的一頁。但是國民黨反動統治階級，醉心歐美資產階級文化，提倡全盤西化，取締中醫，因而中藥也受到極大摧殘。解放後，黨提出了團結中西醫政策，繼承和發揚祖國醫學遺產，從而扭轉了對中醫輕視、歧視、排斥的現象，鼓舞了中醫情緒，充分地發揮了中醫的積極作用，因而，中藥也隨之得到發展。

由於人民公社的建成，人民生活的提高，以及中醫政策的具体執行。人民對中醫的醫療保健要求，也隨之提高。藥材生產量與人民醫療需要量，已不相適應，許多藥材脫銷。為此，河北省衛生廳、商業廳醫藥局對本省生產的藥材作了初步調查，將現已生產的主要藥材三百多種，編成“河北藥材”，供醫藥技術人員學習參考。

河北省衛生



前 言

中藥材是我國勞動人民幾千年來同疾病作鬥爭的經驗積累。對維護我國民族的生存與發展有着極大的貢獻，是祖國文化科學遺產的重要部分。

我省處於華北平原，幅員遼闊，北與內蒙高原毗連，南臨黃河與河南接壤，東濱渤海，西鄰山西。省內不僅有河流、水澆和廣闊的平原，也有山巒縱橫、丘陵起伏的山地，是一個山區、平原和水區並兼的省份。氣候適中，雨量充沛，適合各種動、植物藥材生長。品種多，分布廣，蘊藏量極為豐富。僅據初步調查，藥材蘊藏量約有4億1千餘萬斤，已採集生產者即達330餘種。資源無限，潛力無窮，很多品種是取之不尽、用之不竭的天然藥源。

幾年來我省藥材生產量隨着黨的中醫中藥政策的正確貫徹，農村多種經濟的開展，已有了飛躍的增長。在1949年生產藥材55種，年產量200萬斤的基礎上，到1958年已增加收購品種達300餘種，年產量增加到5,700餘萬斤。藥材生產的發展，在我省農村，特別是山區已成了開展多種經濟、增加群眾副業生產收入的重要來源。通過藥材生產的發展，對貫徹黨的中醫政策，滿足醫療用藥、保證人強馬壯促進工農業生產、建設社會主義發揮了一定作用。

為進一步發展我省藥材生產，正確貫徹黨的中醫中藥政策，認真執行國務院關於發展中藥材生產問題的指示，依靠群眾大搞藥材生產、採集運動，在兩三年內基本上實現我省中藥材生產自給自足的規劃，我們編輯了“河北藥材”一書，來反映我省所產的主要藥材面貌。其目的是為了幫助各地人民公社的藥材生產、採集人員、收購人員與各地區的醫、藥工作者，

全面了解我省药源，提高识别药物的能力，熟悉收购技术，掌握生产种植方法，以及对药材性能的了解。从而有助于广泛开展宣传，组织技术传授，启发群众生产积极性。“人人尝百草、个个当神农”，积极挖掘药材资源，扩大药材培植，以便将我省药材生产种植、采集、收购工作推向一个新的高潮。

本书的内容，系根据我省现已生产的主要药材，分动、植、矿物三类进行编写的，共计327种。对于某些新发现的野生药材，如轮叶王孙、翠雀、毛茛、草石蚕等近百种品种及引种、试种省外药材，如女贞子、功劳叶、佛手、黄连、当归等数十种品种，由于尚缺乏成熟的采集、培植经验，均未编入，留待今后再行补充。

本书的编写，除参考张家口、承德、保定等专区编印的“药材收购手册”外，并参考“中国药学大辞典”“现代实用中药”“中国药用植物志”“生药学”“辽宁药材”等书，结合我省所产药材实物标本，而编写成的。初稿写成后，为达内容切合实际，召开了各专区药材经营部门生产、收购专业人员会议，进行了较为系统的审订。其次，为帮助读者认识各种药材的形态，我们参照药材实物标本，绘制了动、植、矿物药材插图279幅，借以帮助读者具体地认识原药物的生长形态。

书中所列品种，每篇内容大体上包括别名、土名、来源与形态、产地、产季、采集与加工、包装与保管、性能等几项，最后并附有部分药材的种植方法。为便于农村广大社员阅读起见，在编写时，文字力求简单明确，尽量避免使用药学术语。但由于我们业务水平和能力所限，再加时间仓促，缺点和错误在所难免，深望读者及时给予批评和指正，以便再版时修正，使本书内容逐步达到正确、完整。

编 者

1959年3月

目 录

植 物 类

山药·····	1	丹参·····	40
山人参·····	4	月季花·····	42
山豆根·····	5	天仙子·····	43
山楂片·····	7	附：萹蓄叶	
大黄·····	8	水红花子·····	45
大青叶·····	11	甘草·····	46
附：青黛		生地·····	48
大薊·····	13	附：熟地	
土貝母·····	14	白芷·····	51
土三七·····	17	白头翁·····	54
小茴香·····	18	白花菜子·····	56
小薊·····	20	白毛根·····	58
川山柳·····	21	白藜皮·····	59
牛膝·····	23	白果·····	61
牛蒡子·····	26	白朮·····	62
五味子·····	27	白苏子·····	64
五加皮·····	29	白曼陀罗·····	66
元胡·····	30	白蘇草·····	68
升麻·····	32	白芥子·····	70
木賊·····	33	附：黄芥子	
瓦松·····	35	白薇·····	71
凤仙花·····	36	白扁豆·····	73
附：急性子		白屈菜·····	74
王不留·····	37	瓜蒌·····	76
火麻仁·····	39	附：瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉	

半夏	79	附：車前草	
玉竹	80	何首烏	119
玉蜀黍須	82	杏仁	120
玉簪花	84	防风	122
石花	85	远志	123
石葦	86	附：小草	
石榴皮	88	麦芽	126
仙鶴草	89	麦角	127
刘寄奴	90	麦冬	129
冬瓜子	92	旱蓮草	130
附：冬瓜皮		草决明	132
龙葵	93	青木香	134
地榆	95	青蒿	136
地骨皮	96	青椒	137
地肤子	98	知母	139
百合	99	附：知母肉	
老鸛草	101	枸杞果	141
艾叶	102	附：地骨皮	
西瓜皮	104	板藍根	144
間荆	105	附：大青叶	
南蛇藤	106	板栗	147
血見愁	107	金銀花	149
列当	108	金櫻子	151
沙参	108	芫花	152
赤芍	112	玫瑰花	154
皂角	113	芡实	155
附：皂角刺		抽葫蘆	157
谷芽	115	蘆根	158
佛手参	116	松节	160
車前子	117	附子	161

- 兔兒傘163
 南星164
 紅花168
 郁李仁171
 香附子172
 香鈴子174
 香薷175
 苦參178
 苦丁香179
 附：甜瓜子
 獨活181
 獨角蓮182
 茄根184
 威靈仙185
 胡麻子187
 穿山龍188
 薺菜189
 枳實191
 前胡192
 卷柏193
 柿蒂195
 附：柿霜
 芫藤子196
 韭菜籽197
 附：野韭菜籽
 桔梗199
 荊芥200
 附：芥穗
 黨參203
 秦艽205
 秦皮207
 柴胡208
 胡桃仁210
 附：分心木
 桃仁211
 臭蕪荑212
 夏枯草213
 徐長卿214
 陳皮216
 馬蘭子217
 附：馬蘭花
 馬鞭草218
 馬兜鈴220
 附：天仙藤
 馬齒莧222
 馬勃223
 桑白皮224
 附：桑枝、桑葉、桑椹
 桑寄生226
 茯苓228
 草烏229
 茜草230
 益母草232
 附：菴玉子
 浮萍草233
 鬼箭羽234
 茵陳236
 狼毒237
 透骨草239
 黃蓍241

- 黄芩243
 黄精245
 黄柏247
 黄瓜皮248
 附：黄瓜子
 商陆249
 商麻子254
 旋复花253
 梓实254
 败酱草256
 盘龙参257
 澤兰259
 蛇床子260
 貫仲262
 側柏叶263
 附：柏子仁
 麻黄265
 附：麻黄根
 牵牛子266
 紫苑267
 紫草270
 紫苏272
 附：苏梗、苏叶、苏子
 紫花地丁275
 紫参277
 菊花278
 款冬花281
 菖蒲282
 黑芝麻284
 萊菔子286
 蓖麻子288
 楮实子289
 菟絲子290
 絲瓜絡292
 葶藶子293
 葎草295
 鷄冠花297
 附：青葙子
 篇蓄299
 蜀葵花300
 萱草根301
 鈴兰303
 葛根304
 附：葛花
 椿根皮306
 附：鳳眼草
 酸枣仁307
 蒼朮309
 蒼耳子311
 漏蘆312
 蒲公英314
 蒲黄315
 豨薟草317
 薯草319
 槐花320
 附：槐米、槐角
 蒺藜321
 蓮322
 附：藕节、荷叶、荷梗、
 荷花、蓮须、蓮子

猪苓	326	翻白草	339
猫眼草	327	瞿麦	341
鴨跖草	328	藁本	343
錦灯笼	330	藜蘆	344
樺树皮	331	悬钩子	345
薄荷	332	藿香	347
薏米	335	續随子	348
薤白	337	纈草	350

动物类

人中白	352	地龙	372
人中黄	352	牡蠣	373
刁骨	352	夜明砂	374
附：刁头、刁爪		刺猬皮	375
大將軍	354	阿胶	376
土元	354	狗宝	378
山羊血	355	紅娘	379
牛黄	357	虻虫	380
牛胆汁	358	馬宝	381
胆星	359	海螺	381
五谷虫	360	海螵蛸	382
水蛭	360	海馬	383
五灵脂	362	豹骨	384
瓦楞子	363	烏鷄	386
白丁香	364	桑螵蛸	386
龙骨	365	蚕沙	388
附：龙牙		附：僵虫	
全蝎	366	鹿茸	389
血余炭	369	附：鹿角、鹿筋、鹿鞭、 鹿尾、野鹿胎	
羊头虫	371		

蛇退皮	392	蝸牛	402
望月砂	393	蟻蛄	403
紫河車	394	蟋蟀	404
蛤壳	395	蝉退	405
斑毛	395	蟹壳	407
蜂蜜	396	附：蟹爪	
附：黄蜡		蟾酥	408
蜂房	398	鱗魚	410
鷄內金	399	附：鱔魚血	
附：鳳凰衣		鱉甲	411
驢三件	401	附：鱉头	
蜘蛛	401		

矿物类

代赭石	413	花蕊石	418
白石英	414	禹粮石	419
附：紫石英		云母石	420
自然銅	415	滑石	421
阳起石	416	活磁石	421
芒硝	417	礞石	422

植 物 類

山 藥

別名：土薯、山芋、山薯。

土名：白山藥、架山藥、淺山藥、白薯。

来源与形态：屬薯蕷科，为多年生宿根蔓生草本植物。我省有野生、家种两种，安国已有数十年的种植习惯。春初生新芽，茎细长，纏繞它物上升。叶对生，有长柄，呈心脏形而略长，头尖锐。夏季由叶腋間生白色小花，呈穗状花序；另由叶腋間生球形灰褐色的零余子（俗称山藥豆），可作种子，亦可食用。其根长1至3尺，粗1至2寸，外皮黄褐，有細毛根及小疙瘩。断面色洁白，性脆易断，粉質大。

主要产地：家种产于安国、易县、阜平和平山县，以及承德市；野生产于迁安、遵化、邢台和青龙县，以及秦皇島市。


产季：在霜降至立冬間。

采集与加工：藥用其根。刨采时，先将茎蔓去掉，順畦挖一深沟，深浅随山藥长短而定，然后向山藥根部刨，并注意勿使山藥折断。刨出后稍晾一会，去淨泥土，进行加工，一般在冬季加工較好。夜晚将山藥放在院里稍冻一下，第二天使其化冻，刮去外皮，晒至半干，用搓板輕搓成直条，再晒至八成干，进行第二次搓制，一直搓到圓滑光亮如圓柱形即可。并将两头切齐（一般为七、八寸长），晒至十成干，再用硫磺熏制，以保色澤，即为光条。毛条仅刮去外皮，用硫磺熏制即得。

規格質量：身干，条粗直，質坚实，色洁白光潤，圓柱形，两头整齐者佳。

包装与保管：用箱或筐装，封闭严密。因夏季容易生虫，可用硫磺熏制，并防止受潮。

性能：性温平，味甘。健脾胃、止痢涩精，为滋养强壮药；还可供副食用。



1.带零余子的茎叶 2.块根 3.果实

附：种植方法

一、选地与整地：山药喜沙质土壤，适宜在重茬或有水源条件的地方播种。在秋收后进行整地深翻，深度3至4尺。3尺以下铺草木灰一层，以使根茎粗壮。翌年化冻后复耕一次，

深約5至6寸，随施基肥（土糞）万斤以上，并翻入土內，耙平作畦。

二、播种：山藥有零余子和种根繁殖两种。但零余子繁殖比种根晚一年收获，因此，目前我省多用种根繁殖。在清明、谷雨間进行播种，畦內开沟，沟距1.5尺左右，深4至5寸，寬5至6寸。把沟底整平后，随将种根单摆沟內，株距4至5寸，种根的头部分順沟外側成直綫形，然后复土寸許，輕踩一遍，摟平即可。播种后不澆水，約半月发芽出土。

零余子适于大面积的种植，于清明左右在整好的畦內挖穴沟，株距4至5寸，每穴播种2至3粒，复土寸許，約半月发芽出土；立冬左右刨出，其第一年生根很短（一般約长5至8寸），因此应进行选种（凡短粗、錐形或畸形者都不宜作种根），以备来年播种用。其方法与种根相同。

三、田間管理：当苗出齐后澆第一次透水，以后进行浅鋤，干旱即澆水，但不要过大或过勤，以經常保持土壤湿润即可。入伏后施肥，在离植株2至3寸处开沟，沟深2至3寸，寬3至4寸，将餅肥或化肥施入沟內摟平（每亩施餅肥60到100斤），施肥后澆水，并注意中耕和除草。因其茎蔓需纏繞它物上升，所以在苗高5至6寸时，搭成×字形的架（架杆可用高粱杆），以便引蔓上架，同时并将地面底叶去掉，任其自由生长。

四、收获：山藥的收获期，一般在霜降至立冬間。其采集或加工方法与前相同。


五、种根的儲藏：在山藥收获后，将根的上部（接近地面长4至5寸处）切下，放在阳光下晒一晒伤口，使其愈合，作为来年种根。种根选好后，挖2至3尺深的坑，长、寬可根据种根多少而定。坑如干燥，可洒些淨水，但不可过湿，然后将种根、头对牆面放于坑內。放一层种根，盖一层土，土的厚度以盖住种根为宜。放滿坑以后，坑面复土7至8寸（严寒地区可厚些），以冻不着为原则。来年春化冻后挖出，晒一晒，即可播种。但在选坑址时，为防止坑內发热，以背阴处为宜。

山人参

别名：人参、人街、鬼盖。

土名：野人参、野山参。

来源与形态：属五加科，为多年生草本植物，自生于大山阴坡潮湿地带或椴树、桦树林中。秋季茎高达2尺左右，主根肥壮，黄白色，略呈纺锤形，末端常分枝两股，多成人字形；侧根细弱而长（称为参须），上有许多疙瘩点（称珍珠须）。根茎粗短、渐细、直立或略弯曲。生在根顶端的称为蘆头，上面有许多窝状茎痕，称为参碗。每年从蘆头长一细弱小茎，茎端（生长四年以上者）分四枝叶柄，上生小叶五片，呈掌状复叶。小叶卵圆形或倒卵圆形，叶端略尖，其中间三叶较大，两旁者较小，有短柄，边缘有小锯齿或大锯齿。腋生花梗，细长（约4至5寸），开伞形花序，花小，由淡绿色渐



1. 植物外形 2. 根茎 3. 花 4. 果实

变为粉红色，最后呈红色，花瓣五枚。花后结肾形种子，淡黄色，质坚硬。在5至6月间开花，8至9月间结果实。

主要产地：青龙和兴隆县。

产季：秋分至结冻为刨采期。

采集与加工：药用其根茎及根须。采集时，用镐在参茎周围1至2尺处挖坑，然后用骨针拨土，以免全参折断。刨出后去茎叶，刷净泥土，晒干即可。但要防止曝晒，以免损失精液。

规格质量：全参（带须），身干，色黄白，质坚实。

包装与保管：用长方形木箱装。内垫白纸，按顺序靠紧装平（芦头朝外，参须放当中，并将各空隙用软纸塞严）。夏季可用硫磺熏制，然后把箱口封闭严密，以免生虫、返油或变质。

性能：味甘，性微寒。为强壮兴奋药。治精神衰弱、虚劳内伤或贫血等症有效。

注：本品是我省1957年新发现品种，产量还不大。

山豆根

土名：关东裸秧、红心草、山豌豆根子。

来源与形态：为一年生落叶缠绕藤本植物，自生于山坡地带。单叶互生，心脏形，呈掌状浅裂，叶端渐尖，全缘。嫩叶两面有毛茸，老时叶面光滑，灰绿色，有长叶柄。腋生圆锥状花序，黄绿色。花落后结果，呈肾形，生时青色，熟时紫黑色。其根茎粗壮或细瘦，条光滑，须根少，外皮黑褐色，断面黄白色。

主要产地：滦源、易县、蔚县、邢台、青龙、兴隆、蔚县、龙关和迁安县，以及承德市。

产季：在春、秋两季产新（春季化冻至苗高寸许止；秋季叶枯死后至封冻止，这时产品质量实、精液足、药效高）。

采集与加工：药用其根。用镐将根刨出，去净泥土和毛须，晒干即可。

規格質量：身干，質實，不帶毛須，色黑黃，無雜質，粗1分以上者佳。

包裝與保管：扎捆，外面用席包裹。保存時宜放乾燥的地方，夏季應經常晾曬，防止發霉或蟲蛀。

性能：性寒，味苦。清熱、解毒、消腫去肺火，為解咽喉腫痛要藥。



1.帶花的枝 2.果枝 3.種子 4.生藥外形