


中医珍本丛书

傷寒方論



不著撰人

傷寒方論

中医古籍出版社

封面题字：王庆其

中医珍本丛书
伤寒方论

〔清〕不著撰人

中医古籍出版社出版
光辉胶印厂印刷
北京市新华书店发行

开本：850×1168毫米 1/32 印张：5.5

印数：1—13500

1984年7月第一版第一次印刷

统一书号：14249.0049 定价：0.88元



2470/62

据中医研究院图书馆所藏清代精抄本
影印原书高二三二
毫米宽一五六毫米

内 容 提 要

本书撰者不详，系研究《伤寒论》方剂的专著。书中对《伤寒论》一百十三方逐条发挥，每方均从主证、主脉、功用、禁忌、配伍特点、随证加减，以及相似方剂比较得失等诸方面进行论述。全文简明扼要、评判得当，因此很值得今人临证处方用药或研究《伤寒论》方剂时借鉴。清代徐彬撰《伤寒方论》「又名《伤寒一百十三方发明》」与本书同名，但内容不同。

清代王子接注《伤寒古方通》与本书所载方剂

次序相同，阅读时可以互参。

本书为清代精抄本，扉页题「汪午桥秘藏方书」，字迹工整清晰，系中医研究院图书馆所藏孤本，从未刊行，今据以影印，可供中医学及临证参考。

中医古籍出版社

一九八四年六月

傷寒方論

汪午橋秘藏方書

院	中
善	醫
本	研
書	究

目 录

和剂

桂枝去桂加茯苓白术汤

桂枝汤……………一

桂枝甘草汤……………四

芍药甘草汤……………五

桂枝加桂汤……………五

桂枝加芍药汤……………七

桂枝加芍药生姜人参新加

小建中汤……………一九

苓桂术甘汤……………一八

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤……………二二

桂枝加葛根汤……………九

桂枝加附子汤……………一〇

桂枝甘草龙骨牡蛎汤……………二三

附子泻心汤	三八	桔梗汤	二三	甘草汤	二三
半夏散 及汤	一四	苦酒汤	二五	桔梗汤	二四
小柴胡汤	二六	小柴胡汤	二五	半夏散 及汤	二四
柴胡桂枝汤	二九	柴胡桂枝干姜汤	三〇	苦酒汤	二五
柴胡加龙骨牡蛎汤	三二	柴胡桂枝干姜汤	三〇	桔梗汤	二三
生姜泻心汤	三四	生姜泻心汤	三四	半夏泻心汤	二三
甘草泻心汤	三六	汤	四七	甘草汤	二三
赤石脂禹余粮汤	四九	旋覆代赭石汤	四八	桔梗汤	二三
		厚朴生姜半夏甘草人参		梔子干姜汤	四〇
				黄芩汤	四一
				干姜黄连黄芩人参汤	四三
				黄芩加半夏生姜汤	四二
				黄连汤	四三
				黄连阿胶汤	四五
				桔梗汤	二三

芍药甘草附子汤	五一	梔子柏皮汤	六六
炙甘草汤	五三	白头翁汤	六七
当归四逆汤	五五	文蛤散	六八
当归四逆加吴茱萸生姜汤	五六	大黄黄连泻心汤	六九
乌梅丸	五七	茵陈蒿汤	七〇
烧裈散	五八	猪肤汤	七一
白虎汤	五九	温剂	
白虎加人参汤	六一	四逆汤	七三
竹叶石膏汤	六二	通脉四逆汤	七四
葛根黄芩黄连汤	六四	茯苓四逆汤	七六
白通汤	七七		

白通加猪胆汁汤	七八	真武汤	九五
附子汤	七九	桃花汤	九八
术附汤	八一	人参四逆汤	九九
桂枝附子汤	八二	通脉四逆加猪胆汁汤	
甘草附子汤	八三		
桂枝去芍药加附子汤	八四		
甘草干姜汤	八六	汗剂	
干姜附子汤	八七	麻黄汤	一〇一
理中圆 及汤	八八	麻黄杏仁甘草石膏汤	一〇二
桂枝人参汤	九一		
吴茱萸汤	九三	麻黄附子甘草汤	一〇五
麻黄附子细辛汤	一〇六		

麻黃升麻湯	一〇七	梔子甘草豉湯	一二五
麻黃連轺赤小豆湯	一〇九	梔子生姜豉湯	一二五
大青龍湯	一一一	梔子厚朴湯	一二六
小青龍湯	一一三	瓜蒂散	一二七
桂枝麻黃各半湯	一一六	下劑	
桂枝二麻黃一湯	一一七	小承氣湯	一二九
桂枝二越婢一湯	一一八	大承氣湯	一三〇
葛根湯	一一九	調胃承氣湯	一三三
葛根加半夏湯	一二一		
吐劑			
梔子豉湯	一二三		
大陷胸湯	一三八		

大陷胸丸	一四一	猪苓汤	一五七
大柴胡汤	一四二	十枣汤	一五八
柴胡加大黄汤	一四三	牡蛎泽泻散	一六〇
桂枝加大黄汤	一四五	密煎导法	一六一
枳实栀子豉汤	一四六	猪胆导法	一六一
四逆散	一四七		
白散	一五〇		
麻仁丸	一五一		
抵当汤	一五二		
抵当丸	一五四		
五苓散	一五五		

張仲景百十三方王子接少選桂枝朴杏湯多入條芩
人參湯柴胡蠶蠅湯二方缺論餘對方註參看更屬明晰
和劑

桂枝湯

論曰。表受邪必從表驅出之為便。衛為陽分。風為陽邪。桂為陽藥。故風勝者以之為君。辛以平之也。取桂枝本乎天者親上也。然陽盛者熱自發。陰弱者汗自出。辛陰之僅弱。未曾受邪。故以芍藥一味堅之。東垣所謂桂枝湯為陰經榮藥。正言其和衛氣使陰氣不

泄之功也。若發汗過多。又手冒心心下悸。此營氣已動。幾於無陽而陰獨矣。又何堪以芍藥之酸寒。堅其凜冽之勢。故竟以桂枝甘草一味固表緩中。若但誤下而脉促胸滿。此陰邪入腹而表未清。故於桂枝全湯單去芍藥。蓋陰邪不宜芍藥。且恐其復助陰邪下入腹中也。至於傷寒脉浮脚攣。誤攻其表而厥者。以溫藥令其厥愈。足溫之後。隨與芍藥甘草湯以伸其脚。芍藥得甘草能和其中也。觀其出入。則桂枝湯之所以用芍藥可知矣。若陽脉濇陰脉弦法中腹當急

痛而用小建中湯。即以芍藥為君。桂枝等佐之。因表虛裡虛不同。而迭為主用。則仲景之桂枝湯。但取解肌散表。而不欲動營之意。不更躍然哉。若薑東之用。不獨發散。專行脾中之津液。而和其營衛也。有疑芍藥為赤芍者。非也。歇熱稀粥。乘內未受邪。扶其中氣。以助藥力也。

內經曰。辛甘發散為陽。此湯所以發散風邪。風淫所勝。平以辛。佐以苦甘。是以桂枝為主。甘東生薑為佐使也。

桂枝甘草湯

論曰。陽本受氣于胸中。發汗過多。陽氣太泄。則胸中陽氣不足。故心手冒心然。不說到陰血上。方用桂枝甘草。固表緩中。亦非養血也。彼藏結證。則云脇下素有痞積。故藏結無陽。彼太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱。則曰此無陽也。今發汗過多。而心手冒心。心下悸。陽微故也。不曰無陽者。彼多熱邪。此則單虛。彼以見燥而無陽。此則汗大洩而陽弱也。故但以桂甘扶其陽耳。