

彝
彝

药
药

志
志



YI YAO ZHI

彝药志

云南省楚雄彝族自治州卫生局药检所编

四川民族出版社

一九八二年·成都

彝 药 志

四川民族出版社出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷
开本850×1168毫米1/32 印张8.75 插页2 字数184千
1983年9月第一版 1983年9月第一次印刷
印数：1~2,000 册

书号：M14140·5 (平装本) 定价：1.33 元

前　　言

彝族是我国人口较多的兄弟民族之一，分布在云南、贵州、四川、广西四省区，有五百四十多万人。彝族人民，大部分聚居在四川省凉山彝族自治州和云南省楚雄彝族自治州境内。

楚雄州彝族同胞，聚居在哀牢山区和乌蒙山区。在这广阔的地区，具有多种地理位置和自然气候的特点，曾有“一山分四季，十里不同天”之说。从海拔五百五十六米的太和江河谷到四千二百二十一米的轿子山顶，蕴藏着丰富的动植矿物资源，其中就有许多名贵的药材。彝族人民在长期同自然和疾病的斗争中，积累了丰富的医药知识和治疗经验。

为了更好地发掘和继承民族医药遗产，根据中华人民共和国卫生部的有关文件和全国民族药会议的精神，楚雄彝族自治州从一九七八年开始，组织了一百余人的专业队伍，开展了广泛的民族医药普查工作。经过共同努力，州内曾先后发掘出内、外、妇、儿、生理、针灸等科的彝文医药书籍二十八本，其中一本明代嘉靖年间的彝文医药书

上，用质朴、明快的文笔，记述了五十六个病种、八十七个处方、三百二十四味药物。从这本书的内容来看，很多都是一病数方，一方数药，一药多用。它已经具有朴素的理、法、方、药辨证论治的医理。通过普查，全州还整理鉴定了彝族药标本一千零一十三种。由于彝族居住山区，彝族药物多是就地取材，治疗疾病，这正显示出了它独特的地方。

这本《彝药志》就是在普查的基础上编撰而成。发掘出来的彝族药物和彝医的单方、验方，曾经过自下而上的筛选鉴定和自上而下的调查追访。根据疗效良好，来源清楚，彝族常用和比较成熟的原则，选定了其中具有新的不同药用特点的一百零三种药物。

为了反映彝族医药的特点，书中药物的正名，使用的是彝药名称。“汉药名”的第一个名称系指通用学名，其间列举的别名，是为了便于区分同名异物、同物异名的品种。

“文献记载”，主要是根据《本草纲目》、《中药大辞典》、《全国中草药汇编》、《滇南本草》、《云南中草药》等书综合列出，为读者提供了比较全面的参考资料。“应用经验”，集中介绍了彝族不同的药用特点。“典型病例”，系直接追访核实的资料，为免过于繁琐，对有些病因、病史及病员的详细地址均从略。“化学成分”，除已有报导者外，均系我所初步预试的资料。“发掘经过”，简要介绍了一些重点方药的推荐过程。

本书的编写工作，得到了楚雄州科委的大力支持。四川省凉山彝族自治州，云南省路南、峨山、宁南、巍山等彝族自治县提供了很多宝贵的彝药参考资料。楚雄州卫生

学校参加了整理工作，楚雄州人民医院和楚雄州中医院对书稿提出了很好的意见。云南省药品检验所、云南省药物研究所、中国科学院昆明植物研究所作了具体指导并帮助进行了植物科属鉴定。我们在此一并表示衷心的感谢。

《彝药志》比较正确地总结了彝族医药普查的初步成果，在一定程度上如实地反映了彝医彝药的情况。它的出版，对发掘祖国的民族医药宝藏作出了新的贡献，它将在人民卫生保健事业中发挥出应有的作用。

云南省楚雄彝族自治州
卫生局药品检验所

1982年7月

目 录

| | |
|-------|----|
| 光阴史性 | 1 |
| 敲塞米鹿 | 4 |
| 泽兰女尼 | 7 |
| 肉已勃齐 | 10 |
| 色特咪鹿吉 | 13 |
| 咱都尖 | 16 |
| 季敲诗 | 19 |
| 痴枢得 | 22 |
| 吴乌模 | 24 |
| 伯苗紅 | 27 |
| 紫柏 | 29 |
| 舍利次 | 32 |
| 色依哩 | 34 |
| 事羧 | 36 |
| 则娃白 | 38 |
| 哪代姆 | 41 |
| 鸡妈白 | 43 |

| | |
|-------|-----|
| 慈阿白 | 45 |
| 果上叶 | 47 |
| 阿的利诗 | 49 |
| 松漏争 | 51 |
| 郁蔬 | 54 |
| 丕妹 | 56 |
| 借麦凶 | 59 |
| 资糯区 | 62 |
| 娃梯格来母 | 65 |
| 苦处喜 | 67 |
| 补鲁威 | 70 |
| 买黑熬 | 73 |
| 法罗喜 | 76 |
| 利鲁吐 | 78 |
| 区奔精 | 80 |
| 汝无糯鸡 | 82 |
| 阿努其它彪 | 84 |
| 诺培挪茨 | 87 |
| 苤不啰 | 90 |
| 二可依卡 | 92 |
| 米太勒 | 94 |
| 若路娃 | 96 |
| 思诺都 | 98 |
| 处徐 | 101 |
| 罗娃 | 104 |

| | |
|-------|-----|
| 娃碌塞 | 106 |
| 塔路娃 | 109 |
| 被嘎 | 112 |
| 米碌塞 | 114 |
| 丕米里 | 116 |
| 罗高 | 118 |
| 麦诺 | 120 |
| 阿奴得娘 | 123 |
| 蛇卡得 | 125 |
| 嘿柏弄什 | 127 |
| 金妮 | 130 |
| 你么慌是 | 132 |
| 飞都鲁列耳 | 134 |
| 苯之多七 | 136 |
| 啊的吗嘎 | 139 |
| 摆衣奇弱 | 141 |
| 尾们 | 143 |
| 娘接波哩 | 145 |
| 啰多 | 147 |
| 賒啰姐 | 149 |
| 是彪子 | 152 |
| 们依是 | 154 |
| 丕邹 | 157 |
| 敏的胸 | 160 |
| 咀妮 | 163 |

| | |
|--------|-----|
| 施伍白 | 165 |
| 白药资 | 168 |
| 包其络赛 | 170 |
| 理娃资姓 | 173 |
| 乌给女 | 175 |
| 寒诺那此 | 177 |
| 舍维隆 | 179 |
| 六鸡苦七 | 182 |
| 海腮奶 | 184 |
| 娘格尼帕 | 186 |
| 表依图乌鲁诺 | 188 |
| 瓦资莫瓷 | 191 |
| 卡鲁脚 | 194 |
| 含糯那瓷 | 196 |
| 白衣背定 | 199 |
| 细那基 | 201 |
| 若鼻麻热诺起 | 204 |
| 诺肺莫力气 | 207 |
| 自直多 | 210 |
| 吸吃基 | 212 |
| 格堵嘎多 | 216 |
| 月乌鸿 | 219 |
| 乌诺鸿 | 222 |
| 腰女卑 | 224 |
| 阿罗把罗基 | 226 |

| | |
|-------------------|-----|
| 大木比替力 | 228 |
| 衣枝潜基 | 230 |
| 磨卖施 | 232 |
| 鱼屋利 | 234 |
| 屋波诺 | 236 |
| 迷吃是 | 238 |
| 我迷肚 | 240 |
| 格多諾起 | 242 |
| 阿齐那 | 245 |
| 石刀 | 248 |
| 夹刀罗莫格 | 251 |
| | |
| 索引一 藝藥名（按音譯筆畫排列） | 252 |
| 索引二 漢藥名（按筆畫排列） | 255 |
| 索引三 拉丁學名（按字母順序排列） | 258 |

彝药名：光阴史性

汉药名：褶叶萱草、芦葱、漏芦、小百部、光阴草、凤尾一枝蒿。

文献记载：养血补虚，清热，利尿消肿，凉血止血。治经少、贫血、胎动不安、乳结红肿硬痛、痈疮、水肿、小便不利、血症等。

应用经验：性平，味甘无毒。滋阴清热，润肺止咳。治阴虚咳嗽。药用根，夏秋季采挖。生用：洗净切片，晒干即可。熟用：切片后以三分之二的药片加三分之一的糯米同蒸，令熟，取出阴干，用时可将糯米一齐入药，能增强滋阴润肺之力。

1. 阴虚咳嗽轻者，本品生用15~30克，水煎服。
2. 阴虚咳嗽重者，用本品熟的30克 沙参20克 麦冬15克 天冬15克 五味10克 玉竹10克 甘草5克，水煎服。一日一剂，一剂三煎。

典型病例：

1. 尹××，男，66岁，永仁县维的公社人。咳嗽，烦躁难眠，盗汗，按上述第二方，服四剂痊愈。
2. 起××，男，29岁，永仁县维的公社人。夜咳，失眠盗汗，口苦咽干，按上述第二方，服三剂痊愈。

来源：为百合科萱草属植物 *plicata* 的块根。

Hemerocallis plicata Stapf.

识别特征：多年生草本，高30~60厘米。须根膨大，成纺锤状，上被浅横纹。叶基生成丛，条状披针形，从中脉稍向内叠，长30~60厘米，宽2厘米左右，全缘。花茎从叶腋间抽出，茎顶分枝开花5~9朵，呈单歧聚伞花序，花多黄色、橙黄色、稀白色。蒴果三角状，种子黑色光泽。多生于阴凉潮湿的坡地。

化学成分：本种块根含 γ -羟基谷氨酸、赖氨酸、琥珀酸、 β -谷甾醇。曾有 γ -羟基蒽醌类的报道。

发掘经过：此药为彝族民间常用药，因其叶像光阴柳树样，故名光阴草。永仁县彝族老医生刘李初推荐。他用于临床40多年，在润肺止咳方面，疗效很好。



图一 光阴史性
Hemerocallis plicata Stapf.
(百合科萱草属)

彝药名：敲塞米鹿

汉药名：夜蒿花、山合欢、合欢花、明目花。

文献记载：舒筋活络，止痛，安神解郁。治风湿关节炎、骨折、跌打劳伤、心神不安、失眠、肺脓疡、痈疖肿痛。

应用经验：性平，味苦涩无毒。清肝明目，退翳。治视物昏花。

药用花，三月采集。每次用本品25克～30克，蒸鸡蛋或鸡肝服，也可先熏双目后再服。

典型病例：

1. 刘××，女，50岁，永仁县维的公社人。视物模糊，按上方连服三剂后，视物清楚，能穿针缝补。

2. 戴××，女，36岁，永仁县永定镇缝纫社工人，因视物昏花而影响工作，按上方治疗十五次，恢复正常工作。

来源：为豆科合欢属植物山合欢的花。


Albizzia kalkora(Roxb.) Prain.

识别特征：落叶乔木，高600～1000厘米。叶互生，二回偶数羽状复叶，羽片2～3对；小叶5～14对，近矩形，长且宽，长达4.5厘米，宽1.8厘米，先端有短尖，下面苍白色，柄短。花白色或黄色。荚果，长达17厘米，深棕色，有种子4～12粒。多生于房前屋后、田边地角、山坡林缘等地。本种应与同科同属 *Albizzia julibrissin* Durazz 合欢花相区别。区别点见下表：

| | 山 合 欢 | 合 欢 花 |
|---|---|--|
| 叶 | 羽片 2 ~ 3 对 每片小叶 5 — 14 对，小叶近矩形 小叶长 4.5 厘米，宽 1.8 厘米，有柄 | 羽片 4 ~ 16 对 每片小叶 10 ~ 30 对，小叶镰状长圆形 小叶长 6 ~ 12 毫米，宽 2 ~ 8 毫米，无柄 |
| 花 | 先黄后白（黄或白色） | 淡红色 |
| 果 | 长 17 厘米 | 长 9 ~ 15 厘米 |

化学成分：本种花含酚类鞣质、甙、多糖、甾体皂甙等化合物。

发掘经过：民间流传沿用至今，效果一直很好。永仁县刘李初老医生推荐。



图二 峨眉米鹿
Albizia kalkora (Roxb.) Prain.
(豆科合欢属)