

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明 夏甫編輯
明 古吳 薛 己 立齋補註
鄞縣 曹赤電 炳章 圈校

卷十四

妊娠中風方論第一

論曰。四時八方之氣。爲風也。常以冬至之日候之。若從其鄉來者。長養萬物。否則名爲虛邪。賊害萬物。體虛中之。客於皮膚。則頑痺不仁。入於筋脈。則攣急喎僻。若兼濕熱。則弛縱痿軟。若入臟腑。氣隨所傷。經絡而爲諸病。妊娠中之。必須早治。庶免墮胎之患。

愚按。病機機要云。風本爲熱。熱勝則風動。宜以靜勝其躁。是亦養血也。治法須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其榮。雖有汗下之形。而有中臟中腑。

之分。中腑者。多着四肢。則脈浮惡寒。拘急不仁。中臟者。多着九竅。則唇緩失音。耳聾鼻塞。目瞽便秘。中腑者宜汗之。中臟者宜下之。表裏已和。宜治在經。當以大藥養之。此中風之要法。妊婦患之。亦當以此法治之。而佐以安胎之藥。仍參三卷首論主治。

防風散 治妊娠中風。卒倒口噤肢強。或痰氣上升。

防風

桑寄生

葛根各五

家菊花

細辛

防己

秦艽

羚羊角鎊

當歸

桂心

茯神

甘草各三分

右水煎。入竹瀝半合服。

白朮酒 治妊娠中風。口噤不語。

白朮

半兩

獨活一兩

黑豆一合

右酒煎。分四服。灌之。得汗即愈。

補遺。治妊娠中風。排風湯。續命湯。參蘇湯。加羌活。風引湯。皆可選用。方見第三卷中風類

妊娠風瘧方論第二

論曰。妊娠體虛受風。而傷足太陽經。遇風寒相搏。則口噤背強。甚則腰反張。名之曰瘕。須臾自醒。良久復作。又名子癰。子冒。當審察其因而治之。
愚按。前症若心肝風熱。用鈎藤湯。肝脾血虛。加味道遙散。肝脾鬱怒。加味歸脾湯。氣逆痰滯。紫蘇飲。肝火風熱。鈎藤散。脾虛痰滯。二陳薑汁竹瀝。若兼症相雜。當參照子煩門。

附治驗

一妊婦出汗口噤。腰背反張。時作時止。此怒動肝火也。用加味道遙散漸愈。又用鈎藤散而止。更以四君加鈎藤山梔柴胡而安。
一妊婦因怒。忽仆地。良久而甦。吐痰發搐。口噤項強。用羚羊角散漸愈。更用鈎藤散始痊。又用歸脾湯而安。

羚羊角散 治妊娠冒悶。角弓反張。名曰子癰風瘕。

羚羊角 鑊

獨活

酸棗仁 炒

五加皮

薏苡仁 炒

防風

當歸 酒浸

川芎

杏仁 尖皮

茯神 去木各五分

木香

甘草 炙各二分

右薑水煎。

附方

鈎藤湯

方見十二卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

方見二十四卷第四論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

鈎藤散

方見四卷第四論

二陳湯

方見二十五卷第五論

四君子湯

方見二十四卷第六論

妊娠瘕癥方論第二新附

竊謂瘕者。筋脈急而縮也。癥者。筋脈緩而伸也。一縮一伸。手足相引。搖擗不已。大抵與嬰孩發搐相似。謂之瘕癥也。此症多屬風。蓋風主搖動。駱龍吉云。心主脈。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火相熾。則爲瘕癥也。治法若因風熱。用鈎藤湯。加柴胡。山梔。黃芩。白朮。以平肝木。降心火。養氣血。若風痰上湧。加竹瀝。南星。半夏。若風邪急搐。加全蠍。僵蠶。虧損氣血。用八珍湯。加鈎藤。山梔爲主。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠者。肝氣絕也。皆不治。

附治驗方藥

一妊婦四肢不能伸。服祛風燥血之劑。遺尿痰甚。四肢抽搐。余謂肝火血燥。用八珍湯。加炒黑黃芩爲主。佐以鉤藤湯而安。後因怒。前症復作。小便下血。寒熱少寐。飲食少思。用鉤藤散。加山梔、柴胡而血止。用加味逍遙散。寒熱退而得寐。用六君子湯。加芍藥、鉤藤。飲食進而漸安。

八珍湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

妊鬼胎方論第四

夫人臟腑調和。則血氣充實。精神健旺。若榮衛虛損。精神衰弱。妖魅之精乘之。亦如懷妊之狀。故曰鬼胎也。

愚按前症因七情脾肺虧損。氣血虛弱。行失常道。衝任乖違而致之者。乃元氣不足。病氣有餘也。若見經候不調。就行調補。庶無是症。治法以補元氣爲主。而佐以雄黃丸之類。行散之。若脾經鬱結氣逆者。用加味歸脾湯調補之。若脾虛血不足者。用六君、芎歸培養之。肝火血耗者。用加味逍遙散。滋抑之。肝脾鬱怒者。用加味歸脾逍遙二藥兼服。腎肝虛弱者。用六味地黃丸。

附治驗

一婦人經閉八月。肚腹漸大。面色或青或黃。用胎症之藥不應。余診視之曰。面青脈濡。寒熱往來。肝經血病也。面黃腹大。少食體倦。脾經血病也。此鬱怒傷脾。肝之症。非胎也。不信。仍用治胎散之類。不驗。余用加味歸脾逍遙二藥。各二十餘劑。諸症稍愈。彼欲速效。別服通經丸。一服下血。昏憤自汗惡寒。手足俱冷。嘔吐不食。余用人參炮薑二劑。漸愈。又用十全大補湯五十餘劑而安。

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃

鬼白去毛

莽草

丹砂細研

巴豆去皮油

獾肝炙黃各半兩

蜥蜴炙黃一枚

蜈蚣炙黃一條

右爲末。蜜丸。桐子大。每服二丸。空心溫酒下。日二服。或下如蛇蟲之類。其病乃除。

治鬼胎。及血氣痛不可忍。

斑蝥去頭翅足製 延胡索妙分

右爲末。以溫酒調下半錢。以下穢物爲度。

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

十全大補湯三方見二十四卷第四十

六君子湯

方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠傷寒方論第五

夫時令嚴寒。體虛所傷。卽成傷寒。輕者洒淅惡寒。翕翕發熱。微咳鼻塞。數日而愈。重者頭疼體痛。寒熱交作。久而不愈者。多致傷胎也。

愚按前症爲害匪輕。當審經絡表裏而治之。不可輕忽。

加減四物湯 治妊婦腹痛。或月事不調。胎氣不安。產後血塊。或亡血過多。或惡露不下。

當歸

川芎

白芍藥炒

熟地黃各一兩

右每服四五錢。水煎。日二三服。下血。加艾葉、阿膠。虛熱口乾。加括蕁根、麥門冬。兼血腹痛。加當歸、芍藥。血崩血淋。加熟地、蒲黃。因熱生風。加川芎、柴胡。頭昏項強。加柴胡、黃芩。大便秘結。加大黃、桃仁。嘔吐惡心。加白朮、人參。虛煩不眠。加竹

葉、人參、煩躁大渴。加知母、石膏。水停吐逆。加猪苓、茯苓。虛煩傷寒。加人參、柴胡、防風。

阿膠散 治時氣。先服此以安胎。却以主藥間服。

阿膠 炙

白朮 炒

桑寄生

人參

白茯苓

右爲末。等分。每服一錢。用糯米飲調下。日三服。

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱。肢節煩疼。

石膏 一分

前胡

甜竹茹

梔子 炒

黃芩 炒

大青

知母 各五錢

右用葱白水煎服。

蘇木湯 治傷寒時行。洒淅寒振。或兼噦者。

赤芍藥

橘紅

黃芩 炒

黃連

甘草

蘇木 各五

右用水煎服。汗出卽瘥。如胎不安。兼服阿膠湯。

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼。嘿嘿不食。脇痛嘔痰。及產後傷風。熱入胞宮。寒熱如瘧。或經水適來。勞復熱不解散。

柴胡二錢

黃芩炒

人參

甘草各一錢

用水煎服。

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒。身熱拘急口乾。

柴胡二錢

甘草一錢

石膏三錢

用薑水煎服。氣虛加人參。

枳實散 治傷寒四日至六日。腹脹少食。腰疼體重。

枳實炒三錢

陳皮一錢

麥門冬半錢

用生薑葱白水煎服。

旋覆花湯 治傷寒頭目旋疼。壯熱心躁。

旋覆花

赤芍藥

甘草各五錢

石膏各一錢

白朮

人參

前胡
麻黃去根

黃芩各三錢

右用薑水煎服。

麥門冬湯 治傷寒壯熱。嘔逆頭疼。胎氣不安。

人參

石膏

各一錢半

前胡

黃芩

各五分

麥門冬

葛根

各一錢

右薑棗竹茹一分。用水煎服。

梔子大青湯 治發斑變黑。尿便血。

升麻

梔子

各一錢

大青

杏仁

黃芩

各三錢

右用葱白三寸。水煎服。

白朮湯 治傷寒煩熱。頭痛胎動。或時吐逆不食。

白朮

橘紅

麥門冬

人參

前胡

赤茯苓

川芎

甘草

半夏

各五分

右用生薑竹茹一分。水煎服。

夏方白朮散 治傷寒。

白朮

黃芩二錢各

右用薑棗水煎服。若四肢厥逆陰症也。不可用。

芎藭散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶。

紫蘇葉

川芎

白朮

白芍藥

麥門冬去心

陳皮

乾葛各五分

甘草炙三分

右用生薑葱白水煎。

參蘇飲去木

治證同前方見六卷第十二論

妊娠時氣方論第六

論曰。四季之間。非其時而有其氣。謂春寒夏冷。秋熱冬暖之不正也。所感者不拘長少。其症相類。故云時氣。妊娠患之。重者多致傷胎。

愚按。前症與前傷寒互相主治。

秦艽散 治時氣五六日不得汗。口乾飲水。狂言嘔逆。

秦 朮

柴 胡各五

石 膏一錢

犀 角鎰

赤 茯苓

前 胡

甘 草

葛 根

升 麻

黃 芩各四

右用淡竹茹一分水煎服。

葛根飲子 治時氣煩熱口乾頭痛。

麻 黃去節

乾 葛各半

石 膏一兩

豉一合

白 米半合

梔 子二十

葱 白二莖

右用水煎分三服汗出爲效。

消熱飲子 治時氣六七日大小便不利。

芒 硝一兩

葵 子二兩

右如前煎服以利爲效。芒硝卽朴硝

人參敗毒散方見二十四卷第十論

妊娠熱病方論第七

冬時觸冒嚴寒卽病。爲傷寒。藏於肌骨。夏至發爲暑病。卽熱症也。妊娠患之。多致墮胎。熱病與中暑相似。但熱病者脈實。中暑者脈虛。治當審察。不可概施。愚按此症與前後三症同治。

治妊娠熱病頭痛嘔吐煩悶。

人參

參無一方

竹茹

葛根各一

蘆根二兩

知母

母三兩

麥門冬兩半

右每服四錢。連根葱白三寸。水煎。

梔子仁飲。治熱病發斑黑色。小便如血。氣喘急。胎欲落。

梔子

升麻

生地黄

石膏各二

黃芩

大青各一

右每服半兩。葱白七寸。豉四十九粒。水煎。

大黃飲。治熱病六七日。大小便秘澀。

大黃

石膏各一

知母

前胡

赤茯苓各三

梔子

甘草

黃芩各半

右每服五錢。生地一分。煎服。

又方。伏龍肝細研。每服一錢。水調下。外用水調塗臍下。

又方。葛根煮汁時服一盞。

補遺蘆根湯 治熱病頭疼。心煩嘔吐。

知母 四兩 青竹茹 三兩

右每服五錢。生蘆根一握。糯米一撮。水煎。

梔子五物湯 治妊婦傷寒。壯熱頭痛。

梔子 前胡

知母 各二兩

黃芩 一兩

石膏 四兩

右每服五錢。用水煎服。

升麻六物湯 治傷寒斑黑瀉血。

升麻 梔子 各二兩

大青

杏仁

黃芩

右每服五錢。蔥頭水煎。

妊娠傷寒熱病防損胎方論第八

論曰。非節之氣。傷於妊婦。熱毒侵損胞胎。若不早治。多致墮胎漏血。則子母之命。亦不能全矣。

愚按前症當分察六經爲主。而參於前後方論。

治妊娠傷寒身痛壯熱。

葱白切一

前胡

葛根

石膏各十

青黛六分

升麻八分

梔子十二

右用水煎。分三服。

治妊娠傷寒大小便秘結。

前胡十分

大黃

石膏各二分

梔子仁十枚

知母

黃芩

茯苓

生薑各八

右用水煎。分三服。

治妊娠傷寒發斑忽黑。小便如血。胎欲落。

梔子

升

麻各四

青黛二兩

石膏八兩

黃芩三兩

葱白切一

生地黄二十

右用水煎分三服忌熱物。

又用井中泥塗心下乾則易。二方出本事再錄有效

補遺治妊娠熱病先以白朮散安胎。方見前

妊娠熱病胎死腹中方論第九

論曰。熱病以致胎死不能出者。但服黑神散。胎自下矣。

愚按陳無擇先生曰。前症當視產母。若面赤舌青。知其子死。面青舌赤。知母死。子生。脣青吐沫。子母俱死。若雙胎。或一死一活。用黑神散。竊謂前症宜補助產母。使其胎自下。黑神散恐其太熱不宜輕用。果一胎已死者。用平胃散。朴硝。水銀下之。最為穩當。庶不錯傷生者。平胃散方見後

黑神散。又名烏金散。靈苑方名。肉桂散。

桂心

當歸

芍藥

甘草炙

乾

薑炒

生地黃各一兩

黑豆炒去皮

附

子炮去皮

右爲末。每服二錢。空心用溫酒調下。

補遺。胎死用紅花酒煮汁。飲二三碗。

又方。伏龍肝爲末。溫酒調下二錢。白湯亦可。

又方。朴硝末。童子小便和熱酒調下三錢。立出。

妊娠瘧疾方論第十

論曰。妊娠病瘧。乃夏傷於暑。客於皮膚。至秋而發。陽盛則熱。陰盛則寒。陰陽相離。寒熱俱作。其發晏者。由風邪客於風府。循膂而下。衛氣至一日一夜。當大會於風府。故發日晏。與早者。衛氣之行風府。日下一節。二十一日下至尾骶。二十二日入脊內。上注於俠衛之脈。其行九日。出缺盆。其氣既止。故發更早。其間日發者。風邪內搏五臟。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能日作也。妊娠而發。多傷於胎。愚按。前症因脾胃虛弱。飲食停滯。或外邪所感。或鬱怒傷脾。或暑邪所伏。審係飲食停滯。用六君子加桔梗。蒼朮。藿香。外邪多而飲食少。用藿香正氣散。外邪