

SPT

高等院校选用教材

非数学专业

高等数学系列教材

一元分析基础

(第二版)

湖南大学数学与计量经济学院 组编

黄立宏 戴斌祥 主编

科学出版社

高等院校选用教材(非数学专业)


高等数学系列教材

一元分析基础

(第二版)

湖南大学数学与计量经济学院 组编

黄立宏 戴斌祥 主编



科学出版社

内 容 简 介

本书是《高等数学系列教材》之一,内容包括集合论初步、一元函数微分学及其应用、无穷级数、一元函数积分学及其应用、常微分方程等.各节后配有适量习题,书末附有习题答案.

本书的结构和一些表述方法有别于以往的同类教材,如:常微分方程内容安排较以往同类教材靠前,有利于“大学物理”等有关课程的教学与学习;书中无穷级数内容被巧妙地分散在有关的章节中等.本书结构严谨、内容精练、条理清楚、重点突出、例题较多.

本书可作为各类高等院校“高等数学”课程的教材,也可作为工程技术及有关人员的自学用书或参考用书.

图书在版编目(CIP)数据

一元分析基础(第二版)/黄立宏,戴斌祥主编.-北京:科学出版社,2000

(高等院校选用教材(非数学专业))

ISBN 7-03-008784-4

I. 一… II. ①黄… ②戴… III. 数学分析-高等学校-教材 IV. O17

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第69254号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1998年11月第 一 版 开本:787×960 1/16

2000年10月第 二 版 印张:20 3/4

2000年10月第三次印刷 字数:384 000

印数:10 001—15 000

定价:25.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

前 言

我国国民经济和科学技术在 21 世纪的更大发展已成必然之势,培养各类高等专门人才的我国大学教育的改革也势在必行. 作为大学教育中重要一环的大学数学教育的改革应如何革故鼎新,以适应新的形势,这是广大数学教育工作者所面临的重大课题. 近年来,我校十分注重这方面的工作,组织了一大批教学经验丰富、又具创新精神的教师,进行教学和教材的改革研究.

高等数学是高等院校众多专业学生必修的重要基础理论课,它的设置是为培养各类高等专门人才服务的,因此我们编写的这套高等数学系列教材,在传授知识的同时,注意到通过各环节逐步培养学生具有抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和自学能力,还特别注意培养学生具有比较熟练的运算能力和综合运用所学知识去分析问题和解决问题的能力.

这套系列教材由《一元分析基础》、《代数与几何》、《多元分析基础》、《随机分析基础》和《数学实验》五册组成,它们在结构体系和内容选取方面,不同于以往的众多同类教材,它是按照培养跨世纪人才数学素质的要求编写的,渗透了不少现代数学的观点和内容,以开阔学生的眼界,启迪他们的思维. 这套教材中难免会有不妥之处,希望使用本教材的教师和学生提出宝贵意见.

这套系列教材由刘楚中任总主编,周叔子任总主审. 此册《一元分析基础》是在科学出版社于 1998 年 11 月出版的由黄立宏、戴斌祥主编,罗汉、梁勉、张勤勤、李丹衡、张诚坚和刘楚中参加编写的同名教材的基础上,经过两年的教学实践,广泛征求意见后重新修改而成的,其中部分章节进行了重新编写. 此次修改、编写除仍由黄立宏和戴斌祥任主编外,参加的人员还有:罗汉、刘楚中、刘先霞、李丹衡和彭亚新. 本教材中带 * 号的内容,可根据授课学时和教学对象进行取舍.

这套系列教材在编写过程中得到了湖南大学教务处的大力支持,在此表示衷心感谢.

湖南大学数学与计量经济学院组编

2000 年 7 月

《高等数学系列教材》

主 编 刘楚中

主 审 周叔子

《一元分析基础》

主 编	黄立宏	戴斌祥	
编 者	罗 汉	刘楚中	刘先霞
	李丹衡	彭亚新	

目 录

第一章 集合与函数	1
第一节 集合	1
一、逻辑量词和符号	1
二、集合的概念	1
三、集合的运算	3
习题 1-1	5
第二节 映射	6
一、映射的概念	6
二、映射的运算	7
三、集合的有限与无限	10
习题 1-2	13
第三节 函数	13
一、函数的概念	13
二、函数的代数运算	14
三、反函数	15
四、初等函数	15
五、函数的基本特性	19
六、双曲函数	21
习题 1-3	24
第二章 极限与连续	27
第一节 数列的极限	27
一、数列的概念	27
二、数列的性质	28
三、数列极限的定义	29
四、数列极限的性质	31
五、收敛准则	33
习题 2-1	35
第二节 函数的极限	35
一、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限	35
二、当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限	38
三、函数极限的性质	41
习题 2-2	44
第三节 无穷小量与无穷大量	44

一、无穷小量及其运算	44
二、无穷大量	47
习题 2-3	49
第四节 极限的运算法则	49
习题 2-4	54
第五节 夹逼定理、两个重要极限	55
一、夹逼定理	55
二、重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	56
三、重要极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	58
习题 2-5	60
第六节 无穷小量的比较	61
一、无穷小量比较的概念	61
二、关于等价无穷小的性质和定理	62
习题 2-6	64
第七节 函数的连续性	64
一、函数连续性的概念	64
二、函数的间断点	67
三、连续函数的运算及其基本性质	69
四、初等函数的连续性	73
习题 2-7	73
第八节 闭区间上连续函数的性质	74
习题 2-8	78
第九节 常数项级数的概念和性质	78
一、无穷级数的概念	78
二、级数收敛的必要条件	80
三、级数的基本性质	81
习题 2-9	82
第十节 常数项级数敛散性判别法	83
一、正项级数敛散性的判别法	83
二、交错级数及其敛散性判别法	88
三、任意项级数及其敛散性判别法	89
习题 2-10	91
第三章 导数与微分	93
第一节 导数的概念	93
一、导数概念的引入	93
二、导数的定义	94
三、导数的几何意义	97

四、可导与连续的关系	98
习题 3-1	99
第二节 求导法则	99
一、函数四则运算的求导法则	100
二、复合函数的求导法则(链导法则)	102
三、反函数的求导法则	104
四、基本导数公式	105
五、隐函数的求导法则	106
六、参数方程的求导法则	107
七、取对数求导法	108
习题 3-2	109
第三节 高阶导数	110
习题 3-3	114
第四节 微分及其运算	115
一、微分的概念	115
二、微分与导数的关系	116
三、微分的几何意义	116
四、微分的运算法则及高阶微分	117
习题 3-4	119
第五节 微分中值定理	119
一、罗尔中值定理	119
二、拉格朗日中值定理	120
三、柯西中值定理	123
四、泰勒中值定理	124
习题 3-5	128
第六节 幂级数	129
一、函数项级数	129
二、幂级数及其收敛性	130
三、函数展开成幂级数	135
习题 3-6	140
第四章 导数的应用	141
第一节 函数的单调性和曲线的凹凸性	141
一、函数的单调性	141
二、曲线的凹凸性	142
习题 4-1	146
第二节 函数的极值和最值	147
一、函数的极值	147
二、函数的最值	149

习题 4-2	152
第三节 函数图形的描绘	153
一、渐近线	153
二、函数图形的描绘	154
习题 4-3	157
第四节 罗必达法则	158
一、 $\frac{0}{0}$ 型不定式	158
二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式	160
习题 4-4	162
第五节 相关变化率、弧微分、曲率	163
一、相关变化率	163
二、弧微分	164
三、曲率	165
习题 4-5	169
第五章 积分	170
第一节 定积分的概念和性质	170
一、定积分的概念	170
二、定积分的性质	173
习题 5-1	177
第二节 定积分的基本定理	178
一、原函数与积分上限函数	178
二、微积分的基本公式	181
习题 5-2	182
第三节 原函数的求法与不定积分	183
一、不定积分的概念和性质	183
二、求不定积分的方法	186
习题 5-3	200
第四节 定积分的计算	201
一、换元法	202
二、分部积分法	204
三、部分分式法	206
习题 5-4	208
第五节 广义积分	209
一、无穷积分	209
二、瑕积分	211
* 三、广义积分的收敛原理	215
四、广义积分的柯西主值	216

习题 5-5	217
第六章 定积分的应用	219
第一节 建立定积分数学模型的微元法	219
第二节 平面图形的面积	220
一、直角坐标情形	220
二、极坐标情形	223
习题 6-2	225
第三节 平面曲线的弧长	225
习题 6-3	229
第四节 立体体积和旋转体侧面积	230
一、平行截面面积为已知的立体体积	230
二、旋转体的体积	231
三、旋转体的侧面积	232
习题 6-4	233
第五节 功和静压力	234
一、变力做功	234
二、液体静压力	236
习题 6-5	237
第六节 幂级数的和	238
习题 6-6	241
第七节 其它方面的应用	241
一、质心	241
二、连续函数的平均值	243
习题 6-7	246
第七章 常微分方程	248
第一节 微分方程的基本概念	248
一、微分方程及其模型	248
二、微分方程的基本概念	250
习题 7-1	253
第二节 一阶微分方程	253
一、变量可分离方程	253
二、齐次方程	255
三、可化为齐次方程的方程	257
四、一阶线性微分方程	259
五、伯努利方程	261
习题 7-2	263
第三节 可降阶的高阶微分方程	264
一、 $y^{(n)}=f(x)$ 型的微分方程	264

二、 $y''=f(x,y')$ 型的微分方程	265
三、 $y''=f(y,y')$ 型的微分方程	266
习题 7-3	268
第四节 高阶线性微分方程	269
一、线性微分方程解的结构	269
二、常系数齐次线性微分方程	273
三、常系数非齐次线性微分方程	275
四、欧拉方程	279
习题 7-4	280
* 第五节 幂级数解法与常系数线性微分方程组	282
一、微分方程的幂级数解法	282
二、常系数线性微分方程组解法举例	285
习题 7-5	287
* 第六节 微分方程的差分方法	288
一、初值问题数值解的基本概念	288
二、欧拉方法	289
三、欧拉方法的变形和改进	290
四、龙格-库塔方法	291
习题 7-6	293
附录 积分表	295
习题答案	305

第一章 集合与函数

第一节 集 合

一、逻辑量词和符号

为了书写方便,我们介绍一些逻辑量词和符号.

符号“ $\forall$ ”称为全称量词,表示“对于任意的”,“对于所有的”或“对于每一个”,它是 Any 字头 A 的倒写.

符号“ $\exists$ ”称为存在量词,表示“存在”,它是 Exist 字头 E 的反写.

例如,“对于任意的 x ,都存在 y ,使得 $x+y=1$ ”可以写成

$$\forall x, \exists y, \text{使得 } x+y=1.$$

符号“ $\Rightarrow$ ”称为蕴涵词. 设 S_1, S_2 是两个陈述句,它们可以指命题,也可以指条件. $S_1 \Rightarrow S_2$ 表示“若命题 S_1 成立,则命题 S_2 也成立”,这时 S_1 是 S_2 的充分条件,或者 S_2 是 S_1 的必要条件.

符号“ $\Leftrightarrow$ ”称为双蕴涵词. $S_1 \Leftrightarrow S_2$ 表示“当且仅当 S_1 成立时 S_2 成立”或“ S_1 与 S_2 等价”,这时 S_1 与 S_2 互为充分且必要的条件.

例如,“若 $x>0, y>0$,则 $xy>0$ ”可记为

$$x>0, y>0 \Rightarrow xy>0;$$

“ $a^2+b^2=0$ 的充要条件是 $a=b=0$ ”可记为

$$a^2+b^2=0 \Leftrightarrow a=b=0.$$

二、集合的概念

自从康托(Cantor)在 19 世纪末创立集合论以来,集合论的概念和方法已渗透到数学的各个分支,成为数学的基础和语言. 所谓集合(简称集)是指具有某种特定属性的具体或抽象的事物所构成的一个整体,而其中的每个事物称为该集合的元素(简称元).

我们常用大写字母 A, B, X, Y 等表示集,小写字母 a, b, x, y 等表示元. 设 A 是一个集,若某一事物 a 是集 A 的元,则说 a 属于 A ,记为 $a \in A$;若 a 不是 A 的元,则说 a 不属于 A ,记为 $a \notin A$ (或 $a \notin A$).

例如,所有英文字母构成字母集,所有自然数的全体构成数集,平面上第一象限里所有点的全体构成点集,等等. 再如平面解析几何中的直线、曲线等几何图形也是由平面上满足一定条件的点所构成的点集.

集合通常有两种表示方法. 一是列举法, 列举出集合中的全部元素, 例如 $A = \{2, 4, 6, 8\}$; 另一是描述法, 给出该集中元素所具有的性质, 例如 $B = \{x | x^2 - 1 \geq 0\}$, $C = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$.

设集 A, B , 若 $\forall a \in A \Rightarrow a \in B$, 则称 A 是 B 的子集, 记为 $A \subset B$ (读作 A 包含于 B) 或记为 $B \supset A$ (读作 B 包含 A), 这时 A 的所有元都是 B 的元.

子集具有下列性质:

$$(1) A \subset A;$$

$$(2) A \subset B, B \subset C \Rightarrow A \subset C.$$

为研究问题的需要, 引入一个不含任何元的集, 称为空集, 记为 $\emptyset$, 并规定 $\emptyset$ 是任何集之子集, 即 $\forall A, \emptyset \subset A$.

若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称 A 与 B 相等, 记为 $A = B$, 这时 A 与 B 含有完全相同的元, 实际上是同一集. 例如

$$A = \{x | x^2 - 1 = 0\},$$

$$B = \{-1, 1\},$$

有 $A = B$.

若 $A \subset B$ 但 $A \neq B$, 则说 A 是 B 的真子集.

全体自然数, 整数, 有理数, 实数和复数分别构成的集依次记为 N, Z, Q, R, C . 显然有

$$N \subset Z \subset Q \subset R \subset C.$$

设 $a, b \in R$ 且 $a < b$, 数集

$$\{x | a < x < b, x \in R\}$$

称为开区间, 记为 (a, b) ; 数集

$$\{x | a \leq x \leq b, x \in R\}$$

称为闭区间, 记为 $[a, b]$; 类似地记

$$[a, b) = \{x | a \leq x < b, x \in R\};$$

$$(a, b] = \{x | a < x \leq b, x \in R\}.$$

实数集 R 亦可记为区间 $(-\infty, +\infty)$, 而

$$(a, +\infty) = \{x | x > a, x \in R\};$$

$$(-\infty, a] = \{x | x \leq a, x \in R\}$$

等.

在今后的研究中, 我们常常要考虑一个点附近的情况. 例如研究函数不仅仅是讨论它在一点的取值, 更主要地是要研究它在这一点附近的变化. 一个点的附近就是“邻域”的概念.

设 $x_0 \in R$, 对 $\delta \in (0, +\infty)$, 数集

$$\{x | |x - x_0| < \delta, x \in R\}$$

称为点 x_0 的 δ 邻域, 记为 $U(x_0, \delta)$, x_0 称为该邻域的中心, δ 称为该邻域的半径. 显然 $U(x_0, \delta)$ 便是以 x_0 为中心对称的区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 若只考虑 x_0 附近但不包括点 x_0 自身, 即 $U(x_0, \delta) - \{x_0\}$, 称之为点 x_0 的去心 δ 邻域, 记为 $\dot{U}(x_0, \delta)$. 当我们不强调邻域的半径时, 常将邻域和去心邻域分别简记为 $U(x_0)$ 和 $\dot{U}(x_0)$.

另外, $\{x | x_0 - \delta < x \leq x_0, x \in R\}$ 称为 x_0 的左邻域, 记为 $U(x_0^-, \delta)$; $\{x | x_0 \leq x < x_0 + \delta, x \in R\}$ 称为 x_0 的右邻域, 记为 $U(x_0^+, \delta)$. 不强调邻域的半径时, 常将左、右邻域分别简记为 $U(x_0^-)$ 和 $U(x_0^+)$. 相应地也有去心左、右邻域的概念.

研究一个点的附近, 还要引进“聚点”的概念.

对点 $x_0 \in R$, 集 $A \subset R$, 若 $\forall \delta > 0, \exists x \in A$ 使 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 则称 x_0 为 A 的聚点.

A 的聚点可能属于 A , 也可能不属于 A . 显然聚点的任一邻域内都含有 A 的无穷多个点.

例如, 区间 $(0, 1)$ 内的任一点都是该区间的一个聚点; $x=0$ 是该区间的一个聚点; $x=1$ 也是该区间的一个聚点.

$x=2$ 是集 $[1, 2) \cup (2, 3]$ 的一个聚点.

$x=0$ 是集 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$ 的一个聚点.

三、集合的运算

1. 并集

给定集 A, B , 称集合

$$\{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

为 A 与 B 的并集, 记为 $A \cup B$. 显然有

$$A \cup \emptyset = A; A \cup A = A;$$

$$A \cup B = B \cup A; (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

2. 交集

给定集 A, B , 称集合

$$\{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

为 A 与 B 的交集, 记为 $A \cap B$.

显然, $A \cap \emptyset = \emptyset; A \cap A = A;$

$$A \cap B = B \cap A; (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C);$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

$$A \subset B \Rightarrow A \cap B = A.$$

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是一组集, 可以定义这组集的并集

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

和这组集的交集

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

3. 差集

给定集 A, B , 称集合

$$\{x | x \in A \text{ 但 } x \notin B\}$$

为 A 与 B 的差集, 记为 $A-B$.

显然, $A-A=\emptyset$; $A-\emptyset=A$;

$$\emptyset-A=\emptyset; A-B=A-(A \cap B);$$

$$(A-B) \cap C = (A \cap C) - (B \cap C).$$

在具体问题中, 往往把讨论限制在某一固定的集 X 的范围内, 讨论的内容只涉及到它的元素或子集等, 这时常常称 X 为全集. 全集是一个相对的概念, 所研究的问题不同, 全集也不同. 例如讨论自然数的加法运算, 自然数集 N 可以被认为全集, 但当讨论自然数的加减乘除运算时, 就要以有理数集 Q 为全集, 而 N 只是 Q 的子集.

相对于全集 X , 若 $A \subset X$, 则称 $X-A$ 为 A 的余集或补集, 记为 A^c .

用文(Venn)图能够较直观地表达并集、交集、差集和余集的概念(见图 1-1 的阴影部分).




图 1-1

4. 直积

给定非空集 A, B , 称 A, B 的元所构成的有序对的集合

$$\{(x, y) | x \in A, y \in B\}$$

为 A 与 B 的直积, 亦称笛卡尔(Descartes)积, 记为 $A \times B$.

例如, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$, 有

$$A \times B = \{(a, x), (b, x), (c, x), (a, y), (b, y), (c, y)\}.$$

再如 $M = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $N = \{y | -2 \leq y \leq -1\}$, 则 $M \times N$ 和 $N \times M$ 分别为坐标平面上如图 1-2 所示的矩形.




图 1-2

特别地,当 $B=A$ 时, $A \times A$ (常记为 A^2) 是 A 中一切元所作成的有序对的集. $R^2 = R \times R$ 是坐标平面上全部点的集.

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个非空集, 则定义

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$$

$$= \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n\},$$

特别地有

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_n.$$

习题 1-1

1. 用集合表示

(1) 方程组 $\begin{cases} x-7y+25=0, \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$ 的解;

(2) 方程 $\sin x = 0$ 的解.

2. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 试列出 A 的一切子集.

3. 下列各题集合之间有何关系?

(1) $A = \{x \in R \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x \in R \mid |x - 2| < 1\}$;

(2) $A = \{x \in R \mid x^2 - 1 = 0\}$, $B = \{x \in R \mid (x - 1)^2 = 0\}$;

(3) $A = \{a, \{a\}\}$, $B = \{a\}$;

(4) $A = \{a, b\}$, $B = \{b, a\}$;

(5) $A = \{1, 2\}$, $B = \{\{1\}, \{2\}\}$, $C = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$, $D = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

4. 证明 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

5. 设 $A = \{x \in R \mid 0 < x < 1\}$, $B = \{x \in R \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$ 和 $A - B$, $B - A$.

6. 设 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{x \mid -\infty < x < +\infty\}$, $C = \{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$, 在平面直角坐标系下画出集合 $A \cap (B \times C)$.

第二节 映 射

一、映射的概念

下面介绍集与集之间的一种“对应”关系.

定义 1 设 A, B 是两个非空集, 若存在一个确定的规则 f , 使 $\forall x \in A$, 按照 f , 存在惟一确定的 $y \in B$ 与之对应, 则称 f 是 A 到 B 中的映射 (见图 1-3), 记为

$$f: A \rightarrow B,$$




图 1-3

并称 y 为 x 在映射 f 下的像, 而称 x 为 y 在 f 下的原像, 映射 f 也可记为

$$f: x \mapsto y \text{ 或 } f(x) = y.$$

由定义, 像是惟一的, 但原像不一定惟一. 集 A 称为映射 f 的定义域, 记为 $D(f)$, 而 $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$ 称为映射 f 的值域, 记为 $R(f)$. 显然 $R(f) \subset B$.

例 1 设 A 为我校现有在校学生的集合, B 为学生所有生日日期的集合, 定义 f 为每个学生与他(她)的生日日期的对应, 则 f 是 A 到 B 的一个映射.

例 2 设 $A=B=R$. 定义 $f: x \mapsto x^2$, 则 f 是 R 到自身的一个映射.

例 3 设 $A = \{C(x, y) | C(x, y) \text{ 为平面上以点 } (x, y) \text{ 为圆心的圆}\}$, $B = \{(x, y) | x \in R, y \in R\}$, 令

$$f: C(x, y) \mapsto (x, y),$$

则圆与圆心的对应 f 是 A 到 B 的一个映射.

例 4 设 $A=N=\{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, $B=\{2, 4, 6, \dots, 2n, \dots\}$, 定义 $f: n \mapsto 2n, n \in N$, 则 f 是 N 到 B 的一个映射.

例 5 设在集 A 上定义

$$I_A: \alpha \mapsto \alpha, \forall \alpha \in A,$$

则 I_A 是 A 到自身的一个映射, 通常称为 A 上的恒等映射 (或单位映射).

对于 A 到 B 的映射 f , 若 $f(A)=B$, 则称 f 是 A 到 B 上的映射 (或称满