

家庭药房丛书

张贵增主编

周 凌 主 编

五官科疾病

常用药物

WUGUANKE

J I B I N G

CHANGYONG

Y A O W U

黑龙江科学技术出版社

《五官科疾病常用药物》编委会

主 编 周 凌

副主编 马 莉 唐 英 张 莉

编 委 刘桂英 刘桂玲 常培杰

蔡松泉 姜 玲

F022.61

前 言

健康是人类创造资源财富最基本的条件,医疗是保证健康的重要措施和有效的手段,而药物则是医疗保健的基础物质。随着社会的物质文明和精神文明水平的提高,人们对卫生保健的要求日趋强烈,寻求最有效的治疗药物和采用最简单有效的治疗方法,是家庭卫生保健事业中迫切需要解决的问题。近年来,由于大批家庭病房的建立,给卫生保健事业带来了福音和活力,随之而来的则是家庭药房的兴起和完善。所以,在完成了《家庭医生丛书》(8册)和《家庭医疗丛书》(5册)2套著作和《常见病家庭医疗手册》的出版之后,又撰写了《家庭药房丛书》这一济世之作,谨此献给人类的健康事业,并向中华人民共和国成立50周年献礼。

本书博采医药百家之长,以千家万户的医疗保健为宗旨,以建立家庭药房为目标,以中、西药结合为特色,以长期的临床用药实践为依据。其基本内容是以常见的疾病为纲,以有独特疗效的化学药物和传统的中药为目,纲举目张,相得益彰。每种疾病项下均记载了该病症基本概念和主要临床表现,以供快速诊断;所选的药物均按照使用中可选择的先后顺序排列,每种药物分名称、作用与用途(功能与主治)、注意事项、用法与用量、制剂与规格等项叙述,条目清晰,言简意赅,通俗流畅,内容翔实,简明实用。

本套丛书共分为5个部分,按照内、外、妇、儿和五官科的系统分类并自成体系,可谓独具匠心,是卫生保健、家庭医疗和临床用药必备的书籍和良师益友。

该书汇集了广大医药专家学者数千年的心血结晶,她的出版必将在保证我国的家庭医疗保健事业中起到不可估量的重大作用。

张贵君

1999.1.8 于哈尔滨

目 录

一、耳鼻咽喉科疾病	(1)
(一)耳部疾病	(1)
1. 先天性耳前瘻管	(1)
2. 耳廓外伤	(3)
3. 耳廓化脓性软骨膜炎	(7)
4. 外耳道疖	(9)
5. 外耳道炎	(13)
6. 外耳湿疹	(16)
7. 外耳道真菌病	(20)
8. 外耳带状疱疹	(23)
9. 鼓膜外伤	(26)
10. 气压损伤性中耳炎	(29)
11. 大疱性鼓膜炎	(32)
12. 分泌性中耳炎	(35)
13. 急性化脓性中耳炎	(39)
14. 急性乳突炎	(42)
15. 儿童急性化脓性中耳炎及乳突炎	(45)
16. 慢性化脓性中耳炎	(49)
17. 突发性聋	(53)
18. 老年性耳聋	(58)
19. 梅尼埃病	(62)

20. 贝尔氏面瘫·····	(67)
(二) 鼻部疾病·····	(70)
1. 鼻疖·····	(70)
2. 鼻前庭炎·····	(75)
3. 酒渣鼻·····	(80)
4. 急性鼻炎·····	(84)
5. 慢性单纯性鼻炎·····	(88)
6. 慢性肥厚性鼻炎·····	(91)
7. 萎缩性鼻炎·····	(92)
8. 干燥性鼻炎·····	(96)
9. 变应性鼻炎·····	(97)
10. 急性化脓性鼻窦炎·····	(101)
11. 慢性化脓性鼻窦炎·····	(105)
12. 鼻出血·····	(108)
13. 鼻骨骨折·····	(113)
(三) 咽部疾病·····	(115)
1. 急性咽炎·····	(115)
2. 慢性咽炎·····	(119)
3. 萎缩性咽炎·····	(123)
4. 急性舌扁桃体炎·····	(126)
5. 慢性舌扁桃体炎·····	(130)
6. 急性扁桃体炎·····	(131)
7. 扁桃体周围脓肿·····	(135)
8. 慢性扁桃体炎·····	(139)
9. 急性腺样体炎·····	(142)
10. 腺样体肥大·····	(146)
11. 咽异感症·····	(148)

(四)喉部疾病·····	(150)
1. 急性会厌炎·····	(150)
2. 急性喉炎·····	(154)
3. 小儿急性喉炎·····	(158)
4. 急性喉气管支气管炎·····	(161)
5. 喉水肿·····	(164)
6. 慢性喉炎·····	(166)
7. 声带小结·····	(168)
8. 喉息肉·····	(171)
9. 小儿喉痉挛·····	(173)
10. 喉麻痹·····	(175)
11. 喉关节炎·····	(179)
二、口腔科疾病·····	(183)
(一)牙体牙髓病·····	(183)
1. 龋病·····	(183)
2. 牙齿敏感症·····	(185)
3. 急性牙髓炎·····	(186)
4. 慢性牙髓炎·····	(188)
5. 急性化脓性根尖周炎·····	(189)
6. 慢性根尖周炎·····	(192)
(二)牙周病·····	(193)
1. 慢性单纯性龈炎·····	(193)
2. 多发性龈脓肿·····	(195)
3. 单纯性牙周炎·····	(198)
4. 牙周脓肿·····	(200)
(三)口腔黏膜病·····	(201)
1. 复发性口腔溃疡·····	(201)

2. 细菌性口炎·····	(206)
3. 疱疹性口炎·····	(208)
4. 口腔念珠菌病·····	(212)
5. 慢性唇炎·····	(215)
6. 腺性唇炎·····	(219)
(四)涎腺疾病·····	(222)
1. 流行性腮腺炎·····	(222)
2. 急性化脓性腮腺炎·····	(225)
(五)颞下颌关节疾病·····	(228)
颞下颌关节紊乱综合征·····	(228)
(六)口腔颌面部神经疾病·····	(233)
1. 三叉神经痛·····	(233)
2. 舌咽神经痛·····	(237)
三、眼科疾病·····	(239)
(一)眼睑病·····	(239)
1. 睑腺炎(麦粒肿)·····	(239)
2. 睑板腺囊肿(霰粒肿)·····	(243)
3. 鳞屑性睑缘炎·····	(246)
4. 溃疡性睑缘炎·····	(249)
5. 眦部睑缘炎·····	(252)
6. 单疱病毒性睑皮炎·····	(254)
7. 眼睑带状疱疹·····	(258)
8. 接触性皮炎·····	(263)
(二)泪器病·····	(268)
1. 泪溢·····	(268)
2. 急性泪囊炎·····	(271)
3. 慢性泪囊炎·····	(275)

(三)结膜病·····	(277)
1. 急性卡他性结膜炎·····	(277)
2. 淋菌性结膜炎·····	(282)
3. 沙眼·····	(286)
4. 流行性角结膜炎·····	(289)
5. 流行性出血性结膜炎·····	(292)
6. 春季结膜炎·····	(296)
7. 泡性结角膜炎·····	(299)
(四)角膜病·····	(303)
1. 细菌性角膜溃疡·····	(303)
2. 真菌性角膜炎·····	(311)
3. 单纯疱疹病毒性角膜炎·····	(316)
(五)巩膜病·····	(321)
1. 浅层巩膜炎·····	(321)
2. 巩膜炎·····	(324)
(六)葡萄膜病·····	(327)
1. 虹膜睫状体炎(前葡萄膜炎)·····	(327)
2. 中间葡萄膜炎·····	(332)
3. 脉络膜炎(后葡萄膜炎)·····	(335)
(七)晶状体病·····	(338)
1. 先天性白内障·····	(338)
2. 老年性白内障·····	(339)
3. 糖尿病性白内障·····	(342)
4. 外伤性白内障·····	(343)
(八)玻璃体病·····	(345)
1. 玻璃体混浊·····	(345)
2. 玻璃体出血·····	(348)

(九)青光眼·····	(351)
1. 原发性闭角型青光眼·····	(351)
2. 原发性开角型青光眼·····	(356)
3. 先天性青光眼·····	(360)
(十)视网膜病·····	(362)
1. 视网膜动脉阻塞·····	(362)
2. 视网膜静脉阻塞·····	(365)
3. 视网膜静脉周围炎·····	(369)
4. 中心性浆液性脉络膜视网膜病变·····	(373)
5. 视网膜色素变性·····	(376)
(十一)视神经病·····	(380)
1. 视乳头炎·····	(380)
2. 球后视神经炎·····	(384)
3. 缺血性视神经病变·····	(387)
4. 视神经萎缩·····	(390)
(十二)眼外伤·····	(395)
1. 眼球钝挫伤·····	(395)
2. 酸碱化学伤·····	(401)

一、耳鼻咽喉科疾病

(一) 耳部疾病

1. 先天性耳前瘻管

先天性耳前瘻管是第一鳃沟在胚胎期融合不全造成的遗迹，民间俗称聪明管，是一种常见的先天性耳畸形。本病单侧发病多于双侧，约 4:1，且女性多于男性。瘻口常位于耳轮脚前，瘻管可具有分支，因感染可自瘻口内排出具有臭味的分泌物。若反复感染可形成囊肿或脓肿。瘻管的分支一般均较短，个别可深达鼓沟或向后达乳突表面。本病常无症状，偶于挤压时，可有少许黏液或皮脂样物从瘻口溢出。感染时，局部可肿痛或化脓，反复化脓感染者，局部可形成脓痿或瘢痕。

(1) 常用西药

①青霉素 V 钾（苯氧甲基青霉素钾盐）

作用与用途 本品主要对革兰氏阳性菌如葡萄球菌、链球菌及肺炎球菌高度敏感；白喉棒状杆菌、炭疽杆菌、梭状芽胞杆菌、牛放线菌、念珠状链杆菌、单核细胞增多性李司忒菌、钩端螺旋体及淋病奈瑟菌敏感；梅毒螺旋体极为敏感。主要应用于敏感菌引起的轻、中度感染，如耳鼻咽喉感染（耳前瘻管感染、耳疖、耳道炎、中耳炎、扁桃体炎等）、皮肤软组织感染等。

用法与用量 口服：预防量，成人每次 125~250 毫克，每日 2 次；儿童可遵医嘱。治疗量，轻度感染每次 125~250 毫克，每日 3~4 次；中度感染每次 250~500 毫克，每日 4 次。

注意事项 有严重过敏史及哮喘史者慎用。病情严重或伴有恶心、呕吐、胃扩张、贲门痉挛及肠蠕动过强病人不宜口服给药。服用本品可有恶心、呕吐、上腹不适、腹泻、皮疹、荨麻疹、喉头过敏、发热及血清病样反应。对青霉素过敏者禁用。

制剂与规格 片剂：0.25 克；0.5 克。干糖浆剂：0.125 克/5 毫升；0.25 克/5 毫升。

② 头孢氨苄（西保力胶囊，头孢菌素Ⅱ，先锋霉素Ⅱ，头孢立新，苯甘头孢菌素，苯甘头孢霉素）

作用与用途 本品对大部分革兰氏阳性和阴性菌有很强的杀菌作用。对本品敏感的致病菌有 β -溶血性链球菌和其他链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌、克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、沙门杆菌、志贺菌等。主要应用于敏感菌引起的各种感染，如耳鼻咽喉感染（中耳炎、鼻窦炎、扁桃体炎及咽炎等）、皮肤软组织感染、呼吸道感染、泌尿道感染、妇科感染、淋病等。

用法与用量 口服：成人每日 1~2 克，分 4 次给药。严重感染或深部感染者每日 6 克。

注意事项 肾功能不全者慎用。对青霉素过敏者，一般对本品耐受良好，但在罕见情况下，有交叉过敏反应。本品应空腹服用。可见恶心、呕吐及腹部不适、女阴刺激或瘙痒。偶见有嗜酸粒细胞、谷草转氨酶、尿素氮及胆红素增高等。对本品过敏者禁用。

制剂与规格 胶囊剂：250 毫克；125 毫克。

③ 头孢羟氨苄（羟氨苄头孢菌素）

作用与用途 本品的抗菌谱和抗菌活性均与头孢氨苄相似。对葡萄球菌、 β -溶血性链球菌，肺炎球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、沙门菌、奇异变形杆菌和克雷伯杆菌等有较好的作用。对青霉素、链霉素、红霉素、庆大霉素、洁霉素等耐药的病人也有较

好的疗效。主要应用于敏感菌所致的耳鼻咽喉、皮肤、呼吸道及泌尿道等部位的感染。

用法与用量 口服：成人每日 1~2 克，分 4 次给药。严重感染或深部感染，每日 6 克。

注意事项 本品少数病人有皮疹、恶心、腹痛、腹泻及瘙痒等不良反应，但一般均轻微而短暂，不需停药可自行消失。偶见转氨酶升高现象。肾功能不全者减量、慎用，一般不用于孕妇和幼儿。对本品及其他头孢菌素类过敏者禁用。

制剂与规格 胶囊剂：0.25 克；0.125 克。

此外，还可选用罗红霉素，青霉素，先锋霉素 V 等药物。

(2) 常用中药

①五味消毒饮加味

方剂组成 金银花 15 克 野菊花 15 克 紫花地丁 15 克 紫背天葵 10 克 蒲公英 30 克 桔梗 15 克 白芷 15 克 生甘草 15 克 牡丹皮 10 克 黄芩 15 克。

功能与主治 清热解毒，排脓消结。主要用于治疗耳前瘻管感染化脓阶段。

用法 每日 1 剂，水煎，早、晚分服。

②六神丸

功能与主治 解毒、消肿、止痛。主要用于痈疽疔疮以及一切无名肿毒。故可用于耳前瘻管感染化脓阶段。

用法 含服：成人每次 10 粒，每日 2 次；儿童 1 岁 1 粒，每日 2 次。

注意事项 孕妇忌用。

2. 耳廓外伤

耳廓外伤是耳廓遭受的各种损伤，常可单独发生或伴发于邻近组织的外伤。其中以挫伤及撕裂伤较多见。挫伤多因钝物撞击

所致，轻者组织损伤不显著；重者常引起耳廓血肿、局部胀痛，有时血肿可波及外耳道。如血肿处理不及时，可导致耳廓增厚变形。大的血肿如继发感染，可引起软骨坏死，导致耳廓畸形。撕裂伤使耳廓组织有不同程度的损坏，轻者仅为一裂口，重者组织缺损，甚至耳廓部分或完全断离。本病除局部及时治疗外，全身应用抗菌素预防感染。

（1）常用西药

①青霉素〔青霉素 G，青霉素钠（钾），苄青霉素钠（钾），配尼西林〕

作用与用途 本品主要抑制繁殖期细菌细胞壁的合成而杀菌，作用快而强。对溶血性链球菌、肺炎球菌、敏感的金葡菌、脑膜炎双球菌、破伤风杆菌、炭疽杆菌、白喉杆菌、钩端螺旋体、梅毒螺旋体等，均有杀死和抑制作用。用于敏感菌引起的各种感染，如耳鼻咽喉感染（中耳炎、鼻窦炎、扁桃体炎等）、皮肤软组织感染、蜂窝组织炎、丹毒、败血症、脑膜炎、破伤风、白喉、梅毒、炭疽等。

用法与用量 肌注：一般感染，成人每次 80~160 万单位，每日 2 次。静滴：重症感染，成人每次 800~960 万单位，每日 1 次；儿童每日 5~25 万单位/公斤*，分次肌注或静滴。

注意事项 应用本品前，必须向病人及其家属详细询问有无变态反应性疾病，以往用药（特别是青霉素类）后有无过敏反应（如皮肤瘙痒、舌麻、胸闷、皮疹、发热、休克等）。用药前必须先作皮肤敏感试验。本品稀释后应立即使用，不宜放置过久，以免效价降低。应用大剂量的青霉素 G 钠、钾盐时，应注意钾、钠对病人的影响。肌注局部有疼痛，静滴可发生静脉炎（加小量皮质激素可作预防）。钾盐不可推注。禁忌在鞘内、脑室内给药。

* 指公斤体重。全书同。

对本品过敏者禁止使用。

制剂与规格 粉针剂：20 万单位；40 万单位；80 万单位；100 万单位；160 万单位。

②利君沙（琥乙红霉素，乙琥红霉素）

作用与用途 本品通过阻碍细菌蛋白质合成而起抗菌作用。对葡萄球菌、粪链球菌、白喉杆菌、炭疽杆菌、脑膜炎球菌、淋球菌、百日咳杆菌、产气梭状芽胞杆菌、布氏杆菌、军团菌、弯曲杆菌、钩端螺旋体、肺炎支原体、立克次体和衣原体等具有杀灭和抑制作用。主要应用于敏感菌引起的各种感染性疾病，尤其是用于不耐青霉素的病人。军团菌肺炎和支原体肺炎为首选。尚可用于金葡萄菌皮肤感染和软组织感染，包括创伤感染等。

用法与用量 口服：成人每次 250~500 毫克，每日 4 次。儿童每日 30~40 毫克/公斤，分 4 次给药；5~7 公斤者，每次 50 毫克；7~11 公斤者，每次 100 毫克；11~23 公斤者，每次 200 毫克；23~45 公斤者，每次 300 毫克。均每日 4 次给药。

注意事项 肝功能不全者应慎用。孕妇、哺乳期妇女慎用。因食物影响本品吸收，宜空腹服用。服用后有时可见食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胃部不适、便秘、药热及药疹等不良反应。严重肝损害者禁用。

制剂与规格 片剂：0.125 克。颗粒剂（干糖浆）：0.25 克。

③磷酸克林霉素（氯洁霉素，林大霉素，氯林可霉素）

作用与用途 本品为林可霉素衍生物，对大多数敏感菌的抗菌作用比林可霉素强约 4 倍。对革兰氏阳性菌及厌氧菌如金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎链球菌、微球菌属、梭状芽胞杆菌、拟杆菌属、梭状杆菌属、丙酸杆菌属、真杆菌、厌氧球菌等有很强的抗菌活性。克林霉素制品有盐酸盐、棕榈酸酯盐酸盐（以上 2 种均供口服）和磷酸酯（供注射用）等。主要应用于敏感菌所致的各种感染性疾病如耳鼻咽喉感染（扁桃

体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等)，皮肤和软组织感染（疖、痈、脓肿、蜂窝组织炎、创伤、烧伤和手术后感染等），呼吸系统感染、泌尿系统感染、口腔感染及厌氧菌引起的各种感染性疾病。

用法与用量 口服：成人每次 150 毫克，6 小时 1 次。肌注、静注：成人每日 0.6~1.8 克，分 3~4 次给药。儿童每日 8~16 毫克/公斤，分 3~4 次给药。

根据不同的制品其用法与用量不同。

盐酸盐：成人重症感染，每次 150~300 毫克，必要时可增至 450 毫克，6 小时 1 次。儿童重症感染每日 8~16 毫克/公斤；必要时可增到每日 20 毫克/公斤，分 3~4 次给药。

棕榈酸酯盐酸盐：供儿童应用。重症感染每日 8~12 毫克/公斤，极严重时可增至每日 20~25 毫克/公斤，分 3~4 次给药。10 公斤以下的婴儿每日 8~12 毫克/公斤，分 3 次给药。

磷酸酯（注射剂）：用于革兰氏阳性需氧菌感染，成人每日 600~1 200 毫克，分 2~4 次肌注或静滴；厌氧菌感染，一般用量每日 1 200~2 700 毫克；极严重感染用至每日 4 800 毫克。儿童 1 月龄以上，重症感染每日 15~25 毫克/公斤；极重症感染每日 25~40 毫克/公斤，分 3~4 次给药。

注意事项 肌注量每次不超过 600 毫克，超过此量应静脉给药。静脉滴注前 600 毫克药物应加入不少于 100 毫升输液中稀释，至少输注 20 分钟，1 小时内输注的药量不应超过 1 200 毫克。本品与林可霉素间有交叉耐药性，与红霉素有拮抗作用。不能透过血脑屏障，不能用于脑膜炎。胃肠道反应比林可霉素轻。对造血系统、肾、肝、神经系统毒性较小。少数病人有过敏反应，转氨酶和碱性磷酸酶短期轻度升高，偶有注射区疼痛。也可产生伪膜性结肠炎。孕妇及新生儿禁用。

制剂与规格 片剂（胶囊剂）：75 毫克；150 毫克。注射剂 150 毫克/1 毫升。粉针剂：0.6 克/4 毫升。

④精制破伤风抗毒素（精破抗）

作用与用途 主要用于治疗和预防破伤风。

用法与用量 预防量，成人与儿童用量相同，1次皮下或肌注1500~3000单位。伤势严重者可增加1~2倍。治疗量，成人与儿童用量相同，第一次肌注或皮下注射无反应后方可静脉注射，用量50000~200000单位，以后视病情决定注射剂量与间隔时间。同时还可适量的注射于伤口周围组织中。

注意事项 注射前必须先做过敏试验。凡本人及直系亲属曾有支气管哮喘、湿疹等过敏史者，要特别注意，防止过敏反应。

制剂与规格 注射剂：1500单位；3000单位；10000单位。

3. 耳廓化脓性软骨膜炎

耳廓化脓性软骨膜炎多因耳外伤、手术伤或邻近组织感染扩散所致，本病可引起较严重的疼痛、软骨坏死及耳廓畸形。致病菌有绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌。临床表现为先有耳廓灼热感及肿痛感，继而红肿加重，范围增大，疼痛剧烈，坐立不安，整个耳廓除耳垂外均可迅速波及，触痛明显。若有脓肿形成，则触之有波动感。

(1) 常用西药

①复达欣（头孢他定，头孢塔齐定，头孢噻甲羧肟，噻甲羧肟头孢菌素，头孢齐定，凯复定）

作用与用途 本品作用于细胞壁上的蛋白质，抑制细胞壁的合成，从而起到杀菌作用。对革兰氏阴性杆菌作用强；对绿脓杆菌、大肠杆菌、肠杆菌属、克雷伯杆菌、变形杆菌、脑膜炎球菌均具有强大杀菌力；对金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌等革兰氏阳性菌亦敏感，但作用弱于第一代头孢菌素；对肠球菌、耐新青霉素的葡萄球菌和脆弱类杆菌耐药。用于敏感菌引起的严重感染，如耳鼻咽喉感染、皮肤和软组织感染、