

花鸟虫鱼问答丛书

家养热带鱼

100 问

● 叶 键



福建科学技术出版社

花鸟虫鱼问答丛书

家养热带鱼 100 问

● 叶 键



福建科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

家养热带鱼 100 问/叶键编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2000. 2 (2001. 4 重印)

(花鸟虫鱼问答丛书)

ISBN 7-5335-1578-1

I. 家… II. 叶… III. 热带鱼类-鱼类养殖-问答
IV. S965. 8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 53577 号

- 书 名 家养热带鱼 100 问
(花鸟虫鱼问答丛书)
- 作 者 叶 键
- 责任编辑 刘宜学
- 出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
- 经 销 各地新华书店
- 排 版 福建省科发电脑排版服务公司
- 印 刷 福州市屏山印刷厂
- 开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32
- 印 张 6.75
- 插 页 26
- 字 数 155 千字
- 版 次 2000 年 2 月第 1 版
- 印 次 2001 年 4 月第 3 次印刷
- 印 数 10 001--15 000
- 书 号 ISBN 7-5335-1578-1/S·199
- 定 价 18.60 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换




多鳍鱼 属多鳍鱼目多鳍鱼科 外形酷似泥鳅，背鳍分成多段，易养，为中非淡水兼捕食性古老鱼类




雀鳝(长吻鳐) 属雀鳝目雀鳝科，嘴扁尖，鳞菱形，因地域不同体有大小斑之别



多星刀 属鲱形目刀背鱼科 体侧有 7~20 个镶白边的圆黑斑。具夜行性、易养 为中南、印度半岛捕食性鱼类



骨舌鱼(银龙) 属鲱形目骨舌鱼科 分布于亚马孙河水系,体长如带,嘴大 已有一亿多年历史,称“活化石” 善跳,易养, 为纯肉食性鱼类



青美骨舌鱼(青龙) 属鲱形目骨舌鱼科, 分布于中南半岛 体形与金龙等无异,习性亦同




巨鲱(海象) 属鲱形目巨鲱科。分布于亚马孙河下游水域。美洲第一号大鱼,可长到数米。为纯捕食性鱼类。



象鼻鱼 属长颌鱼目长颌鱼科。原产中非。下颌特化如象鼻。能发出微弱电流,具夜行性,易养。为动物性杂食鱼类。




魔鬼刀 属电鳅亚目线鳍电鳅科。原产巴西。能发出微弱电流御敌或捕食等。具捕食(小动物)性、夜行性。




非洲刀鱼(反天刀) 属长颌鱼目裸臀鱼科 眼小,尾尖,游泳只靠背鳍,但反应敏捷。种内争斗激烈,常斗致死。具捕食性。



宝莲灯鱼 属脂鲤目脂鲤科。分布于亚马孙河支流尼格罗河上游,是色彩最艳丽的热带鱼之一。喜酸性软水。为动物性杂食鱼类。




红绿灯鱼 属脂鲤目脂鲤科。分布于亚马孙河上游一狭窄地区。对水质要求不高,习性同宝莲灯鱼。



黑裙鱼 属脂鲤目脂鲤科 幼
小鱼“裙”黑,观赏价值更高
耐粗放 为动物性杂食鱼类



金裙鱼 属脂鲤目脂鲤科 与黑裙鱼的区别是该
鱼缺乏黑色素,但其黄色素,眼为黑色 习性与黑
裙鱼相同:



银板鱼(银元鱼) 属脂鲤目脂
鲤科 全身闪银光、游速快、活
泼,可与较小的鱼混养,水温
宜 27~28℃ 为亚马孙河植食
性杂食鱼类。


刚果扯旗鱼 属脂鲤目脂
鲤科 成熟雄鱼尾鳍如风
蝶、体具多种金属光泽 为
刚果河动物性杂食结群鱼
类





野兔鱼(美国九间) 属脂鲤目脂鲤科 分布于亚马孙平原北部 种内常咬斗 游速快、为动物性杂食鱼类

胭脂鱼 属鲤形亚口鱼科, 分布于中国长江、闽江水系 幼小魚棕纹明显, 底栖刮食, 雄成魚胭脂色 为杂食性鱼类、



虎皮鱼(黑四间鱼、片片鱼) 属鲤形目鲤科 分布于印尼苏门答腊岛 游速快、反应灵敏、产卵前常种内咬斗 为动物性杂食鱼类



双线鲃(红鳍鲃) 属鲤形目鲤科 广泛分布于东南亚各国。矫健,灵活,视力强。为中上层半植食性杂食中型鱼类



红玫瑰(下) 属鲤形目鲤科,原产斯里兰卡 雌鱼色较浅,喜弱酸性软水,较温和。为底层动物性杂食小型鱼类

银鲨 属鲤形目鲤科 原产东南亚各国。矫健、温和、灵敏、快速,可以群养 为中上层动物性杂食鱼类,





彩虹鲨(白化种叫红鳍鲨) 属鲤形目鲤科。产于泰国。同种鱼常争斗,有地域性。为底层植食性杂食鱼类。



长鳍斑马 属鲤形目鲤科。原产南亚、印度等国。好动,反应快,耐粗放,易养。为上层动物性杂食鱼类。



三间鼠(皇冠鼠) 属鲤形目沙鳅科。产于印尼。体色极似老虎皮,具夜行性,胆小喜躲藏。为底栖偏动物性杂食鱼类。



红翅鲨(蓝鼠) 属鲤形目沙鳅科。产于泰国。体色多变,体灰绿鳍红。喜躲藏,具夜行性。为底栖动物性杂食鱼类。



虎鲨(斧头鲨) 属鲈形目无须鲈科。原产东南亚。健壮善游，体黑似鲨鱼。为中上层大型杂食鱼类。



玻璃鲇(玻璃猫头鱼) 属鲈形目鲈科。产于苏门答腊岛。为最透明的热带鱼之一，喜在弱酸性软水中群游。为上层动物性杂食鱼类。



松香猫 属鲈形目鲈科。分布于东南亚。吻短，须短细。动作敏捷，集群性。为上层兼捕食性杂食鱼。



虎鲶(虎纹鸭嘴) 属鲶形目花鲶科。分布于亚马孙河。须6根,体纹因个体而不尽相同。为中下层大型捕食性凶猛鱼类。




红尾猫(狗仔鲸) 属鲶形目花鲶科。分布于亚马孙河。嘴大,形体如鲸,食量大,成长迅速。为深水纯捕食性大型鱼类。




鸭嘴鲶 属鲶形目花鲶科。分布于南美中部。吻长,须6根。动作慢,具夜行性,喜暖(22~28℃)。为中下层捕食性鱼类。


反游猫 属鲶形目歧须鲶科 分布于中非水系 平时离肚皮贴水面 适应力强、易养 为中上层动物性杂食鱼类




琵琶鱼(清道夫) 属鲶形目甲鲶科 砂纸般的唇善于“刷”净鱼缸中几乎所有附着物 为植食性杂食鱼类




一线班车(印度金龙) 属鲶形目鲶科 分布于南亚, 中小鱼身具横纹,故名 观赏价值高 性凶猛 为上表层捕食性鱼类




黄金鳉 属鳉形目鳉科 为一线班车之品种(缺黑色素),通体金黄,具点状金属闪光




孔雀鱼(1) 属鳉形目胎鳉科 原产于中美洲 适应性强,杂食程度高,好养 变异性强, 图示品种为正三角尾.




孔雀鱼(2) 图示品种为双叉戟




剑尾鱼(1) 属鳉形目胎鳉科。分布于墨西哥。耐低温,杂食程度高,好养。图示品种为红剑。



剑尾鱼(2) 图示品种为高鳍红剑。



剑尾鱼(3) 图示品种为燕尾剑。



剑尾鱼(4) 图示品种为苹果剑。



月光鱼 属鳉形目胎鳉科。原产于中美洲。习性同剑尾鱼。品种多,图示为红太阳(气球月光)之小鱼。



珍珠玛丽鱼(缺色种金玛丽) 属鳉形目胎鳉科。原产中美洲。为植食性杂食鱼类。

