

何惠川 輯

# 文堂集驗方

上海科學技術出版社

# 例言

一 醫期明理。不貴執方。以方論醫。失之淺矣。是編專爲僻壤窮鄉。持危濟急。第誌捷法。不列全方。如傷寒六經症論。槩不備錄。

一 行世方書。匪乏善本。或虛實寒熱。有未鏤析條分。偶爾輕投。慮多貽誤。茲刻悉爲詳註。用者審諸。

一 羣方或採諸古本。或傳自良師。雖極蒐採。終嫌里漏。偶閱濟人自濟一刻。頗覺先得我心。用是廣爲增訂。參互舊文。謹誌由來。匪同掠美。

一 纂輯甫竟。卽患沉疴。未經讐校。或症論參差。辭意剌繆。惟冀當代宗工哲匠。示我周行。節取所長。教其所短。

一 是集授梓。原期利濟。公諸海內。毫不取酬。同志如欲印施。槩無所吝。

# 文堂集驗方目錄

## 卷一

中風

附類中

.....一

風癰諸症

.....六

感冒傷風

.....八

傷寒

.....九

暑症

附痧症

.....一二

霍亂吐瀉

附轉筋

.....一七

泄瀉

.....二〇

瘟疫

附救節方

.....二三

咳嗽

附哮喘痰症

.....二五

瘧疾

.....二八

心腹痛

附脇痛

.....三一

脾胃

附呃逆噎隔

.....三四

腰痠

.....三六

諸藥食毒

.....三七

## 卷二

血症

.....四一

## 卷三

勞損

附怔忡盜汗

.....四四

脹滿諸症

.....四七

黃疸症

.....四九

痞積諸症

附積

.....五一

痿痺

附癱瘓瘋癲

.....五四

疝氣

附囊癰

.....五六

痢疾

.....六〇

大小便症

附脫肛淋瀝

.....六四

腳氣

附腎風

.....七一

頭痛

.....七四

面病

附脫頰

.....七六

耳症

.....七七

目疾

.....七九

鼻症

.....八四

口舌

.....八五

牙齒痛

.....八八

咽喉附骨哽

九〇

女科

九五

兒科

一〇七

卷四

外科

一二七

大麻瘋

一五六

折傷

附金瘡夾杖

破傷風  
錫火傷

一五九

五絕

一六九

蟲獸傷

一七〇

# 文堂集驗方卷一

仁和何京惠川輯  
杭州徐志源校訂

中風附類

〔總論〕

凡卒然仆倒。昏不知人。痰涎壅塞。口眼喎斜。四肢不遂。概名中

風。然中風症候。與中氣相類。中氣乃忿怒忽然昏仆。不可以中風一概治

之。中風身溫。中氣身冷。中風多痰涎。中氣無痰涎。中風脈浮應左人迎。中

氣脈沉應右氣口。以氣藥治風。則可以風藥治氣。則不可。中風多痰。勿

驟以人參補之。恐痰愈盛而氣愈塞矣。慎之。陽中者面赤。牙關緊閉。目上

視身強直。手拳掉眩。陰中者面青白。痰喘手足冷。多汗。更有元氣虛。忽然

昏仆。似乎中風者。手必撒。口必開。與正中風不同。又宜溫補藥治之。凡中風口開心

絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。鼻聲如鼾肺絕。五症齊犯。不治之症也。如只見一二症。用重參者治之。或灸法救之。更有氣血偏枯。半身不

遂者。如在左者血虛。宜四物湯。熟地黃。當歸。錢一。白朮。土炒。錢二。桂枝。錢一。鈎藤。錢三。五川芎。錢一。白芍。酒炒。錢二。水煎服。

如在右者氣虛。宜四君子湯。人參。錢一。白朮。土炒。錢二。桂枝。錢一。鈎藤。錢三。五方中皆可加祛風活絡之藥。如防風。錢一。二。桂枝。錢一。鈎藤。錢三。五之類。如有痰加

竹瀝薑汁佐之。此二症尚須審視。左或死血。右或濕痰。若類而推之。則又有中痰。中寒。中暑。中食。

中惡等症。分別症治。切勿誤施。惟是中風一症最急而暴。歷代名賢各有

發明。良法具在。所當深究。第一時卒倒。醫藥迫不及備。故節取古方之効

捷而易辦者。謹述於左。庶幾對症處方。稍爲救急之一助云。

〔傳心方〕 治卒然仆倒。疲涎壅盛。難辨虛實。扶病人於避風室內。用炭火一盆。將米醋灑上。使醋氣衝入口鼻。病輕者即甦。重者亦易治。勿遽服補藥。米湯之類。恐疲涎永繫於心。致成終身痼疾。亦可用。比法即處中。

〔中風昏迷不省〕 不論風寒。食痰邪祟。一時昏仆。用生薑汁半鍾。童便一鍾。和勻。盪溫灌下。即醒。牙皂莢。去皮弦二兩。用生薑一兩同入水中煮化。取出曬乾爲末。北細辛。五錢去葉土淨。

研細末。用少許吹入鼻中。即醒。人手足指甲。炒黃酒煮服。立醒。

〔中風口噤不能開〕 白鹽梅揩齒。即能開。并不傷齒。不拘男婦小兒。中風口噤身直。用乾鷄屎或鷄糞炒黃。再以黑豆同炒。酒煎去渣服。即齒

開能言。

〔中風口噤不語〕 白明礬。二錢研末。用生薑自然汁調化。幹開口灌服。其涎

或吐。或化下。即醒。馬料豆一升。煮濃汁如飴。含汁在口。即能言也。側

栢葉一握。去枝梗。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一觔。煎十餘沸。溫服。栢

葉能行血消風。葱白散氣祛痰。酒能通經助藥力。如中即服數杯。能使風退氣和。一試易治。

〔初中痰盛不省人事〕 蘇合丸一圓。用竹瀝薑汁調藥灌下。醒後。用白

朮。土炒當歸。天麻。各二錢。川芎。薄荷。桂枝。南星。薑汁製。陳皮。各一錢。水煎。臨服加竹瀝一

酒盞。薑汁二茶匙。和勻服。

〔中風口眼喎斜〕 生瓜蔓絞汁。和大麥麵炙熱。熨心頭。一正便止。勿令

過分。口喎用皂莢五兩。去皮爲末。三年老醋和糊。左喎塗右。右喎塗左。乾更

上之。以正爲度。

用石灰一合。醋炒調如泥。於不患處塗之。立便牽正。

灸法最妙。聽會。耳珠前陷中。開口有空。

頰車。目下八分。曲頰陷中。

用麥大艾九灸三壯。卽効。如不

効再灸。

〔中風灸法〕

一時昏仆氣塞。涎流不語。藥物難施之際。灸法最善。百會。

頭頂。耳後一寸半。分

大椎。項者一節。脊陷中。曲池。屈手陷中。足三里。膝眼下三寸。胫外廉陷中。絕骨。一名選中。

附飛陽之前。間使。手掌上橫紋中。後一寸。

以上七穴。凡入心中昏亂。或手足麻痺。不拘是

風是氣。用菴豆大艾丸各灸三五壯。卒死不知何症。用此灸法卽甦。

〔中風手足麻癢〕

羌活煎湯洗。大腸燥閉不見虛症者。枳實厚樸大

黃。羌活。各二錢。水煎服。自解。

〔太玄湯〕 治中風痰塞不語。染布活穀缸水一盞溫灌下。卽能言語。

〔菴荻丸〕 專治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間疼痛。腰膝無力。亦能行大腸

氣。治三十六般風。或受寒濕而起。癱瘓年久不愈。服久神效。菴荻草。五月五日。六月六日。九月九日。採葉。洗淨。乾。

取出晒燥。再曬再蒸。晒共九次。碾末煉蜜丸如桐子大。每服五十丸。空心

白酒下。病五七年者。服至二千丸。病轉盛者。乃藥勝於病。服至四千丸仍

如完人。

〔浮萍一粒丹〕

治中風癱瘓。三十六種無名風疾。遍身癩癧。脚氣。併治

跌撲損傷。胎孕筋搐攣結。此藥性寒而散。中風挾火者。功效至靈。服之百

效。

卷一

一

一

一

一

一

一

粒乃爲完人。紫背浮萍。宜七月十五日採。檢淨。以竹篩曬。下置水一盆。映之易燥。研細末。煉蜜丸。彈子大。每服一粒。空心豆淋酒下。

〔史國公藥酒方〕 防風。秦艽。川草薢。鱉甲。虎脰骨。食羌活。晚蠶沙。炒。油

松節。白朮。土炒。各二兩。杜仲。薑汁。炒。當歸。各三兩。川牛膝。一兩。蒼耳子。四兩。乾茄根。八兩。枸杞子。五兩。

右切片。盛夏布袋中。投大礬內。入好酒三十五觔。封口。浸十四日。將礬入湯鍋內煮三個時辰。取礬入土埋三日。去火氣。每日清晨午後。各服三五杯。大有効驗。愈於服他藥也。

〔中風拘攣〕 中風昏仆。省後。筋絡攣結。肢節疼痛。或半身不遂。用八角

刺樹皮。俗名老鼠刺。樹高三五尺。冬。季結紅子。鮮者取皮。四兩。木蓮葉。俱茶花葉而色者。生於土。多一歲一片。無灰酒二觔。煎

至兩碗。作二次服。大有奇功。三四服全効。

〔預防中風方〕 凡人覺大指次指麻木。或眉稜骨痛。三年之內。定有風

疾。宜服此方。更以慎起居。遠房帷。節厚味。醇酒。爲最要。蒺藜草。三片。製法如前。製

首烏。當歸。熟地黃。各八分。牛膝。續斷。秦艽。五加皮。川芎。赤芍。各四兩。俱爲細末。煉

蜜丸。桐子大。空心淡酒下三錢。

附類中風

〔中氣〕 前已合辨。用蘇合丸薑湯調灌醒後。次用人參。白朮。炒。茯苓。青

皮。陳皮。白芷。烏藥。錢。各一分。甘草。五分。水煎溫服。或分二次服。即是中風。去人參。先進此方

順氣。次進治風藥。亦善法也。此卽入味順氣散。

〔中痰〕 寒痰迷悶。心胸。僵仆卒倒。口角流涎。四肢厥冷。脈沉滑。薑汁調

白礬二錢。灌下。如不効。再用牙皂。

去皮洗。每末一錢。

藜蘆。

五俱爲細末。每服五分。燈

心湯下。吐去頑痰。卽醒。次服導痰湯。

陳皮。薑半夏。茯苓。枳殼。

炒。南星。薑汁製。各一錢。

甘草。

五

加生薑五七片。水煎服。

端午日取白鳳仙花。浸於燒酒內。封固。

無論年月。遇此症。溫服一杯。其痰立時消化。

〔中寒〕

身體僵直。口噤不語。四肢戰掉。灑灑惡寒。脈浮緊。無汗。用熱酒。

薑汁各半盞。灌下。卽醒。

或

用生葱二觔。截去其根葉。用繩縛作兩束。先

用一束。入空鍋內。頓熱。

不可用

乘熱。置病人臍上熨之。再將次束置鍋內。候

前束冷。則易之。如此數換。病人鼻中聞葱氣。卽醒。此法最善。

或用豆大艾丸。隔大蒜片。灸臍下一寸五分氣海穴。不拘壯數。以手暖爲度。醒後。次

服乾薑附子。

各一二錢。以病

佐以麻黃五分。水煎服。或服加味理中湯。

薑半夏。乾薑。北五味。白朮。陳皮。炙甘草。細辛。藜蘆。

加減。水煎服。

〔中食〕

飲食過傷之後。或感風寒氣惱。以致填塞胸中。胃氣不行。脈緊

盛。狀似中風。或有半身不遂。手足抽搐等症。先以蘿蔔子搗碎。以溫湯和

攪。取淡湯徐徐飲之。少頃卽吐。

此法卽吐不盡。

或用食鹽少許。於熱鍋中炒

紅色。入水。煮至將滾之際。攪勻。淡鹽湯徐徐飲吐。以去病爲止。次用平胃

散。厚朴。

薑汁。陳皮。各一錢半。

炙甘草。

散。厚朴。

米泔水浸一宿。

炙甘草。

六

或加減。水煎服。以風藥

治之。則死。

〔中陰毒〕

房勞後感中風寒。一時沉重。四肢逆冷。腹痛冷汗。爪甲面色

青黑。六脈俱沉。兩尺脈伏。乃陰毒也。用豆大艾丸。隔大蒜片灸氣海。

臍下一寸半。

關元。臍下三寸。一二穴。各灸百壯。以手足緩爲度。更服羌附湯。羌活。附子。製。乾薑。

錢。茴香。各一錢。木香。五錢。加黑棗二枚。水煎服。

〔中惡〕 多由暮夜登廁。或行人所不到之地。忽然眼見鬼物。卒然僵仆。四肢逆冷。兩手拳屈。甚者口鼻出血。惟心腹俱暖。凡遇此症。切勿移動。卽令衆人圍繞。打鼓燒火。或焚紫金錠。檀香。蘇合香。樟木之類。直候省知人事。方可移歸。用菖蒲根生搗絞汁。灌口鼻中卽醒。或用紫金錠磨灌下。或用犀黃。五錢。麝香。各二錢。硃砂。五分。俱研細。水調服二錢。凡中鬼祟。一時不醒。用麥大艾丸。灸人中穴。一壯卽醒。或於兩脚大拇指離甲一韭葉處。各灸七壯亦効。

風癇諸症

〔總論〕 癇病有五。多屬痰迷心竅。故一時病作。或類猪羊六畜之聲者。皆應乎臟腑之所屬。亦有得之大驚恐者。

〔風癇不識人〕 伏龍肝。卽龍心土。水調五分或一錢服。凡風癇卒然口噤。手足強直。俱可用此。

〔暗風癇症〕 及痰涎壅悶欲絕者。芭蕉油飲之。得吐卽愈。取油如取蜜法。煎竹筒插蕉樹上。臘月烏鴉一隻。鹽泥固濟。於瓦罐中煨過。出火性。爲末。入硃砂末五錢。

每服一錢。淡酒下。日三服。半月愈。

〔痰迷〕 風痰迷悶不識人。及肺熱痰實。胸膈不利。其法用半夏。火硝。爲末。糊丸。菉豆大。薑湯下五十丸。風加南星。湯炮。七次。熱甚加黃芩。一方加硃砂。雄黃。各少許。小兒牛膽汁爲丸。

〔風邪癰疾〕 皂莢。四兩。有性。蒼耳。四兩。連根莖。陀僧。一爲末。蜜丸。硃砂衣。每服二三

十九丸。棗湯下。日二服。稍退日二丸。

〔婦女鬱氣風痰〕 鬱金。七兩。明礬。二爲末。糊丸。白湯下五十丸。亦治癰症。一經人。病在十年。

遇異人授方。初服心問如有物脫去。神氣沛然。再服而愈。

〔心風痰迷顛癇〕 甘遂。二錢。爲末。取猪心血和勻。入心內。紙裹煨熟。爲末。

入硃砂一錢。分作四丸。每服一丸。猪心煎湯送下。以瀉下惡物爲効。不瀉

再服。並治婦女心風血邪。

〔急救痰壅方〕 生薑汁。一小盞。砂糖。四兩。和勻。入鹽少許。白湯調服。

〔化痰丸〕 治風痰癰症。生白礬。一兩。紅茶。五錢。爲末。煉蜜丸。如桐子大。一歲

十九丸。茶湯下。大人五十丸。久服痰自大便中出。斷病根。

〔癰病神方〕 牙皂。四兩。陀僧。一爲末。蜜丸。硃砂爲衣。每服二三錢。滾水下。

終身已食一切諸血。

〔失心瘋〕 鬧楊花根。竹刀掘取。勿犯鐵器。去梗。用皮五錢。木梓搗碎。金首飾。重五錢。珍珠。五分。豆腐煮數滾。布包搗碎。同燈心

末。將前二味。用水二碗。煎入分。投珍珠末服之。服後吐痰如愈。隨以補

劑調治。水銀。一兩。薄節。一個。入研成砂子。丸如芡實大。每服一丸。磨刀水下。方內有水

銀。不可  
誤服。

辰砂、遠志肉、川貝母。

去心。

白芍。

酒炒。

棗仁。

妙。

撫芎。

膽星。

九製。

玄明

粉、扶神、當歸。

各五錢。

川黃連。

薑汁炒。

石菖蒲。

白。

陳皮。

去白。

青黛。

各二錢。

西黃。

五錢。

用豬心一個。

勿去血者。入辰砂末在內線紮。箬包火煨熟。搗如泥。後入諸藥末和勻。浸

蒸餅爲丸。杵極堅。丸如黍米大。食後燈心湯服二錢。狂邪發作無時。披

頭大叫。不避水火。惟苦參一味爲末。蜜丸桐子大。薄荷湯服。

### 感冒傷風

〔總論〕 凡人坐臥當風。或起居失於衣被。風邪之氣。從毛孔鼻中而入。

所感者淺。在於經絡腠理之間。故身體體憎寒壯熱。頭痛面赤。或四肢逆冷。

無汗惡寒。或咳嗽痰稠。鼻塞聲重。左脈浮緩。口能知味者是也。宜用紫蘇。

陳皮。行氣輕浮之藥。發散若多服薑湯。重被蓋覆。風邪入裏。反成熱咳者。

有之。宜戒生冷。勿使風邪變成寒中。慎之。

〔鼻塞咳嗽胸膈吊痛發熱口渴〕 蘇葉、廣皮、前胡、葛根、薄荷。

各一錢。

杏仁、薑

半夏、炙桑皮、桔梗。

各半錢。

加生薑三片。葱白三莖。水煎服。

如上述頭痛。鼻

塞聲重。防風、荊芥穗。

各半錢。

薄荷、川芎、白芷、細辛。

各一錢。

甘草。

五分。

加葱白三莖。水

煎服。

煎服。

〔四時感冒風寒〕

初起。葱白。

五錢。

生搗。滾酒沖服。

如身痛。頭痛。腰脊

強。發熱不散。不思飲食。羌活。

八分。

川芎、白芷、蒼朮、生地、黃芩、防風。

各一錢。

細辛。

八分。

加生薑三片。棗一枚。水煎服。

如惡心。

去黃芩。

如有汗。

加白朮。

如口渴。

加

如口渴。加

如口渴。加

如口渴。加

石膏。

如

如雨頭角痛。及寒熱協痛。加柴胡。如鼻塞。加蘇葉。葱白。

週身連

週身連

週身連

週身連

週身連

週身連

週身連

週身連

週身連

項脊疼痛。用羌活。能散肌表之寒邪。定痛。川芎。辛溫。能散風寒。治頭痛。

白芷。溫散。逐腸胃風寒邪熱。止頭痛。生地。取其涼心火。退血熱。去煩

躁。蒼朮。溫散。發汗寬中。止嘔吐。黃芩。苦寒。取其消痰利氣。清上焦之

火。欲其土者。酒炒。欲其下者。生用。

防風散風邪。治一身之痛。細辛。溫散。善祛陰分之寒

邪。除陰經之頭痛。以病之輕重。加減服之。無不應手。

〔身熱有汗。脈浮。咳嗽痰多〕。廣皮。薑半夏。蘇葉。杏仁。去皮。炙桑皮。象貝。去心

白朮。土炒。各一錢。甘草。五。加生薑二片。水煎服。

〔風熱發癢。癢風疹塊〕。防風。荆芥。各一錢。黃芩。連翹。木通。桔梗。各一錢。鉤藤。蟬退。

各二錢。升麻。甘草。各五分。水煎服。外用鹽草包煎湯洗。或白雞冠花煎湯洗。即

効。

### 傷寒

〔總論〕。傷寒傳變。先哲已詳。症候繁多。難於枚舉。大抵自霜降後。春分

前。寒邪所感者。爲正傷寒。至春夏別感。俗謂之四時傷寒。或兼雜症。惟得

病之初。宜加審辨。則調理自得其宜矣。如頭痛。惡寒。發熱。身足痠痛。晝

夜不歇者。傷寒也。如胸膈脹滿。頭痛發熱。時有止歇者。勞役食積也。傷

寒最爲難治之症。其患一日病在皮。二日在膚。三日在肌。四日在胸。五日

在腹。六日在胃。初起卽治。邪淺易爲消散也。

傷寒傳經。一日在太陽。則頭項痛。腰脊強。脈浮緊。或浮緩。二日在陽明。

則爲目痛。鼻乾。脈浮長。身熱不得眠。三日在少陽。則爲耳聾。脇痛。脈弦。

寒熱。口苦而嘔。四日在太陰。則咽乾。腹滿。自利。脈沉細。五日在少陰。則舌乾。口燥。脈浮緩。六日在厥陰。則煩滿。囊縮。脈沉微。此傳經之大槩也。所忌者。脈堅大急。身汗如油。水漿不入。喘而不休。環口黎黑。形如煙煤。直視搖頭。唇吻青色。反目直視。渡便遺矢。有犯於斯。皆不治之症也。傷寒初起。疑似之際。無論四時陰陽虛實。用潔白糖五錢。陰症蔥薑湯下。陽症百滾湯下。重者亦能減輕。不問陰陽二症。倉卒無藥。用生薑一兩。葱十莖。好酒二大碗。煎一碗。熱服。蓋被出汗即解。勿令汗太過。忌大葷五七日。春季依此方。夏月減半。冬月加黑豆二合。同煎服。

〔神白散〕 治一切時行傷寒。不問陰陽二症。老少男婦孕婦皆可服。白

芷一兩。生甘草五錢。生薑三片。蔥頭三寸。黑棗一枚。豆豉五十粒。水二碗。煎服。取汗。不汗再服。

病至十餘日。不得汗者。皆可服。按白芷芳香之品。行手陽明大陽。足陽明胃。手太陰肺。取其力專。以解三經之邪。誠仙方也。

〔頭痛內熱脈洪無汗〕 葛根一兩。豆豉一勻。水煎。臨服。加生薑汁少許。

頓服。取汗。按葛根解利足陽明。傷寒頭痛之聖藥。味甘平。解表止渴。古方用至四兩。以其味淡。用者審之。治時疫病更妙。日久不得汗者。

大梨一個。生薑一塊。同搗取汁。入童便一碗。隔湯頓熱服之。即汗。初起寒重者勿服。

〔傷寒結胸停食〕 初起胸中滿悶。喉中有痰聲。寸口浮滑。用中風門中。食吐法治之。

如三四日後。不能吐。痛結不通。用陳香糟六生薑。四兩。水菖蒲根四兩。食鹽二兩。

共搗勻。炒熟爲餅。敷胸前痛處。如再不解。以熨斗火熨之。內響即去。如口

渴。任喫茶水。待大便利下惡物即愈。如胸膈不寬。疼痛。及一切寒熱。痰

食水結。用生薑。

搗爛如泥。去汁。取渣。

炒熟。絹包。徐徐揉熨心胸脇下。其効甚速。如薑

冷。入汁再炒再熨。如大便結。熨臍下。

〔陰毒傷寒四肢逆冷〕

某黃一升酒拌。濕絹袋二個。包蒸極熱。更換熨

足心。候氣透即止。

四時雜病嘔吐。手足逆冷。橘紅。

雨。一生薑。雨。

水煎。徐徐

飲下即止。

〔傷寒內傷〕

食積畜血。小腹硬脹。不能言語。兩目直視。手足強仆。神氣

欲脫。難以下藥者。用紫蘇。

雨。五七。

煎湯。將手巾入湯內泡熱。取起絞乾。乘熱

攤病人肚上。令人以手在手巾上旋旋摩擦。冷即易之。待其宿食積血自

下。即易醫治。如肛門閉結。照大小便症導引方治之。

〔喉管傷寒〕

凡喉中癢不可忍。用薄荷。分二麝香少許。研極細末。吹入喉

中。待其氣通。吐出涎水碗許。然後喫陳米湯半茶杯即止。如慢飲茶酒。水

解。癢則不可救。

〔傷寒發頤〕

原受風寒。表邪未盡。日久身熱不解。耳項前後結腫疼痛。

身熱口渴。渴。柴胡。天花粉。乾葛。牛蒡子。黃芩。桔梗。連翹。石膏。錢各一。分五。升麻。

分三。水煎。不拘時服。

〔邪熱亢極〕

黃連。雨。二。煎濃汁一盞。放井水上。頓冷。浸青布。搭胸前。徐徐

換之。以熱勢稍退即止。

〔傷寒發黃〕

五六日上。週身發黃。用麻油半盞。和水半盞。入雞子清一

〔舌黃煩躁狂言〕  
出過小雞者。 泡湯服即睡。

吞生雞子清一二枚。即清爽。發熱狂走。用雞子殼。

〔服藥吐出不納〕 生薑自然汁。溫服數匙。或半盞即進。

〔吐血不止〕 陳京墨。用雞子清磨服即止。鼻血不止。用冷水浸紙搭於鼻衝。再用黑山梔研細吹入鼻中。

〔小便不通〕 半夏、麝香。各少許。研末。 填入病入臍中。再用葱白、田螺。去虎。取肉。 共搗成餅封臍上。

〔服附子過多身目發紅者〕 黃連、生甘草。各五錢。 用蘿蔔汁同煎服。其紅

自退。如不急治。恐血從諸上竅出。則無救矣。如無蘿蔔時。用子煎湯可代。 或以地漿水。

不種。挖淺降地上。掘深二尺許。入泉水攪和。澄清取飲。 服二三碗即解。如輕發附毒者。用小黑豆煮汁。

連豆喫數升効。

〔服麻黃汗出不止〕 糯米粉、龍骨、牡蠣、防風、藁本。各一兩。 共研細末。遍撲

週身即止。并將病人頭髮披入水盆中。捷効。

〔護胎法〕 妊婦傷寒。恐傷胎氣。用伏龍肝。即龍心土。 青黛、井底泥。各等分爲

末。塗臍中二寸許。不損胎。

傷寒病初愈。勿過飽。勿勞動。忌食厚味、羊肉、飲酒。大忌房事百日。蓋脾胃

初復。犯之無救。

暑症附癆症

〔總論〕 深堂大廈得之爲中暑。日中勞役得之爲中熱。有冒暑。有中暑。

有傷暑。三者輕重之分耳。腹痛嘔瀉者。冒暑也。宜涼解清利。身熱頭痛。煩躁不寧。或面垢背寒。昏不知人。爲中暑。宜溫散。不思飲食四肢困倦。汗出不止。爲熱傷元氣。宜清暑益氣。手足搖蕩者。爲暑風。不可以風治。宜清涼藥。加通經藥治之。夏月中熱中暑。乃因時而感。或有傷寒。亦類似中暑。但傷寒惡寒而身寒。傷暑惡熱而身熱。故脈緊惡寒。脇下無汗。爲之傷寒。脈虛身熱。脇下有汗。爲之傷暑。蓋傷暑氣散。故脈弱而散。或弦細而遲也。是宜詳審。

〔中暑〕

中暑者靜而得之。避暑於深堂大廈。爲陰寒所遏。暑不得越之。

故此寒爲標。熱爲本。先以辛溫之藥治其標。繼以清涼之藥治其本熱。若頭痛惡寒。身形拘急。肢節疼痛。煩熱無汗。雖因暑而得。仍如傷寒症治之。用乾薑錢炒一甘草錢炒八分杏仁錢炒研肉桂錢去皮各六分水煎溫服。如煩躁井水調服。

凡盛暑之時。必令身有微汗。此養身之道。得時宜者也。經云。夏暑汗不出者。秋成風瘧。

〔中熱〕

冒暑遠行。初覺昏悶之時。急嚼大蒜頭一枚。或生薑一塊。搗爛。

冷水送下。即醒。如不能嚼。用水研灌之。牙皂莢剝去黑皮。取不蛀者佳。燒煙欲盡。用

盆合於地上。勿令透煙。每皂莢末一兩。加甘草六錢和勻。每服一錢。溫水

調下。重者兩服。即昏沉不省者。立能救之。菴曰。莢能瀉利去痰也。途路之人。酷日之

下。勞力過度。卒然昏倒。切不可使冷及飲冷水。得冷則不救。倉卒無藥。取

路上微熱黃土。堆於臍上。中空臍眼。使一二人撒尿於其中。再以大蒜搗