

# 实用跌打损伤 中草药彩色图集

主编 黄元金  
广东科技出版社



# 实用跌打损伤中草药彩色图集

主编 黄元金

编者 黄元金 文华玲 陈乐松 董青松

摄影 彭治章

广东科技出版社

·广州·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

实用跌打损伤中草药彩色图集/黄  
元金主编. —广州: 广东科技出版社,  
1999. 9

ISBN 7 - 5359 - 2180 - 9

- I. 实…
- II. 黄…
- III. 骨伤 - 中草药 - 图集
- IV. R243

2180-9

Shiyong diedusunshang zhongcaoyao caisetaji

---

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjwb@ns.guangzhou.gb.com.cn

社 长: 黄达全

经 销: 广东省新华书店

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 787mm × 1092mm 1/32 印张 7.75 字数 200 千

版 次: 1999 年 9 月第 1 版

1999 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 10 200 册

定 价: 33.00 元

---

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

## 前 言

本书是作者积累多年行医实践，并收集、整理古今诸多民间方剂、传统经验及参照有关医药文献资料综合编著而成。

我国地域宽广，气象条件复杂，中草药资源丰富而又东西南北各有差异。限于篇幅，本书仅在偏向于中、南部的中草药资源里采载常见常用的中草药 118 种，并精选治疗跌打损伤较为有效的验方 346 条。

本书收载部分现代中草药对一些骨伤科药用药理的最新研究成果，并统一采用现代医学病名。对收载中草药的名称亦取通用的药材名（附植物拉丁学名），某些民间药采用地方名或原植物名。

本书图片由广西药用植物园摄影师彭治章先生主持拍摄，并由该园分类室董青松小姐进行中草药植物分类鉴定。全书体例简明扼要，图文并茂，识药用药，一目了然，力求适合有关医患人员和广大群众参考使用。

限于水平、时间和条件，书中文字阐明及方剂筛选难免有不妥之处，有的图像从拍摄部位的构思剪裁到画面效果，亦不易善尽美，借此恳请读者批评指正。

编 者

# 目 录

## ● 一画

- 一匹绸 *Argyreia acuta* Lour. .... (2)

## ● 二画

- 七叶莲 *Schefflera kwangsiensis* Merr. ex Li .... (4)  
七叶一枝花 *Paris polyphylla* Sraith ..... (6)  
八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng ..... (8)  
八角枫 *Alangium platanifolium* Harms ..... (10)  
儿茶 *Acacia catechu* (L.) Willd. .... (12)  
了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. .... (14)  
九里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack. .... (16)

## ● 三画

- 三加皮 *Acanthopanax trifoliatum* (L) Merr. .... (18)  
三叉苦 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. .... (20)  
土烟叶 *Solanum verbascifolium* Linn. .... (22)  
大叶紫珠 *Callicarpa macrophylla* Vahl ..... (24)  
大叶千斤拔 *Flemingia macrophylla* (Willd.) Merr. .... (26)  
大风艾 *Blumea balsamifera* (L.) DC. .... (28)  
山柰 *Kaempferia galanga* L. .... (30)  
山人颜 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. .... (32)

山小橘	<i>Glycosmis parviflora</i> (Sims) Little	(34)
山竹子	<i>Garcinia multiflora</i> Champ.	(36)
山香	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	(38)
千年健	<i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott	(40)
飞龙掌血	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	(42)
马鞭草	<i>Verbena officinalis</i> L.	(44)
马蔺	<i>Iris laeta</i> pall. var. <i>chinensis</i> (Fisch.) Koidz.	(46)
马甲子	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	(48)
马钱子	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.	(50)

#### ● 四画

五色梅	<i>Lantana camara</i> L.	(52)
木棉	<i>Bombax malabaricum</i> DC.	(54)
水蓑衣	<i>Hygrophila salicifolia</i> (Vahl) Nees	(56)
水田七	<i>Tacca plantaginea</i> Hance	(58)
牛筋草	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	(60)
牛马藤	<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.	(62)
月季花	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	(64)
风箱树	<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.	(66)
乌药	<i>Lindera strychnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) F. - Vill. .....	(68)

#### ● 五画

半枫荷	<i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance	(70)
半边莲	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	(72)
古钩藤	<i>Cryptolepis buchananii</i> Roem. et Schult.	(74)
石韦	<i>Pyrrhosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	(76)

石南藤	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand. - Mazz .	(78)
石柑子	<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr .	(80)
石榴	<i>Punica granatum</i> L .	(82)
石仙桃	<i>Pholidota chinensis</i> Lindl .	(84)
石油菜	<i>Pilea longicaulis</i> Hand. - Mazz .	(86)
龙船花	<i>Ixora chinensis</i> Lam .	(88)
龙眼	<i>Dimocarpus longan</i> Lour .	(90)
叶上花	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr .	(92)
田基黄	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	(94)
田七	<i>Panax notoginseng</i> (Burk) F. H. Chen ex C. Y. Wu et K. M. Feng	(96)
四方藤	<i>Cissus hastata</i> (Miq.) Planch .	(98)
白茅根	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb .	(100)

## ● 六画

吉祥草	<i>Reinechia carnea</i> (Andr.) Kunth	(102)
老鸦嘴	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb . .....	(104)
地枫皮	<i>Illicium difengpi</i> K. I. B. et K. I. M .	(106)
地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> L .	(108)
吊兰	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Baker	(110)
朱砂根	<i>Ardisia crenata</i> Sims	(112)
竹节蓼	<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell. ex Hook.) Bailey	(114)
羊角扭	<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Am . .....	(116)

多花蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb .	(118)
寻骨风	<i>Aristolochia mollissima</i> Hance	(120)
阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl .	(122)
红花	<i>Carthamus tinctorius</i> L .	(124)
红花酢浆草	<i>Oxalis corymbosa</i> DC .	(126)
红毛毡	<i>Ardisia mamillata</i> Hance	(128)
红丝线	<i>Peristrophe roxburghiana</i> (Schult.) Brem .	(130)

### ● 七画

走马胎	<i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf	(132)
苎麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud .	(134)
杜茎山	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll .	(136)
杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i> Planch .	(138)
两面针	<i>Zanthoxylum mitidum</i> (Roxb.) DC .	(140)
扭曲草	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poir .	(142)
连钱草	<i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr .	(144)
旱莲草	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L .	(146)
伽蓝菜	<i>Kalanchoe laciniata</i> (L.) DC .	(148)
陆英	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl .	(150)
鸡血藤	<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn	(152)

### ● 八画

泽兰	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel	(154)
茅莓	<i>Rubus parvifolius</i> L .	(156)
枫树	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	(158)
虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc .	(160)



罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	
var. maki	(S. et Z.) Endl .	(162)
罗勒	<i>Ocimum basilicum</i> L .	(164)
爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.)	
Planch .		(166)
金樱子	<i>Rosa laevigata</i> Michx .	(168)

### ● 九画

扁担藤	<i>Tetrastigma planicaule</i> (Hook. f.) Gagnep .	(170)
胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb .	(172)
南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb .	(174)
南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burt et Hill	(176)
南蛇筋	<i>Caesalpinia minax</i> Hance	(178)
柞木	<i>Xylosma longifolium</i> Clos	(180)
枸骨	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxt .	(182)
骨碎补	<i>Drynaria bonii</i> Christ	(184)
香胶木	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Roxb .	(186)
络石藤	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem .	(188)

### ● 十画

海桐	<i>Pittosporum glabratum</i> Lindl .	(190)
凌霄	<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	(192)
珠兰	<i>Chloranthus spicatus</i> (Thunb.) Makino	(194)
荷莲豆	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. et	
Schult .		(196)
桃树	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	(198)
桃金娘	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk .	(200)

鸭嘴花	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	.....	(202)
铁苋菜	<i>Acalypha australis</i> L.	.....	(204)
铁包金	<i>Berchemia lineata</i> (Linn.) DC.	.....	(206)

● 十一画

杪椌	<i>Alsophila spinulosa</i> (Wall ex Hook.) Tryon	.....	(208)
救必应	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	.....	(210)
野牡丹	<i>Meibomia candidum</i> D. Don	.....	(212)
崖姜	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall.) Ching	.....	(214)
铜锤玉带草	<i>Pratia nummularia</i> (Lam.) A. Br. et Aschers.	.....	(216)
假黄皮	<i>Clausena excavata</i> Burm. f.	.....	(218)

● 十二画

落葵	<i>Basella rubra</i> L.	.....	(220)
黑心姜	<i>Curcuma phaeocaulis</i> Valetton	.....	(222)
紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	.....	(224)
紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	.....	(226)
筋骨草	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	.....	(228)

● 十三画

鼠牙半支	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	.....	(230)
鼠曲草	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	.....	(232)

● 十四画

榕树	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	.....	(234)
翠云草	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring	.....	(236)



## 一 匹 綢

**别名** 白面木鸡、白背丝绸。

**来源** 为旋花科银背藤属植物白鹤藤(*Argyria acuta* Lour.)的全草、根、藤及叶。

**形态** 多年生大型缠绕藤本(图1)。长可数米,幼枝具条纹,质软被白色短柔毛。单叶互生;叶柄长,叶片卵形至椭圆形,先端短尖或钝圆,基部浑圆或微心形,边缘有波状稀齿,上面粗糙,有皱纹,无毛或近无毛,叶背密被银白色紧贴的柔毛,羽状脉,整齐而明显。聚伞花序顶生或腋生,花序轴长,密被银白色柔毛;花梗短,长5毫米;萼片5个,长圆状卵形或卵形,外面的长9~10毫米,内面的较短,外密被银白色柔毛;花冠漏斗状,白色,外被银白色状毛,顶端5深裂,裂片长圆形;雄蕊5个,内藏,子宫4室。花期秋季。浆果近球形,胭脂红色,为卵形。果期于秋冬季间。

**分布** 生于山坡草地或灌木丛中。分布于广东、海南、广西及云南等省区。

**采制** 秋季采收。割取茎叶,除去杂质,晒干。

**药材性状** 茎扭曲,表面暗灰棕色,有纵沟纹,断面绿白色,有明显的维管束,淡棕色。叶稍卷曲,易碎,表面暗棕色至紫色,背面浅灰绿色,密被长柔毛。

**性味归经** 苦、辛,凉。入肝、肺经。

**功效** 止血、消肿。

**用法用量** 内服,9~15克;外用适量。

**验方**

1. 内伤出血:一匹綢叶、虎杖、旱莲草、龙芽草各30克,水煎服。
2. 跌打损伤:一匹綢30克、榕树气根15克,水煎冲酒服。
3. 跌打后遗症:一匹綢叶、杨梅树皮、洋木瓜叶各适量,共捣烂,用酒炒热,先熨后敷患处。



图 1 一匹綢

# 七 叶 莲

**别名** 七叶藤、七加皮、狗脚蹄。

**来源** 为五加科鹅掌柴属植物鹅掌藤(*Schefflera arboricola* Hayata)的茎及叶。

**形态** 常绿蔓性灌木(图2)，高达3米。茎圆筒形，光滑，有细纵条纹，质硬叶互生，掌状复叶，有长柄，柄基部扩大，小叶通常7片，故称“七叶莲”，革质、长椭圆形，两端钝，全缘、叶面绿色，有光泽，叶背淡绿色、网脉明显。开绿色小花，伞形花序集成总状花序，顶生。花萼、花瓣、雄蕊常绿，5~6个；子房下位，6室，花期于春季。核果球形，橙黄色。

**分布** 生于沟谷常绿阔叶林中。分布于江西及东南部各省区。

**采制** 全年可采，多用鲜品，也可晒干备用。

**成分** 嫩枝和叶含少量挥发油。

**药理** 有麻醉、止痛作用。

**性味** 苦、甘，温。

**功效** 麻醉、止痛、消肿。

**用法用量** 内服，煎汤9~15克(鲜者30~60克)。

**验方**

1. 跌打损伤：七叶莲、酒糟各适量，共捣烂，用芭蕉叶包好煨暖、敷患处。

2. 外伤性关节脱位、软组织挫伤充血、疼痛：七叶莲嫩株、叶适量，捣烂，加少许童尿，包好煨热后，敷患处。

3. 外伤出血：七叶莲适量，捣烂敷患处。



图 2 七叶莲

# 七叶一枝花

**别名** 重楼、枝花头、灯台七。

**来源** 为百合科重楼属植物七叶一枝花(*Paris polyphylla* Smith)的根状茎。

**形态** 多年生草本(图3)，高达50厘米。根状茎(生时)棕褐色，横走，质肥厚。粗可达3厘米，表面粗糙具节，节上生纤维状须根，茎单一，直立，圆柱形，光滑无毛，基部常为紫红色。叶通常七片，亦有3~5片不等，轮生于茎顶，状为伞形，其上生花1朵，故称“七叶一枝花”，叶矩圆形或倒披针矩圆形，基部圆形或罕为急尖。花瓣丝状，近顶端渐变尖，长等于或长于花萼的2倍，宽约1毫米；黄绿色花，单独顶生，卵状披针形。花期于夏季。蒴果室开裂。

**分布** 生于山坡林下及灌木丛阴湿处。分布于江西、广东、四川、贵州、云南、西藏等省区。

**采制** 野生品夏、秋季采挖；栽培品栽后3~5年秋末采挖。切片，晒干备用。

**成分** 含生物碱和氨基酸。

**药理** 与戊巴比妥钠有显著协同作用，并有镇痛作用。抗绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌。甲醇提取物具有止血作用。

**性味** 苦，寒。有小毒。

**功效** 消肿、止痛。

**用法用量** 内服，水磨汁冲服，1~4克；外用适量，磨水或研末调醋敷患处。

## 验方

1. 各种毒蛇咬伤：七叶一枝花(根状茎)、八角莲、金果榄、半边莲各6克，徐长卿、紫花地丁各9克，王瓜根12克。鲜品捣烂外敷局部，每日1~2次。

2. 内伤：七叶一枝花根茎1寸(干品)，白酒5~30毫升，在碗中磨成汁，冲服，每日2次。





图3 七叶一枝花