

沈氏醫案序

細閱魯珍沈先生醫案。用藥大抵豁痰清火之方。十有六七。不知者妄議爲偏於清火。殊不知先生盛名幾十載。其全活定以萬計。記載醫案亦豈僅此一卷。宜溫其涼。宜攻其補。輒中肯綮者。未易勝數。予生也晚。無由窺其全豹。此恨事也。且就此一卷而論。其所施清火豁痰之品。俱出人意外。高人一等。庸醫之共見爲虛寒者。彼獨確見爲痰爲火爲鬱結。援引內經及丹溪東垣諸說。指證明晰。窮詰原委。且爲主病兼病之分。治標治本之論。次第不紊。謬略昭然。真若飲上池之水。而洞見臟腑者。豈同俗醫之約略彷彿。見外症而不審虛實。舉一節以概其餘。或執一己之私。或矯同道之說。或勦襲成方。而不思貫通。或攻爲奇異。以示聰明。以他人之性命。試我技術之短長者。所可同日語哉。若使先生果偏於清火。何以於後方所載。有時症而即施參橘。後用六味丸收功。發熱而急進參芪。後用歸脾湯調治。乃知虛弱之症。宜補而補。仍能補人之所不能補者也。偏於清火之說。可不辨自明矣。僭弁簡首。以爲闕此書者解其惑。

庚午十月禮江閣邱松山氏記

沈氏醫案

沈魯珍著 蕭山謝誦穆校訂

汪周拔二令郎。年二十二歲。新婚之後。乃租督課頗嚴。館于別業。經年不入韓房。肝火抑鬱而不舒。擾其精房而成夢遺。馬元儀以補腎滋精之藥治之。甚至厥逆不醒。謂其爲虛欲脫。竟以參芪鹿茸河車等藥補之。日甚一日。肌肉消瘦。臥牀不起。已經一載。于是延余診視。時八月下旬。見其飲食少進。嗳氣而大便燥結。五六日一解。語言默默。小便黃赤。診其脈息。沉細帶數。察其形。唇口面色皆紅。肌肉雖瘦。潤澤而不枯。夜間坐而不臥。無倦怠之意。日間只食薄粥二盞。按其胸腹。板硬不和軟。此因補藥太過。壅塞腸胃。氣道不行。不能宣通。正所謂大羸有實也。因投以二陳加萊菔子山梔枳殼香附厚朴。仲元明粉服之三劑。後大便去結糞三五塊。胸次稍寬。語言稍出。又進礞痰丸三錢。又去結糞五六塊。再服前煎方五六帖。大便去粘膩而黑色者不計。間與礞痰丸及清火理氣之藥。如得通泰。自是可進稀粥六七碗。然亦不覺大飢。又以保和丸加黃連。早晚服之。兩月後可進乾飯。余往還兩月。而門人蔡滄文居其家。常爲調理。至冬至後。步履如常。居宿于內。新春到舍奉謝。酬以千金。此康熙四十八年之事。其人號麗天。至今無恙。今元儀謂是渠調治而安。欺妄無恥。卽此一案。可知其無不說謊。無一可信。而猶謬自著述。附會于他人之書尾。真鬼蜮也。雍正八年。海上沈璠。時年七十有八。

天老久服右歸飲。其中有桂附甘草。甘草甘緩。不能下達腎家。桂附之性。留戀胃中。其熱性升而不降。所以兩足不煖。河間云。兩足冰冷者。此火不下降也。火降則足自煖矣。熱藥之性。積而不散。煅煉津液成痰。今交相火司天泄。卽東垣所謂地之濕氣。卽爲汗也。診得脈息左手沉弦帶數。此肝火不靜也。右手滑大。關部尤甚。此胃中痰飲不消也。恐其大便燥結。痰涎上壅而嘔吐。釀成噎膈。反胃之症。內經云三陽結謂之屬。丹溪云。噎膈之症。多起于

血枯痰膩。多升少降。大忌香燥熱藥。惟以豁痰清火潤澤之藥。而使大便不燥結爲第一着。

在老向有咳嗽之疾。緣勞心過度。外爲風寒所觸。內鬱之火竊發。土干肺家而咳嗽。已經四載。今交相火司天之年。內外之火。交相煽動。咳久肺絡受傷。痰中帶血。脈息左手弦細帶數。右手虛大帶滑。此係腎水不足。不能榮養肝木。肝火升騰爍金。難經云。東方實。西方虛。瀉南方。補北方。理宜滋陰降火。納氣歸源之藥治之。煎丸並進。并宜寂靜調攝。庶不致喉燭聲啞。釀成勞瘵也。

可考數年前曾患血症。服寒涼之藥。得以相安。去年血症復發。他醫悞進熱藥。以致火來乘金而咳嗽。究其受病之源。腎水不足。不能榮養肝木。木火升騰。血隨火沸而出。今歲少陽相火司天。內外之火。交相煽動。致頻咳而咽喉痛。肺與大腸相爲表裏。火流於肛門而發毒。目前脈息弦細帶數。此腎水虧損。相火上炎。肺金受困之症。反以桂附炮姜等燥熱之劑。耗其腎水。燼其肺金。意欲求愈。難之至也。今且用滋陰降火保肺之藥。并應寂靜調攝。不使咽喉作楚。庶有佳兆。

生地

麥冬

地骨皮

川貝

苡仁

鮮百合

牛膝

知母

黃柏

瓜蒌霜

加茅根頸

因酒傷胃。胃中之血凝滯不散。隨氣上升。而吐黏膩紫色之血。此瘀血也。理應理氣消瘀之藥治之。使氣順而不上升。則血自下行。而不至上逆矣。誤用滋陰之藥。遂致胃中之瘀瘀不清。隨致上千肺家而咳嗽。胸膈不舒。脈息弦滑。此係胃中之瘀瘀不清。肝家有火之故也。暫用理氣消瘀清熱和胃之藥爲治。俟胸膈舒暢。然後以滋陰之藥。爲善後之計。治血症必先理氣爲主。氣順則血自歸經。此萬古不易之法也。

香附

山梔

桃仁

牛膝

廣皮

枳殼

歸尾

黃芩

丹參

茅根

平素善飲。酒性大熱有毒。貯于胃中。燔灼津液而發渴。因將寒涼生冷之物。恣意而啖。致火鬱遏。不得發泄。流於

經絡而環跳作楚。入于腸胃而作血痢。達於肌表而皮膚作痒。乾燥內火不得疎泄。擾其津液而愈渴。脈息沉濁。此鬱火未經發越之故也。理宜和胃清熱疎理之藥為治。并忌醇酒厚味生冷等物。

〔煎方〕

白芍

甘草

黃連

黃芩

香附

厚朴

山梔

滑石

木通

〔丸方〕

蒼朮

黃柏

黃芩

山梔

香附

廣皮

枳殼

石羔

白蒺藜

木通煎湯法丸

季老受病之源。得之君火司天之歲。夏令炎熱之時。感冒暑熱之邪。以致大便洩瀉。卽內經所謂暴注下迫。皆屬于火也。熱邪上衝。心生血。肝藏血。肝為相火。兩火相燔。則血隨火沸而上逆。肝為將軍之官。其性暴。主疎泄。其氣鬱而不舒。逆于腹中。則腹不寧。不時嘆氣。準繩云。嘆氣火土之氣。鬱而不舒也。氣道不舒。故蹇于語言也。肝火不得疎泄。上升則頭眩。下降則腹作鳴。胃主肌肉。犯胃則肌肉跳動。擾其精房。則夢遺泄滑。心藏神。肝藏魂。二火相燔。則神不寧。而臥不安也。陽事者。宗筋之會。肝之所循。火亢于上。故常舉而不痿也。得以小便而痿者。肝火從溺而泄也。蓋下有二竅。有水道。有精道。精道閉則水道開。水道閉則精道開。脈息沉而帶數有力。種種諸症。皆係肝氣鬱而不舒。肝火不得疎泄之故也。理宜清肝火。疎肝氣。利水道之藥治之自愈。但時值冬令閉藏之月。木火內伏。不能條達。至春氣發生。木得疎泄。自然却去病蒂矣。

龍膽草

黃柏

連翹

山梔

夏枯草

木通

青皮

香附

枳殼

賓老平昔嗜酒。酒性溫熱。積于胃中。薰灼于口。而舌為之糜碎。下注膀胱。而小便為之渾濁。綿延已久。脾氣大虛。飲食減少。而覺無味。脈息短小。此脾虛而濕熱未清也。理宜健脾氣。清濕熱。加味六君子為治。

白朮

人參

甘草

熱半夏

廣皮

白葛根

茯苓

黃連

石羔

薑香

加生姜

陰虛火炎而吐血。上燥肺金。腠理不密。外邪乘虛襲肺。而咳嗽入於大腸。腹中作痛。下利見血。脈息洪大。此火得風而熾也。理宜疏風理氣之藥為治。俟咳嗽稍平。然後以滋陰降火之藥培其本。

蘇子

杏仁

枳殼

廣皮

前胡

薄荷

白芍

甘草

黃芩

香附

加生姜

蘇州吳佐臣案。經云。陽絡傷則血外溢。因勞力過度。有傷胃絡。血瘀胃中。則肝火上升而吐。所來之血。厚而黏膩。此瘀血也。理宜消瘀降火順氣之藥治之。又因補之太早。餘瘀未盡。所以今春復吐。既吐之後。陰血有虧。肝火上升。燥肺金而咳。脈息弦細帶數。此腎水虧損。肝火妄動。肺金受困之象也。理宜滋陰降火保肺之藥為治。

生地

丹皮

麥冬

川貝

白芍

北沙參

瓜蔞霜

黃柏

知母

地骨皮

加蓮子

南匯東門外周振育。經云。九竅不通。腸胃之所生也。胃中痰積壅滯。不得通泰。所以鼻為之病。逐去胃中之痰積。使從大便而出。則鼻竅自利矣。

半夏

廣皮

枳殼

香附

瓜蔞

山梔

黃芩

木通

萊菔子

加生姜

又服瀉痰丸

薄荷

黃芩

山梔

鮮菖蒲根

加姜

南匯東門外金時成。胃中有痰。外受風寒。鬱而不舒。上干肺家。肺家閉塞而聲啞。非勞病久嗽之聲啞也。

半夏

廣皮

杏仁

蘇子

枳殼

前胡

嘉定王佩玉令姊。肝火鬱于胃中。不得條達通暢。以致作脹攻衛作嚮。注於大腸。則爲泄瀉。脈息弦數。經事不至。此乃木鬱土中。理宜扶脾疏肝之藥。

香附	白朮	黃芩	枳殼	廣皮
山梔	厚朴	青皮	白芍	水煎
半夏	廣皮	枳殼	瓜薑實	
厚朴	香附	山梔	加姜煎	

東山夏姓。胃中濕痰隨火下注精房而遺滑。誤以補腎滋精之藥治之。以致濕痰糾結于胃。飲食少進。難以運化。脈息弦滑。右手關部尤甚。胃中有濕痰。肝家有鬱火也。理宜豁痰清肝之藥爲治。

半夏	廣皮	枳殼	瓜薑實				
厚朴	香附	山梔	加姜煎				
魏提臺	年六十九	平日勞心思慮。氣結痰凝于胃。春三月得不寐之症。每至夜間。胃中如焚。煩躁不寧。目不交睫。晝則稍安。毫不倦怠。飲食雖進而無味。諸醫俱云心血不足。用天王補心丹。有議心腎不交。而用加味地黃丸。有議思慮傷脾。而用歸脾湯。愈發日甚。將有發狂之兆。如此者兩月餘。延余診視。面色紅亮而浮。脈息沉小滑而有力。關部尤甚。此乃肝火鬱而不舒。胃中膠痰固結而不通也。經云。胃不和則臥不安。又云。陽明病不得眠。大便三四日一解。用礞石滾痰丸三錢。大便去黏膩之痰不計。二便如火。以二陳石羔。黃連。山梔。石菖蒲。鈎藤。瓜薑實。枳殼。連進四帖。即能安臥。然有時胃中如火。又用滾痰丸三錢。又去白痰碗許。仍用前豁痰清火之藥。丸服二十日全愈。一月後又停食冒風。胃脘作痛發熱。用消導之藥平安。後用加味六君子湯調養。康健倍常。					
分巡道朱一鳳	幼孤而貧。讀書作文。借酒陶情。濕熱蘊蓄於胃中。上薰于口而糜爛。愈後或每月一發。或兩三發。大便燥結不渴。畏茶湯。先以蒼朮。厚朴。廣皮。旋覆花。石羔。枳壳。黃柏。萊菔子。湯藥連進三劑。頗覺相宜。細思濕痰非湯液所能治。即以前藥去旋覆。加瓜薑實爲末。用淡姜湯法丸服半月。覺膈舒暢。大便去黏膩痰飲不計。口內						

不流涎亦不糜爛矣。俊宜徐和脩。平昔嗜酒。則知濕熱之蘊于胃者久矣。加以夏令熱邪侵襲。至收斂于內。交一陽和動之時。內斂之邪。流動發越而爲痢。春夏邪氣散漫。流注經絡而作痛。俗名痢後風也。診得脈息左手弦。右手弦且滑大。此濕熱滯于腸胃。失於推盪。以致流注經絡。而支節腫痛。治宜理滯氣。清濕熱之藥。

厚朴

枳壳

廣皮

木通

滑石

蒼朮

黃芩

黃柏

秦艽

加桑枝煎

張壽南。肝火鬱於胃中。不得竦泄。而寒熱如瘧。胃脘或時作痛。脈息洪大而弦滑。此胃中有痰。肝家有鬱火也。宜豁痰理氣疏肝之藥爲治。并宜清虛淡泊。則胃中清爽。而痰自無矣。

柴胡

青皮

半夏

廣皮

山梔

香附

黃芩

甘草

枳壳

加姜煎

松江張殿舟。天稟素弱。腎水不足。夏令兼暑熱之邪。至秋發瘧。瘧愈而暑邪未清。補劑與葷腥太早。致餘邪未清。流注于背脊支節之間。作痛擾其胃中。之血下流。而爲便紅。至春令發生三月。餘邪外達。復寒熱如瘧。交夏令內伏之火炎炎而熾。加之酒熱助火。胃中之血隨火而升。脈息左手弦數。此肝火妄動也。右手洪大。此胃中之火不靜也。火來燬肺。故痰中帶血。肺氣布于胸膈。致氣升不舒。目下降氣清火。火降則血降。治血必先理氣。氣降則血自歸經。而不致上逆矣。暫用理氣清火。服四劑後。胸次舒暢。氣不上升。然後以滋陰降火清金保肺之藥治其本。并宜戒惱怒。忌一切肥膩辛辣醇酒厚味爲主。

生地

蘇子

鬱金

丹參

枳壳

黃芩

山梔

棗仁

薑仁

白芍

川連

牛膝

荷葉汁

茅根

娘娘。肝家之火。鬱而不舒。煥爍津液成痰。隨火上升。咽嚥之間。結成有形之象。升降無時。上升則頭眩耳鳴。降下則兩足麻痺而熱。脈息左手弦數。右手帶滑且大。此乃鬱痰鬱火症也。理宜和胃豁痰清肝之藥治之。并忌醇酒厚味。戒惱怒爲要。(唐駢玉令堂)

川連

黃柏

石羔

半夏

廣皮

香附

山梔

桔梗

甘草

瓜萎

夏枯草

加姜煎

丸方加貝母

夏枯草湯法

太倉錢因之令媳娘娘平昔有肝火。所以善怒。每每產後必作血暈。此因肝火而作暈也。懷娠之時。肝氣鬱而不舒。鬱之既久。則產後空虛。其火上衝而作暈。平時兩足冰冷。此火不下降。火氣上蒸于頭。則髮墮目下。懷娠六月。腰痛而帶下。飲食少進而作暈。脈息弦數。此腎水不足。不能榮養肝木。鬱于脾土之中。恐火氣擾其血分。而有墮胎之慮。理宜扶脾疏肝。清火之藥治之。

白朮

白芍

條芩

枳壳

香附

廣皮

白茯苓

黃柏

甘草

崇明龜永和

瘦火鬱于胃中。不得通泰而作痛。用通利之藥。肛門覺熱。小便黃赤。此火氣下降也。因痛而飲燒酒。得以暫止者。蓋熱得熱。則同氣相求。似乎相安。而實助其爲患也。理宜清火和胃理氣之藥爲治。

半夏

廣皮

黃芩

石羔

香附

山梔

青皮

枳壳

黃柏

瓜萎實

揚州東門外顧友仁兄。飢飽不時。惱怒傷肝。有傷胃絡。經云。陽絡傷則血外溢。致吐瘀血。已延四載。不時竊發去血過多。陰分受傷。肝火上燒肺金而咳嗽。痰涎頗多。脈息左手弦而帶數。此肝火妄動也。右手又見滑大。此胃中有痰也。先宜戒惱怒。省言語。調飲食。避風寒暑熱。靜養調攝。并服滋陰降火。保肺清金之藥爲治。

生地

丹皮

川貝

廣皮

麥冬

骨皮

白芍

瓜蔞霜

崑山邵政平令郎。腎水不足。不能榮養肝木。肝火上升。外受風寒。胃中之痰。隨火上升。肺家而爲咳嗽。用發散之藥。升提其火。以致吐血咳嗽不止。痰涎頗多。至五月初復發。脈息弦數。此水衰火亢。肺金受困之症。理宜滋陰降火。保肺之藥治之。

生地

丹皮

麥冬

白芍

黃柏

知母

貝母

丹參

骨皮

牛膝

加茅根煎

東山劉永傳。瘧疾之後。飲食不節。脾傷不能運化。而成積滯。胸腹脹滿。按之堅實。日漸以大。大便或結或溏。後重。不爽快。面色痿黃。脈息左手沉弦。右手滑大。此肝氣鬱而不舒。胃中積滯糾結不清也。理宜扶脾胃。鍊肝氣。消積滯。

瓣藥。

白朮

枳實

半夏

廣皮

香附

山梔

厚朴

青皮

萊菔子

山查

濮院吳廷來。胃脘作痛而嘔吐。乃肝火鬱胃而成。誤服熱藥。幾至危殆。用清火和胃之藥。嘔吐已平。但鬱久未清。有時上逆。脈息弦數。此胃不和而餘火未清也。當以和胃清火之藥治之。

半夏

廣皮

山梔

香附

石羔

川連

瓜蔞

青皮

枳壳

加姜

平湖陳晉公。平素多思多鬱。肝火鬱于胃中。不得疏泄。煅煉津液成痰。阻滯氣道。飲食入胃。則作脹而痛。近因春令。肝木用事。惱怒傷肝。以致左脇作痛。以手按之亦痛。肝爲藏血之臟。怒則傷肝。而血爲之鬱。經云。大怒則薦于上。令人薄厥。將來慮其隨火上升而吐。脈息沉弦而濁。此瘀血阻滯。胃中作痛也。理宜行滯消瘀。理氣之藥治之。

今先用一味大黃丸。以逐胃中之血。從大便而出。并慮其成噎膈之症也。

桃仁

歸尾

鬱金

牛膝

香附

山梔

青皮

半夏

廣皮

大便黑色故知其有瘀血也。

服酒蒸大黃丸二錢。大便去結糞黑色黏膩之物不計。肛門覺熱。則知鬱與瘀血無疑矣。但胃中尙未清爽。所以胸膈不能寬暢。背心作痛。在此肺膽也。經云。諸氣膶鬱。皆屬於肺。因鬱之久。火氣不能通達。以致作痛。今診得脈息弦大帶數。因服通利之藥。火氣得以發泄故也。調治之法。先講開鬱消瘀潤大便為要。結則肺膽不通而痛。內經云。三陽結為之膈。三陽者。大小腸膀胱也。結于下則反之于上。而噎膈之症來矣。常將湯液滑潤之物。滋其大便。并服蔗漿梨汁蘆根汁。而使大便不燥結為妙。

白芍

甘草

桃仁

當歸

鬱金

香附

山梔

枳壳

半夏

廣皮

夏枯草煎湯服

黃江涇沈上林令堂。娘娘受病之原。得之惱怒。抑鬱之于胃中。煅煉津液成痰。隨肝火上升於結喉。皮裏膜外。結成痰塊。氣滯而日漸以大。內經云。榮氣不從逆於肉裏。乃生壅腫。因氣滯而痰凝不散所致也。脈息左手沉弦。右手關部獨見沉滑。肝家有鬱氣鬱火。胃中有膠痰糾結。理宜理氣豁痰之藥為治。并忌醇酒厚味等物。

半夏

廣皮

萊菔子

蕕實

枳壳

香附

山梔

黃芩

夏枯草

白芥子

青皮

丸方加海石竹瀝生姜

壽南兄。去冬感受寒邪。背脊惡寒。寒束其火。不得疎泄。流注於胸脇之間。攻衝于胃。或痛或不痛。寒熱似瘧。此冬令寒邪。至春發越。故為寒熱也。悞用參芪白朮。閉其腠理。邪氣內伏。故寒熱雖止而不清。肺家則為咳嗽。脈息洪

大而弦。此內火鬱而不舒。理宜豁痰理氣疎肝之藥治之。連進數劑。自然全愈矣。

柴胡

茯苓

甘草

枳壳

半夏

青皮

廣皮

山梔

香附

前胡

加姜煎

常州江甸方。幼時有夢遺之病。此肝火妄動。擾其精房而來。醫者俱以補腎滋精之藥治之。其火不得下降。反以桂附助其火。其火愈熾而上升。血隨火沸而衄血。今值純陽之月。內火與外火。交相煽動。而胃中之血。大吐不止。胸膈不寬。喉中作痒。此吐後不歸經絡之血。留滯膈間。肝火鬱而不舒。脈息左手弦數。右手洪大有力。此胃中餘瘀未盡。肝火不靜。理宜消瘀清火理氣之藥治之。并宜清虛淡泊。一切醇酒厚味。暫宜停止。俟胃中氣降火降。胸膈寬舒。然後議調補之法。爲善後計。

桃仁

歸尾

香附

山梔

牛膝

丹參

白芍

青皮

滑石

黃芩

茅根一兩

先服酒蒸大黃三錢

青浦潘麗文兄。飢飽不時。外邪乘虛襲肺而咳嗽。痰中帶不鮮明之血些少。因不避風寒。不忘葷腥。誤作勞症吐血而醫治。鬱其血邪在內。不得發越。綿延至今。咳嗽日甚。嗽極則嘔。胸膈不舒。大便滑洩。小便黃赤。肛門發熱。脈息左手弦大帶數。右手滑大帶數。此胃中有瘀。肝家有火。鬱之既久。乘夏令火氣發越之時。肺家之火。流注于大腸。而爲滑洩。並非脾虛作瀉也。理宜降氣豁痰。清火之藥爲治。俟胸膈舒暢。痰火下降。肛門不熱。小便清白。然後以滋陰之藥培其本。暫忌醇酒厚味等物爲要。

半夏

廣皮

蘇子

杏仁

香附

石羔

黃芩

山梔

甘草

加生姜煎

平湖王永年。胃中之瘀。隨火升降。晝則行陽二十五度。隨火上升。滯于胸膈而作脹。按之有形。飲食難以下達。夜則行陰二十五度。隨火降下。而胸次舒適。注于精房而爲夢遺。脈息弦滑有力。此胃中之瘀。隨火升降而爲患也。

理宜豁痰清火之藥治之。

半夏

廣皮

冀實

黃柏

枳壳

香附

梔子

萊菔子

川連

加姜煎

上洋馬頭渡李雲甫媳。二十歲。于二月十四日。患脇痛氣喘。不得臥。數日。諸醫皆以風寒發散。或用降氣等藥。不能取效。平希于以爲肺脰。法在不治。余適往外家。經過門首。邀余診視。見其面青氣喘。兩脇作痛。不能合眼而臥。其母其姑俱備後事。在患者之旁。患者見之淚下。診其脈。兩手弦急。無痰聲。鼻不煽。無汗出。卽示未爲絕症。後事且緩。病者安心。心安則能安枕。此亦法也。此症當春令肝木旺之時。木火垂金。因擬一方。用白芍。甘草。瓜蒌。川貝。黃連。石羔。廣皮。鈎藤。蘇子。用生鐵二兩。煎湯煎藥。一劑後卽能安臥。希于至。見其安臥。問余用何宗湯藥。此症木旺。故用鈎藤生鐵。助金以平肝。黃連清心火。石羔清肺平肝。蘇子降氣。貝母橘皮瓜蒌降痰潤肺。白芍甘草緩肝。彼亦心服。後皆希于調治而安。

浙江江西新城李益書。平素服八味丸歸脾湯。數年後覺胸中痰火鬱結。大便五六日一解。頭面烘熱而紅。此因桂附太多。積熱於胃。煅煉津液成痰。脈息數大。用清火疏理之藥。病勢稍減。然苦于大便燥結。胸腹如燎。此鬱火不能外達。用涼膈散一兩。以瀉其鬱火。十月初旬用藥起。至次年正月下旬。腹中舒暢。肛門不熱。後服滋陰降火之劑而愈。

川沙北門外金隆吉令郎。二十二歲。七月初旬。患時症。發狂譫語。氣急痰升。不能安臥。諸醫以黃連石羔連翹等清火之藥治之。半月不愈。迎余診視。面色唇口皆紅。身無大熱。按之胸腹和軟。大便滑瀉。小便清利。痰聲作齁。脈息虛大。不能安臥。細究此症。若陽明胃實。大便必結。胸腹按之必實。舌必黃胎。今無是證。觀其小便不禁而利。惟痰聲齁齁。此乃少年不謹。暑熱之邪。傷其元氣。清熱之藥已多。不能見效。難于下藥。以人參一錢。橘紅一錢。煎徐徐與之。以扶元氣而化痰。服完平安。又復煎與之。一晚計服人參七錢。橘紅七錢半。兩日服人參橘紅四兩。痰聲

下降。人事清爽而熟睡。復用六味丸生脈散調理而愈。

柴場灣唐虞在令政。懷娠七月。正月春初。倏而眩暎。兩手癰癩。不能言語。不省人事。面色紅亮。脈息左手弦而帶數。右手滑大有力。此肝火熾盛。上衝于胃。胃中之痰擾心肺之竅。而昏曠不省人事。因此而胎亦墮。用二陳加黃連。鈎藤。山梔。鮮石菖蒲。膽星。枳壳。鬱金。沖童便梨汁竹瀝姜汁。連進二劑。即能開口。而知人事。小產彼亦不知。後用涼血。生地。丹皮。鈎藤。黃連。廣皮。丹參。鬱金。石菖蒲。甘草。加蓮子調理而安。

蘇州閻門外益隆號程希文。伏暑未清。棄天士用參朮補之。以致胸腹作脹。攻衝不寧。不能安臥。已經兩月。至十月十五日。延余診治。小便黃赤。飲食不進。用二陳加厚朴。青皮。香附。黃連。滑石。枳壳。四劑而諸症皆退。後用六味而全愈。

閩門外上津橋陳友文令郎。正月患咽喉作痛。用滋陰清火之藥。咽痛已除。而胸膈滿悶。痰涎上壅。飲食不進。不得安臥。已經兩月。邀余診治。門人杜良一同往。診得脈息甚大。口亦不渴。唯見痰涎上壅。胸中滿悶。而不能進飲食。此胃中有痰而不得臥。用滾痰丸三錢。下頑痰不計。即能安寢。而胸前舒適。復用二陳加石菖蒲。鈎藤。枳壳。連進四劑而愈。

蘇州齊門外蔣奶奶。寡居七載。勞心抑鬱。肝氣不能條達通暢。以致滯下腹痛後重。胸膈不寬而惡心。時當初夏。葉天士以爲不足之症。而用人參人乳等補劑。適余在吳門。延余診視。門人杜良一同往。診得脈息弦大帶數。腹痛後重。肛門如火。口乾氣急。此肝家鬱火。下注而爲滯下。上升而嘔惡。胸膈不寬。用黃芩芍藥湯。加厚朴。枳壳。香附。山梔。黃連。木通。滑石。一劑腹痛頓除。飲食可進。連用四劑。病止胸寬。復用香附。廣皮。厚朴。枳壳。黃芩。黃連而病愈。

上洋南關外周襄文。七月初往松江完糧。途中奔走。百有餘里。兼之飢餓。發熱自汗不止。倦怠乏力。語言難出。脈息虛大。諸醫以爲冒暑。議用香薷飲。延余診視。脈息虛無力。汗出如注。無氣力轉動。即曰。此熱傷元氣。飢餓勞倦。

所致。卽以黃芪五錢。人參三錢。白朮三錢。麥冬一錢。五味子七粒。連進三服。汗斂神復。以粥食與之。始得安臥。後用歸脾湯生脈散而愈。

崇明沈尙其三消之症不一。有火衰不能蒸其津液上騰。小便清白而味甘者。昔漢武帝患此。張仲景以八味地黃丸治之。今尙其正是此症。服藥已稍愈。惟口內乾燥。小便如膏。足無之力。乃虛火上炎。肺金受灼。內經所謂諸痿皆屬於肺熱。脈息虛大。理宜生脈散治水之上源。八味丸補火爲要。

〔煎方〕

人參

五味子

麥冬

玉竹

黃芪

金石斛

生地

天冬

加蓮子

澤瀉

茯苓

〔丸方〕

熟地

山萸肉

山藥

附子

桂枝

丹皮

天冬

麥冬

肉桂

澤瀉

崇明黃土端。肝火鬱于小腹。外爲寒涼所遏。不得伸越。以致結成有形之象。稍有所觸。上干肺家而作痛。攻衝不寧而嘔逆。脈息左手沉弦帶數。右手沉滑有力。此肝家有鬱火。胃中有痰飲也。理宜清肝火。疎肝氣。和胃豁痰之藥治之。

半夏

廣皮

香附

山梔

黃柏

桂枝

青皮

萊菔子

加生姜煎

黃土端後案。氣結于小腹之右邊。有形一條堅硬。此係外受寒邪。鬱其肝火。不得疎泄。遇冬令潛藏之月。火氣內伏。稍觸寒邪。則上干于胃。而胸膈脹滿。當以疎肝和胃清火之藥爲治。

蘇子

桂皮

沉香

枳壳

黃柏

香附

山梔

青皮

半夏

橘紅

瓜蒌

萊菔子

加姜煎

崇明沈天章。飢飽不時。胃絡受傷。血瘀于胃。以致胸膈不寬。而吐黏膩之血。屢次竊發。脈息弦數。此乃胃中瘀痰。

糾結不清也。理宜消瘀理氣豁痰之藥爲治。今晚先服酒蒸大黃丸二錢。以逐胸中之瘀滯。使其下行。清晨方可以前方服之。

桃仁

歸尾

牛膝

丹參

滑石

半夏

橘紅

香附

瓜蒌

枳壳

萊菔子

加生姜煎

沈天章後案。瘀血留滯于胃者日久。服消瘀煎劑。大黃丸二服。其血已從大便去矣。但去之猶未盡。再當以消瘀之藥。漸漸消之。使之下行。俟胸膈舒泰。氣不上升。即停丸藥。如覺氣升而逆。恐其血來。即以此方服之。

丹參

桃仁

半夏

廣皮

香附

滑石

茅根

牛膝

鬱金

瓜蒌

山梔

枳壳

丸方卽以本方加萊菔子

崇明袁達九。去夏感受暑濕之熱邪。加之飲酒太過。蘊蓄于胃。不能通暢。以致胸膈不寬。飲食不進。面色帶黃。小便短少而赤。大便燥結。脈息左手帶弦。右手滑大有力。此乃胃中濕熱積滯未清也。當以清濕熱和胃理氣之藥治之。

半夏

萊菔子

瓜蒌

滑石

厚朴

廣皮

香附

山梔

木通

枳壳

加姜煎

平湖江尚安。去春時症之後。不忌葷腥。致肺金不清。咳嗽吐血。延至冬令。火氣潛伏之時。內熱更甚。上升而燐肺金。咳嗽日甚。胸腹如燐。下注而肛門發毒。大便不實。目前夏令炎炎之勢。不足之金。奚堪燐灼。脈息細數無神。此乃水衰火亢。肺金受困之象。雖大便不實。乃肺虛因熱而跗蹠。非脾虛之症。燥脾之藥。不宜多服。惟以滋陰保肺。清熱之藥爲治。

生地

麥冬

丹皮

苡仁

橘紅

白芍

骨皮

白苓

川貝

加蓮子十粒

太倉沙頭鎮孫金祥。平素善怒躁急。內有肝火。得外之風寒所觸。上干于肺。而咳嗽之極。則血隨火沸而吐出。脈息弦數。此乃腎水不足。不能榮養肝木。肝火上炎而燼肺。肺金受困之象。理宜滋陰降火。清金保肺之藥。并宜戒惱怒。慎起居。不至釀成勞瘵也。

生地

丹皮

麥冬

骨皮

廣皮

川貝

瓜薑

黃柏

知母

杏仁

加蓮子砂仁

熟地

萸肉

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

五味子

枸杞

兔絲

磁石

砂仁

玉竹

麥冬

白芍

蓮肉

王敬哉令愛。女子十四而天癸至。今踰期不至者。此先天之真陰不足也。况有咳嗽吐血之症。乃水衰火亢。肺金受困之象。理宜滋陰降火保肺之藥為治。

生地

丹皮

骨皮

當歸

黃芩

白苓

花粉

麥冬

玉竹

加蓮子十粒

五灶蔡六老。胃中痰火糾結不清。干清虛之府。以致不得安臥。神魂不寧。脈息弦滑。此乃痰火充塞于胃也。先以滾痰丸二錢。淡姜湯下之。使痰從下竅而出。然後用豁痰清火之藥。并忌醇酒厚味為要。

半夏

廣皮去白

枳壳

石菖蒲根

加姜竹茹

瓜薑

菜菔子

鈎藤

黃芩

新場程君燉。先天腎水不足。相火妄動。上燼肺金。外邪乘虛襲肺。發爲咳嗽。已服過疏之劑。外邪已去。惟有火氣上炎而乾咳。脈息弦數。此乃火亢肺金受困之象。理宜滋陰火清肺藥爲治。

生地
丹皮
麥冬
杏仁
川貝
蘇子
瓜蔞仁
黃芩
山梔
地骨皮
加蓮子
生地
丹皮
麥冬
玉竹
瓜蔞霜
知母
川柏
加蓮子
熟地
天冬
麥冬
棗仁
川貝
知母
丹皮
骨皮
川柏
蜜丸白湯下
〔丸方〕
黃柏
知母
柴胡
半夏
廣皮
香附
枳壳
川朴
茯苓
甘草
知母
青皮
熟石羔
加姜煎
金澤蔣元信。食入卽吐。是有火也。脈息洪數。此肝火上衝于胃而吐也。理宜和胃清火之藥。
半夏
廣皮
茯苓
香附
石羔
黃柏
白芍
黃芩
加生姜竹茹茅根
嘉定西門外朱聖希。先天腎水不足。相火上炎。銷燬肺金而咳嗽。午後發熱。脈息虛大帶數。此水衰火亢也。理宜

服滋陰清肺之藥。咳嗽稍減。夜可安寢。脈息不數。此漸愈之佳兆也。但必得煎丸並進。并靜養調攝。可免勞瘵之疾也。
〔煎方〕
生地
丹皮
麥冬
玉竹
瓜蔞霜
知母
川柏
加蓮子
熟地
天冬
麥冬
棗仁
川貝
知母
丹皮
骨皮
川柏
蜜丸白湯下
〔丸方〕
黃柏
知母
柴胡
半夏
廣皮
香附
枳壳
川朴
茯苓
甘草
知母
青皮
熟石羔
加姜煎
北六灶楊啓林。去冬患瘧。三日一發。此內伏之暑邪。與胃中之痰積互爲患也。又因飲食不節。鬱而爲熱。胃中火氣上升而鼻衄綿延至今不愈。脈息弦大帶數滑。此胃中痰積未清也。先宜清虛淡泊。臨發之日。只宜以薄粥養之。并服豁痰疎理清熱之藥。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com