

袖珍中医妇科处方手册

临床实用中医处方系列

主编：李祥云

临床实用中医处方系列

3-62
XIUZHEN
ZHONGYIFUKE

CHUFANG
SHOUCE
LINCHUANG
SHIYONG
ZHONGYI
CHUFANGXILIE

文汇出版社

R289.73-62
300

袖珍中医妇科处方手册

临床实用中医处方系列

主编：李祥云

副主编：庄燕鸿

编写者：（按姓氏笔画为序）

王观敏 庄燕鸿

齐 聪 李俊青

李祥云 郑 锦



0166169



0166169

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

袖珍中医妇科处方手册/李祥云 主编. —上海:文汇出版社, 2000.9

(临床实用中医处方系列)

ISBN 7-80531-798-4

I. 袖... II. 李... III. 中医妇科学-处方 IV. R271.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39602 号

临床实用中医处方系列

袖珍中医妇科处方手册

主 编/李祥云

责任编辑/竺振榕

封面装帧/周夏萍

出版发行/文汇出版社

上海市虎丘路 50 号

(邮政编码 200002)

经 销/全国新华书店

印 刷/复旦大学印刷厂

装 订/上海宏达装订厂

版 次/2000 年 9 月第 1 版

印 次/2000 年 9 月第 1 次印刷

开 本/787 × 960 1/32

字 数/167000

印 张/8.75

印 数/1—3000

ISBN 7-80531-798-4/R·59

定 价/14.00 元

前 言

中医妇科学是中医临床学的重要组成部分。几千年来中医妇科在治疗经、带、胎、产等妇科疾病方面积累了丰富的经验，近年来，随着妇科疾病谱的变化，中医妇科在相关领域不断进行探索与研究，同时也为了对计划生育、妇科肿瘤的治疗与康复等方面作出贡献，中医妇科广大医务工作者在继承前人经验的基础上，勇于实践，勇于探索，取得了可喜的成绩，使中医妇科本身也不断得到了充实与发展。本书从这一实际情况出发，内容上既汲取了古人在临证方面的经验，又融入现代中医妇科的精华，以“内容丰富实在，临证切实可行，方药可靠有效，心得启人深思”为编写宗旨，目的是为临床第一线的中西医医生、研究生、实习生及广大知识妇女提供一本符合现代临床、行之有效的中医妇科处方用书。

本书按经、带、胎、产、妇科肿瘤、计划生育及并发症、妇科杂病的顺序编目，每一条目下再以病名为细目进行编排，考虑到临床的实际情况，细目大多采用西医病名，部分采用中医病名。每一病名下，分概述、基本方、按语三部分编写。概述主要阐述该病的基本概念、临床表现、常见证型、中西医对本病的认识，力求言简意赅；基本方包括方药组成、方义、加

减，要求处方配伍合理，安全有效，加减灵活，反映出中医辨证思维的严密性和临证用药的灵活性；按语多是作者多年临床的心得体会和对该病的防治建议，以抛砖引玉。

由于时间及水平所限，本书难免有不足之处，祈望同道不吝赐教指正。

编 者

2000年4月

目 录

前言 (1)

第一章 月经病 (1)

月经过多(1) 月经过少(3) 月经先期(6) 月经后期(8) 月经先后不定期(10) 经期延长(12) 经间期出血(14) 崩漏(17) 功能失调性子宫出血(21) 黄体功能不全(23) 痛经(26) 子宫内膜异位症(29) 子宫腺肌病(32) 闭经(35) 溢乳闭经综合征(38) 多囊卵巢综合征(42) 未破卵泡黄素化综合征(46) 经行乳房胀痛(48) 经行目赤肿痛(50) 经行头痛(51) 经行眩晕(54) 经行感冒(56) 经行发热(58) 经行身痛(60) 经行口糜(62) 经行音哑(65) 经行胃脘痛(66) 经行风疹块(67) 经行吐衄(70) 经行水肿(72) 经行小便淋痛(74) 经行泄泻(76) 经行不寐(77) 经行情志异常(79) 更年期综合征(82) 绝经后出血(85)

第二章 带下病 (88)

白带(88) 黄带(90) 赤带(92) 青带(94) 黑带(95) 五色带下(97) 白崩(100) 外阴炎(102) 滴虫性阴道炎(104) 霉菌性阴道炎

- (107) 前庭大腺炎(109) 老年性阴道炎(112)
子宫颈炎(114) 急性盆腔炎(117) 慢性盆腔炎
(120) 结核性盆腔炎(123) 淋菌性阴道炎
(126) 尖锐湿疣(128) 梅毒(130)

第三章 妊娠病 (134)

- 妊娠剧吐(134) 先兆流产(137) 习惯性流产
(139) 妊娠腹痛(141) 异位妊娠(143) 妊娠水肿(145) 妊娠高血压综合征(148) 过期妊娠
(153) 胎萎不长(155) 妊娠小便淋痛(157) 妊娠小便不通(159) 妊娠尿失禁(161) 妊娠下肢抽搐(163) 妊娠瘙痒症(165) 羊水过多(167)
妊娠合并贫血(168) 妊娠合并病毒性肝炎(170)
妊娠合并感冒(172) 妊娠合并糖尿病(174) 妊娠乳汁自出(176) 葡萄胎(178) 绒毛膜癌(179)

第四章 产后病 (182)

- 产后腹痛(182) 产后恶露不绝(183) 产后发热(185) 产后乳汁少(187) 产后乳汁自出(189)
产后小便不通(190) 产后大便难(192) 产后汗出(193) 产后身痛(194) 产后不寐(195) 产后精神异常(197) 产后会阴感染(198) 产后回奶(199) 急性乳腺炎(200) 产后口渴(201)

第五章 女性生殖器官肿瘤 (203)

- 子宫肌瘤(203) 子宫颈癌(205) 子宫内膜癌
(208) 卵巢癌(211) 卵巢囊肿(214)

第六章 计划生育..... (218)

避孕药物副反应(218) 药物流产并发症(222)
人工流产并发症(227) 中药中期妊娠引产
(229)

第七章 妇科杂病..... (232)

子宫脱垂(232) 肛躁(235) 梦交(237) 阴吹
(238) 外阴瘙痒(241) 外阴湿疹(243) 外阴
白色病变(245) 外阴溃疡(248) 白塞综合征
(251) 面部色素沉着(253) 不孕症(255) 输
卵管梗阻(259) 梅核气(261) 放化疗后副反应
(263) 妇科术后肠胀气(267) 妇科术后尿潴留
(269)

第一章 月 经 痘

月 经 过 多

正常女性每次行经量约 50~80 毫升。如果月经周期基本正常，但月经量较正常月经量明显增多，临床称为月经过多。月经过多有虚、实之分，虚者多为气虚不足，统摄无权所致；实者可因血热，热迫血妄行，或血瘀阻滞，使血不归经致月经过多。治疗月经过多在经行时应以摄血止血为主。临幊上某些妇科病变，如子宫肌瘤、功能性子宫出血、盆腔炎等可致月经过多；一些血液病，如血小板减少症也可引起月经过多。如经治不愈，要进行进一步的检查，及时治疗。

基本方

(一) 气虚月过多

党参 15 克、黄芪 15 克、白术 15 克、淮山药 15 克、升麻 9 克、岗稔根 15 克、黄精 12 克、炙甘草 6 克、茯苓 9 克。

【方义】 党参、白术、茯苓、甘草为四君子汤，功效补中益气，加用黄芪增强益气之功，配升麻可升阳举陷；黄精、淮山药补脾胃，益肺肾，补虚扶弱；岗稔根除湿止血，对月经过多者止血效果好。

【加减】

1. 月经量多:加阿胶(烊冲)9克、艾叶4.5克、乌贼骨12克、生茜草4.5克。
2. 少腹冷痛:加艾叶4.5克、延胡12克、炮姜9克。
3. 经行夹血块:加益母草12克、泽兰9克、炒蒲黄12克。
4. 头晕目花:加女贞子12克、旱莲草12克、珍珠母(先煎)30克。

(二) 血热月经过多

黄芩9克、黄柏9克、山梔9克、生地12克、白芍12克、乌贼骨12克、生茜草4.5克、蒲黄12克、益母草12克。

【方义】 黄芩、黄柏、山梔清热凉血止血;生地、白芍滋阴养血,凉血止血;乌贼骨、生茜草是《内经》著名“四乌贼骨-蘡薁丸”的主要组成,具有益肾、收敛、凉血止血之功;蒲黄、益母草具有活血祛瘀、调经止血之功。全方配伍可清热凉血活血止血。

【加减】

1. 经行色黯红,夹血块:加黄连3克、制大黄9克、泽兰9克、丹皮12克、丹参12克。
2. 经行量多:加煅龙骨(先煎)30克、煅牡蛎(先煎)30克、炒地榆12克。
3. 发热腹痛:加红藤30克、败酱草30克、桃仁9克、五灵脂6克。
4. 内热口干:加地骨皮12克、知母9克、麦冬12克、青蒿9克。

按语

1. 月经过多的诊断要点是月经周期基本正常，仅经行量多，这是区别于月经先期的主要依据。引起的原因主要为气不摄血，或血热旺盛，或瘀血阻滞。归纳之为虚、实两端，虚者主要为气虚，以益气摄血为主；实者主要为血热，以清热活血为主。由于是月经过多，故在治疗过程中均应加入止血药。常用止血药有清热凉血止血药，如炒藕节 12 克、大蓟 12 克、小蓟 12 克、炒地榆 12 克、炒槐花 12 克、鹿衔草 12 克、制大黄 12 克、蒲黄炭 12 克等；固涩止血药有煅龙骨（先煎）30 克、煅牡蛎（先煎）30 克、五倍子 4.5 克、乌贼骨 12 克、生茜草 4.5 克、炮姜炭 9 克、山萸肉 9 克等。

2. 月经过多病程日久可导致机体虚弱，故不论虚实，病情久者常加用党参、黄芪、白术、淮山药、红枣等健脾益气、扶正之品，借以提高疗效。

3. 气虚日久者常因气虚，血流缓慢而留瘀，瘀久易化热，故对经期延长者可适当加入当归、川芎、益母草、泽兰、蒲黄、熟地、地骨皮等活血清热药。

4. 久治不愈者应行进一步检查，以排除子宫肌瘤、血小板减少等疾病所致的月经过多。

月 经 过 少

月经周期基本正常，但经量明显减少，甚至点滴而净；或经量少，行经期短于两天，两者均称为月经过少，亦称月经涩少。月经过少有虚实之分，虚者可

因精血不足、血海不盈所致；实者可因瘀血阻滞或痰湿内停、气血运行不畅所致。本病临床所见虚多实少，经行量少又常伴月经后期，如不及时治疗，可发展为闭经。部分月经过少者发生在人工流产或诊刮术后子宫内膜损伤者；有的系内分泌失调，激素水平低下；有的系子宫内膜结核菌感染，初期常有月经过少，随病情发展而致闭经。由于导致月经过少原因较多，故应仔细询问病史，明确诊断，积极治疗。

基本方

（一）精血不足

党参 15 克、黄芪 15 克、淮山药 15 克、当归 9 克、熟地 12 克、白芍 12 克、杞子 12 克、茯苓 9 克、川芎 4.5 克、菟丝子 12 克、白术 9 克、炙甘草 6 克。

【方义】 当归、熟地、白芍、川芎为四物汤，具有养血、活血、调经之功；党参、黄芪、淮山药益气健脾，配合四君子汤（党参、白术、茯苓、炙甘草）使气生血长；杞子养血增精，调补肝肾；菟丝子补肾固精。诸药配伍使精生血旺，冲任得养，经血增多。

【加减】

1. 心悸怔忡：加远志 9 克、桑椹子 12 克、龙眼肉 9 克。

2. 食少纳差：加谷芽 12 克、麦芽 12 克、砂仁（后下）4.5 克。

3. 腰膝酸软：加杜仲 12 克、寄生 12 克、怀牛膝 12 克。

4. 腹冷溲频：加仙灵脾 12 克、巴戟天 12 克、益

智仁 12 克。

5. 咽干内热:加麦冬 12 克、生地 12 克、天花粉 12 克。

(二) 瘰疬交阻

当归 9 克、川芎 4.5 克、桃仁 9 克、红花 9 克、赤芍 9 克、法半夏 9 克、茯苓 9 克、香附 12 克、陈皮 6 克、甘草 3 克。

【方义】 本方是以桃红四物汤(桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、生地)及二陈汤为基础方,去其生地,以防凉血留滞。桃红四物汤具有活血化瘀、调冲通经的作用;二陈汤之组成是半夏、茯苓、陈皮、甘草,具有健脾燥湿、和胃化痰之功,配以香附理气行滞,调经止痛。全方可活血化瘀,祛湿化痰,调经祛滞,使气血流畅,血海满盈,经水增多。

【加减】

1. 小腹胀痛:加乌药 9 克、川楝子 9 克、延胡 12 克。

2. 小腹冷痛:加紫石英 12 克、艾叶 4.5 克、小茴香 4.5 克。

3. 月经过少:加益母草 15 克、泽兰 9 克、丹参 12 克。

4. 胸闷呕恶:加砂仁(后下)4.5 克、姜竹茹 9 克、生姜 3 片。

按语

1. 月经过少者,临幊上虚多实少,治疗应重在濡养精血,以健脾补肾为主,即使实证,瘰疬交阻,也

不可过于破瘀行滞,以免过伐正气。在活血化瘀、祛湿化痰调经治疗时,也应维护正气,加用健脾扶正、补益气血之剂,益于疾病的治疗。

2. 在辨证治疗过程中应仔细询问病史,尤其对有人流或产后大出血病史者,应做进一步检查,可进行B超、内分泌、宫腔镜或子宫输卵管碘油造影检查等,查明月经过少的原因,以期对症治疗,方能疗效显著。

3. 体弱者应积极锻炼身体,增加营养,还可在平时运用食疗方法,常食桂圆、莲子肉、淮山药、红枣等。少腹冷痛或素体痰湿者应注意保暖,少食油腻。

月 经 先 期

女性正常月经周期为每3~5周行经一次,如果月经周期提前7天以上、连续3个周期以上者称为月经先期,又称为经早或经期超前。功能性子宫出血、黄体功能不全、月经不调等病症患者往往就有月经先期症状,月经先期者又常伴发月经过多。中医认为月经先期主要是气虚和血热所致,气虚者是气不能摄血,冲任不固;血热者是热迫血下行,致月经期超前。部分月经先期者是由盆腔炎、子宫内膜异位症、内分泌失调所引起,故应认真检查,明确诊断。

基本方

(一) 气虚

党参 15 克、黄芪 15 克、白术 12 克、杞子 12 克、甘草 6 克、淮山药 15 克、黄精 12 克、红枣 12 克、当归 12 克、升麻 6 克。

【方义】 党参、黄芪补气益气为君药；白术、淮山药、黄精、甘草健脾益气为臣药；当归、杞子补血养血为佐药；升麻、红枣升阳举陷为使药。诸药配伍可益气补中，摄血归经。

【加减】

1. 月经量多：去茯苓，加岗稔根 12 克、仙鹤草 12 克、阿胶（烊冲）9 克。

2. 大便溏薄：去当归、杞子，加炒扁豆 12 克、茯苓 9 克、补骨脂 9 克。

3. 心悸怔忡：加茯神 9 克、远志 9 克。

(二) 血热

生地 12 克、地骨皮 12 克、知母 9 克、黄芩 9 克、黄柏 9 克、丹皮 12 克、赤芍 9 克、青蒿 9 克。

【方义】 生地、地骨皮养阴、清热凉血；知母、黄芩、黄柏、丹皮、赤芍清热泻火、凉血；青蒿凉血清热，增加清热之力。

【加减】

1. 月经过多：加炒地榆 12 克、炒槐花 12 克、陈棕炭 12 克。

2. 烦热口苦：加山栀 9 克、柴胡 6 克。

3. 大便干结：加生大黄（后下）6 克、麦冬 9 克。

4. 颧红潮热：加白薇 9 克、银柴胡 9 克、龟板（先煎）12 克。

按语

1. 月经先期常伴有月经过多，故治疗时往往加用止血药，如此能互补，增强功效。
2. 血热者应根据症状辨证为实热、郁热与虚热之不同，再适当调整用药，这样能提高疗效。另外，要注意苦寒药易败胃，故应适当加用健脾和胃之药，如白术、党参等，以保护胃气。
3. 月经先期病程日久者，可损气耗精，致神疲乏力，故应选用龟鹿二仙胶，补人之精气神。

月 经 后 期

月经周期较正常周期延长 7 天以上、连续 3 个周期以上者称为月经后期，又称为经迟或经期错后。本病属月经不调范畴，相当于西医的“月经稀发”。月经后期常伴发月经过少，日久可致闭经。本病有虚实之分，虚者多因气血虚弱，血海不能按时满盈；实者多为气滞血瘀，冲任阻滞，血海不能如期满溢。治疗上虚者多以温经养血、填补冲任为主；实者多以活血行滞、通利冲任为主。

基本方

(一) 虚证

党参 15 克、熟地 12 克、淮山药 12 克、当归 12 克、鸡血藤 12 克、杞子 12 克、桑椹子 12 克、黄芪 12 克、白芍 12 克、白术 12 克。

【方义】 党参、黄芪益气补血；当归、杞子、桑椹

子、熟地、鸡血藤补血养血；白芍养血柔肝、养阴调经，与当归、熟地配伍是治疗妇科病血虚证之要药；白术健脾燥湿，防滋阴养血药过多碍胃滞湿。

【加减】

1. 头晕目花：加女贞子 12 克、旱莲草 12 克、菊花 9 克。

2. 畏寒怕冷：加肉桂 4.5 克、艾叶 3 克、附子（先煎）6 克。

3. 月经量少：加益母草 15 克、泽兰 9 克、莪术 9 克。

4. 小腹冷痛：加紫石英 15 克、艾叶 4.5 克、川椒目 4.5 克、吴茱萸 4.5 克。

（二）实证

当归 12 克、川芎 6 克、香附 12 克、乌药 9 克、柴胡 9 克、枳壳 6 克、郁金 9 克、木香 6 克、丹参 12 克。

【方义】 乌药、香附、木香理气行滞；柴胡、枳壳、郁金疏肝理气解郁；当归、川芎、丹参活血调经。

【加减】

1. 乳房胀痛：加八月扎 12 克、苏罗子 12 克、川楝子 9 克。

2. 小腹胀痛：加青皮 9 克、大腹皮 9 克。

3. 经行量少：加桃仁 9 克、红花 9 克、三棱 9 克、益母草 15 克。

按语

1. 月经后期常伴有月经过少，病久不愈能致闭经，发生不孕症，月经后期者多与内分泌失调有关，