

中国动物图谱

—— 鳥 类 ——

第 二 册

科学出版社

中国动物图谱

鳥 类

第 二 册

郑作新 王希成 著

科学出版社

1959

FD24/21

内 容 简 介

本册图谱共列鸟类 106 种, 分别隶于 12 目 25 科。每种均有说明与图对照, 便于参考。

中 国 动 物 图 谱 鸟 类 第 二 册

著 者 郑 作 新 王 希 成
出版者 科 学 出 版 社
(北京朝阳门大街 117 号)
北京市书刊出版业营业登记证出字第 061 号
印刷者 中 国 科 学 院 印 刷 厂
总 经 售 新 华 书 店

1959 年 5 月第 一 版 书号: 1742 字数: 89,000
1959 年 5 月第一次印刷 开本: 787×1092 1/16
(京) 0001—4,900 印张: 3 3/4

定价: (10) 0.55 元

前 言

这是中国动物图谱鸟类的第二册,内容列有鵒形、海雀、鷗形、鵠形、鷓形、鵲形、鵙形、夜鷹、雨燕、咬鵒、佛法僧、鷲形等目,計 106 种,其中鵠形目由南京大学生物学系王希成教授主笔,其余是由本人编写的。

本册的取材标准以及编写的内容和规格,悉依第一册。所列各鳥,一般均可供为食用;因此,这一用途在各鳥的說明中,不再贅述。至于常被猎供食用的种类,則仍特予提出。

本册的图,除个别几张采自以往文献外,概由卢济珍、王竟成同志繪就。

鄭 作 新

北京中国科学院动物研究所

1959 年元旦

目 录

鸽形目 [= 鸻形目]	1
雉科	1
水雉	1
彩鹬科	1
彩鹬	1
蛎鹬科	2
蛎鹬	2
鸻科	2
凤头麦鸡	2
灰头麦鸡	3
距翅麦鸡	3
灰斑鸻	4
金鸻	4
剑鸻	5
金眶鸻	5
环颈鸻	6
蒙古沙鸻	6
铁嘴沙鸻	7
鹬科	7
小杓鹬	7
中杓鹬	8
白腰杓鹬	8
红腰杓鹬	9
黑尾膝鹬	9
红脚鹬	10
红脚鹬	10
泽鹬	11
青脚鹬	11
白腰草鹬	12
林鹬	12
磯鹬	13
灰鹬	13
翘嘴鹬	14
翻石鹬	14
半蹼鹬	15
针尾沙锥	15
大沙锥	16
扇尾沙锥	16
丘鹬	17

细嘴滨鹬	17
红胸滨鹬	18
乌脚滨鹬	18
三趾鹬	19
勺嘴鹬	19
闊嘴鹬	20
反嘴鹬科	20
鸕鹚科	20
黑翅长脚鹬	21
反嘴鹬	21
燕鹬科	22
燕鹬	22
海雀目	22
海雀科	22
扁嘴海雀	22
鸻形目	23
鸻科	23
黑尾鸻	23
银鸻	23
红嘴鸻	24
白翅浮鸻	24
燕鸻	25
白额燕鸻	25
鸻形目	26
沙鸡科	26
毛腿沙鸡	26
鳩科	26
岩鳩	26
珠頸斑鳩	27
山斑鳩	27
灰斑鳩	28
火斑鳩	28
鸻形目	29
鸻科	29
排胸鸻	29
鸻形目	29
杜鵑科	29
紅翅凤头鵑	29

塞头杜鹃	30
大杜鹃	30
中杜鹃	31
四声杜鹃	31
八声杜鹃	32
黎金鹃	32
乌鹃	33
噪鹃	33
绿嘴地鹃	34
褐翅鸦鹃	34
小鸦鹃	35
鸚形目	35
草鸚科	35
草鸚	35
鵲鸚科	36
紅角鸚	36
鵲鸚	36
鵲鸚	37
长耳鸚	37
短耳鸚	38
夜鷹目	38
夜鷹科	38
夜鷹	38
雨燕目	39
雨燕科	39
針尾雨燕	39
北京雨燕	39
白腰雨燕	40
小白腰雨燕	40
梭雨燕	41
咬鵲目	41
咬鵲科	41
紅头咬鵲	41

紅头咬鵲	42
佛法僧目	42
翠鳥科	42
冠魚狗	42
斑魚狗	43
翠鳥	43
白胸翡翠	44
藍翡翠	44
蜂虎科	45
栗头蜂虎	45
佛法僧科	45
三宝鳥	45
戴胜科	46
戴胜	46
犀鳥科	46
斑犀鳥	46
鷲形目	47
鵟鵲科	47
大鵟啄木	47
啄木鳥科	47
鵲鵲	47
姬啄木鳥	48
棕啄木鳥	48
黑啄木鳥	49
大斑啄木鳥	49
白背啄木鳥	50
棕腹啄木鳥	50
星头啄木鳥	51
黑枕綠啄木鳥	51
栗啄木鳥	52
三趾啄木鳥	52
噪啄木鳥	53
金背啄木鳥	53

水 雉 偽形目 雉鴉科

Hydrophasianus chirurgus (Scopoli)

(歌 咕)


量度: 体长 332, 嘴峯 27; 翼 202, 尾 155, 跗跖 50 毫米(♂)。

形态 前头、头顶、面部、颊、喉和前颈白; 后头黑, 后颈金黄, 每侧各有黑色条纹镶边; 背和肩微棕褐, 微有紫色光泽; 腰、尾上复羽和尾黑; 翼上初级和次级飞羽白; 第一、第二枚初级飞羽纯黑, 第三枚内翮基部白余部黑, 其余初级飞羽白色, 领有黑色边缘; 下体从前颈以下暗赭褐色。

眼褐; 嘴基部蓝, 先端灰黄; 腿和脚蓝灰色。

生态 常出没于生长有芦葦或蓮等的湖沼或大池沼, 有时站立蓮叶上或散步其间。筑巢巢于荷叶等物上, 可随水面高低而升降。产卵四至七个; 卵梨形, 呈微棕褐到古銅綠色, 无斑。以植物、水生昆虫及螺类等为食。

分布 广东、广西、江西、湖北、福建、浙江、江苏, 北到河北(夏候鸟); 台湾和海南岛(留鸟)。



彩 鷸 偽形目 彩鷸科

Rostratula benghalensis benghalensis (Linné)

(画 眉 鷺)

量度: 体长 239, 嘴峯 51, 翼 132, 尾 42, 跗跖 42 毫米(♀)。


形态(♀) 前头和头顶微棕褐, 中央有一条宽的黄白带棕的直纹; 眼周有一白色环, 并以一条向后延伸; 围绕前者的外周为一黑褐色条纹; 眼光棕褐; 颊和上喉近于白带棕; 围绕全颈、上背和上胸为一广阔的铜棕色环, 此环外周镶以黑褐色的狭环, 黑褐色在背部甚不明显; 上背灰褐, 羽端白, 有暗褐细横纹; 中背及肩微棕褐到灰褐, 有许多暗褐色虫样横纹, 间或夹杂棕黄及黑色横纹; 有的肩羽白色, 形成背的每侧有一白条; 下背、腰和尾上复羽蓝灰, 有狭黑横纹, 尾上复羽有赭黄大斑点; 尾羽蓝灰, 有黑横纹和赭黄大斑; 翼上复羽微棕褐, 有黑横纹; 初级和次级飞羽蓝灰; 有黑色细横纹, 初级飞羽外翮有橙黄大圆斑, 和黑褐横斑相间; 胸部黑环带下, 接以白色环带, 然后连以中部间断的黑褐阔横斑; 其余下体白色。

眼褐; 嘴肉褐, 基部青灰; 腿和脚紫褐色。

生态 此种鸟雌雄情形恰和鸟类常相反, 雌性成鸟较雄鸟更有光彩并较大。栖息于水稻田或芦葦丰盛的沼泽地。活动多在夜间, 白天有时隐匿于距水稍远的灌木丛或竹丛中。食料大部分为螺类、甲虫、昆虫, 间及水生植物。营巢于离水不

远的旷野, 巢内有卵三或四枚。卵黄土色, 有黑斑。

分布 华北沿海一带直到东南部(夏候鸟); 从海南岛、台湾以至长江下游(留鸟)。



鸬 鹚 鸬形目 鸬鹚科

Haematopus ostralegus osculans Swinhoe

(海 鸬 鹚)

量度: 体长 486, 嘴峯 106, 翼 274, 尾 111, 跗蹠 50 毫米(♀)。


形态: 全部头、颈、上胸和上背黑色; 眼下一小横斑、下背、腰、尾上复羽和尾羽基部白色, 尾羽其余部分黑色; 初级飞羽黑褐, 从第五枚起外翮基部有白斑; 次级飞羽白, 在外侧的下端黑褐; 三级飞羽黑; 大复羽白, 基部黑; 中复羽和小复羽黑; 下体余部白。

眼红; 嘴珊瑚红, 先端玉白; 腿和脚朱红色。

生态: 性孤独, 常见其单独或少数在海滨沙滩, 觅食软体动物、甲壳类或蠕虫。巢筑于海滨沙砾中, 为隆穴状, 离高潮线不远。卵嫩黄带灰色, 有褐黑斑点。

分布: 我国沿海一带; 夏在东北、河北、山东等处繁殖, 冬在南部。


经济价值: 常被猎供食用。



凤 头 麦 鸡 鸬形目 鸬鹚科

Vanellus vanellus (Linné)

(田 鳧)



量度: 体长 330, 嘴峯 25, 翼 215, 尾 108, 跗蹠 44 毫米(♂)。

形态(♂) 前头、头顶及向后延长的冠羽黑,

有绿色光泽; 后头、眼的上下、耳区和颈侧白带棕色, 或多或少有些黑斑; 眼先白带棕黄; 绕眼周为一后边断缺的黑色大半环, 黑色向眼后及颊延伸; 后颈棕灰; 背、肩、腰及三级飞羽深辉绿色, 有紫色反光; 部分肩羽紫色较显; 尾上复羽锈红; 尾羽基部白, 下端黑, 外侧尾羽几乎全白; 初级和次级飞羽黑, 略带紫色光泽; 颊、喉、前颈和颈侧白; 上胸黑; 下体余部白, 尾下复羽浅棕色。

眼暗褐; 嘴黑; 腿和趾栗红。

生态: 成对或小群栖息于河岸, 以小虾、蠕虫及昆虫为食, 有时也可在田野里遇见。巢营于地上, 由草筑成。巢内有卵三或四枚, 卵土灰色, 有黑褐斑点。

分布: 繁殖在东北北部, 内蒙古以至新疆; 越冬在长江以南地区以及台湾。

经济价值: 可供食用。

灰头麦鷄 鴛形目 鴛科

Microsarcops cinereus (Blyth)

(海和尚、跳鳧)


量度: 体长 358, 嘴峯 39, 翼 231, 尾 108, 跗蹠 73 毫米(♀)。

形态 头、頸和胸灰色, 头頂、后頸和胸部有褐色沾染; 胸部下方界以黑褐色横带; 背、肩、三級飞羽和复羽浅褐; 尾上复羽和尾白色, 后者下端黑, 在外侧者全白; 初級飞羽和它的复羽黑; 次級飞羽和它的大复羽白; 其余下体白色。

眼深紅; 眼先裸露的皮肤鮮黃; 嘴黃, 末端三分之一黑; 腿和趾黃色; 爪黑色。

生态 栖息于河岸及沼澤地区, 孤独或少数成羣(6—10), 以昆虫、蠕虫和螺类等为食。巢居于暴露的或长有草的地上, 无非堆集一些草在較低洼的地方, 巢内有卵二至四枚。卵梨形, 呈橄欖黃色, 杂以灰褐色斑点。

分布 繁殖在东北中部、内蒙及长江流域; 在冬时, 河北、青島、福建、广东、广西、云南等地, 亦皆有其踪跡。



距翅麦鷄 鴛形目 鴛科

Hoplopterus duvaucelii (Lesson)

量度: 体长 322, 嘴 30, 翼 211, 尾 111, 跗蹠 68 毫米(♂)。

形态(♂) 前头、头頂、从后头向后突出的冠状长羽、眼先、頰、頰、喉和前頸中央黑色, 黑色四周全部白色鑲边, 从眼后起为一灰白色的环带; 背、腰、肩和三級飞羽浅灰褐; 尾上复羽白; 尾羽基部白, 下部黑; 初級飞羽黑, 次級飞羽基部白, 余黑, 小复羽黑, 中复羽和大复羽白, 如是形成一黑翼上的大白横斑; 上胸为与背同色的灰褐色半环, 灰褐色和背相連接; 腹部中央有一馬蹄形的黑斑; 下体余部概白色。

眼暗褐; 嘴和翼上的腕距均黑; 腿和趾砖灰色。

生态 栖息于河岸的沙砾滩上, 很少离开水的附近到田野間。


分布 福州(6月); 云南(1, 2, 7月); 海南島(3月)。



灰 斑 鴿 鴿形目 鴿科

Squatarola squatarola (Linné)

量度: 体长 305, 嘴峯 30, 翼 194, 尾 79, 跗趾 45 毫米(♀)。



形态(冬羽) 上体呈黑色与灰白色相斑驳状, 头顶上的白色斑点甚细小; 背、肩、翼上复羽和三級飞羽黑褐, 羽的两侧镶嵌灰白色缺刻, 灰白色斑內間或略带棕黄, 复羽較大者外侧边缘全白; 尾上复羽白, 或多少有些黑褐色横斑; 尾白; 有黑褐横斑; 初級和次級飞羽褐黑, 內侧初級飞羽外翮有白斑, 次級飞羽边缘白色; 前头、眼先和一闊眉斑白色, 中間夹杂黑褐細点; 頰、耳区和頸側白, 有灰褐色条紋; 頰和喉白, 略有灰褐斑点; 胸污白, 有灰褐条紋; 其余下体和尾下复羽白色; 胸側褐色較深, 略和肩相似; 腹侧有稀疏浅褐色条紋。

眼暗紅褐; 嘴黑; 腿和趾灰黑。

生态 生活于海滨及大河沿岸。性畏怯, 常十至廿只成羣活动。以蠕虫、螺类及昆虫等为食。

分布 新疆西部、东北、河北及山东(旅鳥); 江苏和东南沿海一带, 以及台湾、海南島(旅鳥, 冬候鳥)。

經濟價值 肉供食用。


金 鷸 鴿形目 鴿科

Charadrius dominicus fulvus Gmelin

(金 背 子)

量度: 体长 240, 嘴峯 23, 翼 157, 尾 64, 跗趾 41 毫米(♂)。

形态(雄鳥冬羽) 全部上体褐黑, 每羽内外两



侧边缘有大金黄斑点, 斑点到翼上复羽轉为灰白色; 前头和头側淡黄灰色, 前者有褐色斑点, 后者有褐色条紋; 眉斑和耳区灰白, 多少亦有褐色条紋; 尾羽黑褐, 有不規則的略带黄色的灰白色横斑; 初級和次級飞羽黑褐; 三級飞羽黑褐, 沿边缘有金黄及灰白色斑点; 大复羽同次級飞羽, 末端白; 前头基部、眼先、頰和喉上部黄白色; 胸淡灰黄色, 有褐色条斑; 其余下体和尾下复羽白色。夏羽下体全黑, 从前头、眉斑, 向下到頸側及胸白色; 其他大致与冬羽相似。

眼褐; 嘴尖端黑, 其余灰黑; 腿及趾鉛灰。

生态 常十余成羣, 在海滨或江河及湖泊的沿岸覓食甲壳类、蠕虫、螺类及昆虫等。不营巢, 产卵于稍低洼的沙土里。卵色从乳白到黄褐, 有很密的褐或黑色斑点。

分布 繁殖在亚洲北方; 迁徙时几遍全国, 有些还留在云南、广东、台湾、海南島等处越冬。

經濟價值 常被猎供食用。

劍 鴛 鴒形目 鴒科

Charadrius hiaticula placidus J. E. et G. R. Gray

(长嘴鴒)


量度：体长 222，嘴峰 21，翼 142，尾 79，跗蹠 29 毫米(♂)。

形态 此种较任何种有颈环的鴒为大。前头和宽眉斑白；前头后部和头顶前部黑；其余头顶和后头灰褐；后颈为一白色环带，向前和颊、喉的白色连成一起；接上此白环为一环绕上背和上胸的黑色环；眼先及一狭带沿眼下向后延伸到耳区黑褐；上体灰褐；腰浅灰；尾羽灰褐，近末端黑褐，外侧尾羽近末端黑褐；末端白；初级和次级飞羽暗褐；三级飞羽灰褐；初级飞羽的大复羽黑褐，次级飞羽的大复羽灰褐，两者末端部略靠白边；胸部在黑环带下两侧灰褐；下体余部白色。

眼暗褐；嘴黑，下嘴基部黄；腿和趾黄白色。

生态 栖息地不限于海滨和大河沿岸，以虾、螺、昆虫和水生植物为食。巢是典型的小海滨鸟巢的式样，就是沙滩中的一个浅凹陷。产卵在 5 月。卵梨形，浅绿灰色，有暗红褐和紫色的斑点。

分布 繁殖自东北、河北、青岛，西至甘肃、四川，南至云南、广东；越冬在长江以南区域，西抵西藏东南部，间或留住河北。



$\times \frac{1}{3}$

金 眶 鴒 鴒形目 鴒科

Charadrius dubius dubius Scopoli

(黑 額 鴒)


量度：体长 172，嘴峰 13，翼 118，尾 63，跗蹠 23 毫米(♂)。

形态 嘴基一狭带、头顶前部、眼先，经眼下连接到耳区，以及围绕上背和上胸的环带均黑色；前头、眉斑、颊、喉、与喉连接的后颈环，以及其余所有下体和极大部分外侧尾羽概白色；中央尾羽近末端部分和初级飞羽黑褐，第一枚初级飞羽的羽干白；上体余部灰褐。

眼暗褐；眼脸四周金黄；下嘴基部黄；腿和趾橙黄色。

生态 栖息于沿海一带，以昆虫、蠕虫和小型软体动物为食料。迁徙时常大批成羣，但有时也可看到单独或成对的存在。筑巢于海滨卵石间，其实无所谓巢，仅仅是产卵在卵石间的低凹地方。卵黄褐，有暗褐斑点。

分布 见于东南沿海一带以及台湾和海南岛等处。另有其他亚种遍布国内其他部分。



$\times \frac{2}{7}$


环 頸 鹬 偽形目 偽科

Charadrius alexandrinus dealbatus (Swinhoe)

(白領鹬, 白鐮環)

量度: 体长 159, 嘴峯 16, 翼 103, 尾 43, 跗跖 27 毫米(♂)。

形态 前头和眉斑白; 前头上方、眼先和后耳区黑; 头顶和后头灰微褐色, 有棕红色的沾染, 尤



其和眉斑交界及后头边缘棕红色更明显; 后颈有一白环; 上体余部, 包括背、肩和翼上复羽灰褐; 腰、尾上复羽中间部分和中央尾羽黑褐, 尾上复羽两侧部分和两侧尾羽白; 初级和次级飞羽及初级飞羽的大复羽黑褐, 初级飞羽的羽干中段, 内侧初级飞羽外翮上的斑, 及它的大复羽的末端均白; 上胸每侧各有一黑块; 下体余部纯白。雌鸟前头无黑色; 头冠棕色很淡; 眼先、耳区和上胸的黑色部分都代以灰褐色。冬羽成鸟头上无棕色, 胸侧和面部无黑色。

眼褐; 嘴黑; 腿和趾褐黑色。

生态 这是海滨的鸟。常少数成羣出现于海滩, 较少来田野潮湿地带。食物为螺类及蠕虫等。

分布 我国沿海一带: 在长江以北为夏候鸟, 以南为留鸟。


蒙 古 沙 鹬 偽形目 偽科

Charadrius mongolus mongolus Pallas

(短嘴沙子鹬)

量度: 全长 214, 嘴峯 18, 翼 130, 尾 52, 跗跖 30 毫米(♂)。

形态 前头白; 头顶前部黑, 此黑色和眼先,



眼下方和后方及耳区的黑色相连; 眉斑白带栗色; 头顶栗色带灰; 头顶后部和后头灰褐, 多少有些棕色沾染; 上体灰褐; 尾上复羽浅灰, 羽末端灰白; 尾羽黑褐, 最外侧尾羽的外翮近于灰白; 初级和次级飞羽黑褐, 初级飞羽近尖端黑色较深, 外侧初级飞羽的羽轴白; 三级飞羽和背部羽色相同; 初级飞羽的复羽和初级飞羽同色, 它的大复羽末端白; 颊和喉白; 前颈、上胸、下胸侧面、颈侧和后颈棕栗; 棕栗色前颈与白色喉部之间有一条不明显的黑色横环纹, 为二者间的界线; 其余下体白色。

眼暗褐; 嘴黑; 腿紫黑, 趾黑。

生态 栖息于海边沙滩上, 数目不多, 也出现于离海略有距离的栽培地上, 以软体动物和昆虫等为食。

分布 这是国内很常见的一种旅鸟。迁徙时遍布我国东部, 从东北、河北, 南至海南岛, 间或留在广东过冬。

鉄嘴沙鷗 鷗形目 鷗科

Charadrius leschenaultii Lesson

(大头哥、大嘴沙子鷗)

量度: 体长 206, 嘴峯 23, 翼 134, 尾 51, 跗跖 33 毫米(♂)。


形态(冬羽) 前头和眉斑白; 头顶和后头灰褐, 羽轴黑褐, 边缘浅灰; 后头和后颈间隆约有一灰白分界半环; 其余上体灰褐, 羽干黑褐, 羽缘浅灰; 尾上复羽灰色较浅, 羽缘白色; 尾羽暗褐, 末端白, 外侧尾羽全白; 初级和次级飞羽黑褐, 羽干白, 内侧初级飞羽外翮多少有些白斑; 三级飞羽同上体; 大复羽黑褐, 边缘白; 眼先、眼下、耳羽和上胸两侧灰褐; 其余全部下体白色。成鸟夏羽: 眼先和箭头上方黑, 黑色向后伸展至头侧; 上胸棕栗; 头上亦略有棕色沾染。

眼褐; 嘴黑; 腿和趾黑带紫。

生态 生活于海滨, 亦来湖畔或江岸。以甲虫、软体动物、小虾、昆虫幼虫、淡水螺类以及杂草等为食。巢也是小型海岸鸟的类型, 就是产卵于沙或土的穴隙地方。卵褐微褐, 有黑色和灰色的

条斑。产卵期在 5 月。

分布 繁殖在新疆西部。迁徙时遍布沿海一带, 自东北以至海南岛; 河北、青岛、福建、广东及台湾、兰屿等处, 都有其踪跡。



小杓鷗 鷗形目 鷗科

Numenius borealis minus Gould

(小雄嘴儿)

量度: 体长 332, 嘴峯 47, 翼 182, 尾 79, 跗跖 50 毫米(♂)。


形态(♀) 前头、头顶和后头黑褐; 眼先、眉斑和头上的正中纹灰白带沙黄; 头侧和颈黄灰, 有暗褐条纹; 一黑纹穿过眼到眼后; 上体黑褐, 羽缘有沙黄色缺刻; 下背、腰和尾上复羽黑褐, 有灰白横斑; 尾羽灰褐, 有黑褐横斑; 翼上复羽暗褐, 有灰白缺刻; 飞羽黑褐, 三级飞羽有沙黄色缺刻; 颈和喉上部白; 胸和体侧黄灰带棕, 前者有暗褐条纹, 后者有暗褐横斑; 腹和尾下复羽白, 而略有灰黄沾染, 后者略有暗褐横斑。

眼暗褐; 嘴端黑褐, 基部肉色; 腿黄灰, 趾灰。

生态 沿海一带不常遇见, 而空旷的田野中却并不少见。以蟹类、其他海产动物和杂草种子等为食。

分布 这在国内是一种常见的旅鸟, 迁徙经沿海一带, 自东北中部以至福州、台湾等处。

经济价值 肉味美, 常被猎供食用。



中 杓 鹬 偏形目 鹬科

Numenius phaeopus variegatus (Scopoli)

(中 雌 哩 儿)

量度: 体长 406, 嘴基 68, 翼 238, 尾 104, 跗跖 55 毫米(♂)。

形态 前头、头顶和后头黑褐; 头中央一直纹和颧眉斑污白; 眼先暗褐; 头侧、颈侧和后颈灰白,



夹有暗褐条纹; 上背和肩黑褐, 羽缘有灰白而带棕黄的斑; 下背和腰白, 间或夹有稀疏暗褐斑点; 尾上复羽污白, 有暗褐横斑; 尾羽灰褐, 有黑褐横斑, 末端灰白; 飞羽黑褐, 外侧初级飞羽的羽干白, 内侧初级飞羽和次级飞羽有白横斑和缺刻, 三级飞羽有不明晰的灰白缺刻; 翼复羽暗褐, 边缘有污白斑点; 颈与喉白; 胸污白, 有暗褐条纹; 其余下体白, 体侧有较密, 尾下复羽有较稀暗褐条纹。

眼暗褐; 嘴黑, 上嘴基部带赤, 下嘴基部黄; 腿和趾铅色带淡红。

生态 常成羣在海滨高潮线以上地区, 追逐潮时顺潮水退落散开觅食。性杂食; 蠕虫、小蟹、昆虫和杂草种子皆为其食品。繁殖到很远的北方。产卵于草原或其他草地的较低陷处。巢内通常有四卵; 卵橄榄色到暗绿褐, 有赭土色和黑色斑点。

分布 这是有规律性的旅鸟。迁徙时遍布沿海各省, 自东北南部以至海南岛; 在台湾、兰屿和广东为冬候鸟。

经济价值 与其他杓鹬同。

白 腰 杓 鹬 偏形目 鹬科

Numenius arquata orientalis Brehm

(白 腰 雌 哩 儿)

量度: 体长 590, 嘴基 152, 翼 292, 尾 111, 跗跖 81 毫米(♂)。


形态 头与颈黑褐, 羽缘污白带灰黄, 因而成斑纹条纹; 背、肩和翼上复羽褐黑, 有污白带灰黄的缺刻和闊边; 下背、腰和尾上复羽白; 尾羽淡灰黄, 有黑褐横斑; 初级飞羽黑褐, 在外侧的羽干和内侧上的横斑白, 内侧初级飞羽和次级飞羽暗褐, 有白横斑和缺刻; 三级飞羽与背羽相似; 颈与上喉白带灰黄; 前颈和胸白带灰黄, 有褐黑条纹; 体侧有较粗褐黑斑纹; 腹和尾下复羽白带灰黄, 有较狭细褐黑条纹。

眼暗褐; 嘴褐, 先端较暗, 基部肉色; 腿和趾蓝灰色。

生态 很常见于海边, 内地较少见。性胆怯, 对危险颇有警惕, 喜羣居。以昆虫、蠕虫、甲壳类和杂草等为食。

分布 繁殖在东北西北部; 东北南部、河北、山东、山西、新疆、青海(旅鸟); 华东从长江以南, 直至台湾与广东(旅鸟, 冬候鸟)。

经济价值 与其他杓鹬同。



紅腰杓鷸 鷸形目 鷸科

Numenius madagascariensis (Linné):

(大杓鷸, 大雄鷸兒)

量度: 体长 554, 嘴峯 158, 翼 287, 尾 116, 跗趾 80 毫米(♂)。


形态 前头、头顶、后头、后颈、背和肩黑褐, 各羽两侧为宽阔的灰色而略带棕红, 因此使全部上体形成斑纹条状; 下背和腰黑褐, 各羽两侧有灰色缺刻; 尾上复羽灰带棕红, 有黑褐横斑; 尾羽灰褐, 亦有黑褐横斑; 翼上复羽黑褐, 羽缘灰白; 初级和次级飞羽黑褐, 内侧初级飞羽和次级飞羽内外翮俱有白色缺刻; 三级飞羽灰褐而带棕红, 有黑褐横斑; 颊和上喉白; 头侧、颈侧、前颈和胸灰白夹棕红, 有暗褐条纹; 腹和尾下复羽灰白, 略有棕黄沾染, 有稀少较细的暗褐条纹; 腋和翼下复羽白, 有暗褐横斑。

眼暗褐; 嘴黑, 下嘴基部黄; 腿和趾黑色。

生态 习性与前一种相似。常见在潮退后觅食于低潮线海滩上, 以蠕虫等为食。

分布 沿海一带自东北至广东(旅鸟); 台湾(冬候鸟)。

经济价值 与其他杓鷸同。



黑尾膝鷸 鷸形目 鷸科

Limosa limosa melanuroides Gould

(东方黑尾鷸)

量度: 体长 393, 嘴峯 108, 翼 202, 尾 76, 跗趾 72 毫米(♂)。

形态(冬羽) 前头、头顶、后头和后颈灰褐, 前头近于灰白, 后颈灰亦较浅; 背和肩灰褐较深暗, 羽缘灰色较浅; 下背和腰黑褐; 尾上复羽白, 其中长羽末端黑; 尾羽上半白, 下半黑, 末端灰褐; 初级飞羽黑褐, 羽干白, 从第五枚起基部白; 次级飞羽基部白, 下端褐黑; 三级飞羽同背部; 复羽暗褐, 大复羽末端白; 初级飞羽大复羽同初级飞羽, 末端白; 眉斑从嘴基起白; 眼先、颊和耳区灰褐; 颊和喉白; 前颈和颈侧淡灰; 上胸和胸侧淡灰褐; 其余下体白。

雄成鸟交尾期羽: 和冬羽不同处在前头、头顶、后头和颈棕色而有黑条纹; 上背铁锈色, 羽尖有阔黑横斑; 其余背和肩黑, 有锈色阔横斑; 胸部锈红, 有不清楚黑色横斑。


眼暗褐; 嘴暗褐, 近先端黑; 腿和趾黑色。

生态 常见于海滨, 成羣觅食于退潮之时。有

时亦常来内地, 以小蟹、谷粒及其他植物种子为食。

分布 青海、西藏南部、云南及沿海一带从东北南部到海南岛(旅鸟); 台湾(旅鸟, 冬候鸟); 繁殖在新疆西部和东北西北部。

经济价值 与杓鷸同。




紅脚鶴鷸 鴿形目 鷸科

Tringa erythropus (Pallas)

(大紅腿鷸)

量度: 体长 288, 嘴峯 56, 翼 160, 尾 65, 跗蹠 55 毫米(♂)。

形态(雄鳥冬羽) 头的上部和后颈灰褐, 逐渐到颈侧, 灰色較浅; 背、肩和翼复羽由深灰漸轉黑褐, 羽緣白而有黑斑; 头侧有一白色寬闊条紋从嘴基起, 经过前头侧面和眼的上方; 眼先有一灰褐



条紋橫貫过眼; 头侧白色, 隱約有灰色条紋; 下背和腰純白; 尾上复羽和尾羽都是黑褐和白相間的橫斑, 但最上面的中央尾羽白色部分代以暗灰, 邊緣和末端仍为白色; 初級飞羽黑褐, 第一枚羽干白, 內侧初級飞羽和次級飞羽黑白相間成斑; 下体白, 前颈下方稍带灰色, 体侧有灰色条斑。雌鳥羽色較雄鳥为深, 条斑亦較显著; 下体除腹部以下为白色外, 其余概黑而羽緣白。

眼暗褐; 嘴黑, 下嘴基部橙黄; 腿和趾橙紅色。

生态 当迁徙时, 来臨沿海一带海滨, 以小型甲壳类、螺类及昆虫幼虫等为食。

分布 迁徙时几遍全国; 在东南沿海为冬候鳥; 6月曾一度見于西藏南部珠穆朗瑪峯。

經濟價值 肉可供食。


紅脚鷸 鴿形目 鷸科

Tringa totanus (Linné)

(紅腿鷸)

量度: 体长 263, 嘴峯 43, 翼 148, 尾 60, 跗蹠 47

毫米(♂)。



形态 上体灰褐, 各羽中央暗褐, 肩羽和三級飞羽有不甚規則的暗褐橫斑; 从嘴基到眼上白, 中有褐斑; 头侧和颈侧白, 中有暗褐条紋; 眼先暗褐, 略有白斑; 下背和腰純白; 尾上复羽白, 有褐黑橫斑; 初級飞羽黑褐, 第一枚羽干白, 在內侧的近末端白; 次級飞羽純白; 大复羽暗褐, 末端白; 中央尾羽灰褐, 有褐黑橫斑; 兩侧尾羽和尾上复羽同; 頰和喉純白; 下颈和体侧白, 有頗密的暗褐条紋; 其余下体白, 尾下复羽有稀疏暗褐橫斑。

眼暗褐; 嘴黑, 基部紅褐; 腿和趾紅色。

生态 常孤独或成对栖息于沼泽或潮濕草地, 以甲虫、昆虫的幼虫和成虫为食。

分布 繁殖在新疆西部、甘肅、西藏南部、青海; 自东北南部沿海至海南島, 西抵四川、云南(旅鳥); 广东、海南島(冬候鳥); 台湾(偶見冬候鳥)。

經濟價值 肉可供食。

泽 鹬 鷸形目 鷸科

Tringa stagnatilis (Bechstein)

(泥 泽 鹬)

量度: 体长 218, 嘴峰 38, 翼 131, 尾 55, 跗蹠 50 毫米(♂)。


形态 前头、头顶和后颈为黑白相间的条纹; 上背沙灰, 各羽中央有大块浓黑; 肩和三级飞羽亦沙灰, 有黑横斑; 下背和腰白; 尾上复羽白, 有黑横斑; 初级飞羽黑褐; 次级飞羽暗褐, 尖端微有白边; 尾羽白, 有暗褐横斑, 中央尾羽带浅灰, 外侧尾羽外翹有暗褐镶边; 眼先、颊、耳区、颈侧、前颈、腋和上胸白, 有暗褐斑点; 颊、喉和其余下体白。冬羽: 头、颈、上背和肩浅褐灰, 羽镶白边; 眼先、颊和全部下体纯白, 上胸有少数暗色条纹和横斑。

眼暗褐; 嘴黑; 腿和趾古铜绿色。

生态 这是沿海滨的迁徙鸟, 一羣多至百余。食物大部分为小甲壳类和各种昆虫。

分布 东北、河北、山东、江苏、福建、台湾、广州湾和海南岛(旅鸟)。

經濟價值 可供食用, 但因体小, 狩猎价值不高。



青 脚 鹬 鷸形目 鷸科

Tringa nebularia (Gunnerus)

(綠 腿 鷺)

量度: 体长 328, 嘴峰 56, 翼 189, 尾 82, 跗蹠 61 毫米(♂)。

形态(冬羽) 头顶和后颈灰褐, 羽缘白, 褐白相间, 形成条纹; 背和肩灰褐, 羽轴黑, 羽缘灰白, 贴近羽缘有一圈暗褐; 下背、腰和尾上复羽白, 后者的长羽有暗褐斑; 翼上复羽褐, 大复羽和中复羽边缘镶白; 初级飞羽黑褐, 第一枚羽干白, 内侧初级飞羽末端镶白; 次级飞羽褐, 边缘略镶灰白; 三级飞羽同肩部; 尾羽白, 中央尾羽外翹边缘有暗褐横斑, 外侧尾羽外翹边缘亦略有断续的褐斑; 前头、眼先、头侧、颊、喉、胸以及下体余部纯白; 颈侧、耳区上部和上胸侧面白, 有暗褐条纹。

眼暗褐; 嘴角褐; 腿和趾草绿色。

生态 栖息于沿海和内陆的沼泽地区, 迁徙时成大羣飞行, 平常小羣不满十个。以水生昆虫、虾和其他水生植物为食。

分布 长江以北区域自新疆西部以至东北(旅鸟); 河北(旅鸟, 夏候鸟); 长江以南各省, 包括

台湾(冬候鸟); 西藏南部(留鸟)。

經濟價值 肉可供食。

