

实用中草药 彩色图集

第五册

罗献瑞 主编
广东科技出版社



实用中草药彩色图集

第五册

主 编	罗献瑞				
本册主编	赵素云				
编 写	赵素云	严俊	王牧	梅霞	
	郑向清	蔡敏			
绘 图	孙西	雷成竹			

广东科技出版社
广 州

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药彩色图集 (第五册) / 罗
献瑞主编. —广州: 广东科技出版社,
2000. 1

ISBN 7-5359-2184-1

I. 实…

II. 罗…

III. 中草药-图谱-中国

IV. R281

NAW73/06

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdlkjzbb@21cn.com

出 版 人: 黄达全

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广州彩色印务有限公司

(广州市诗书路 63 号 邮码: 510120)

规 格: 787mm × 1 092mm 1/32 印张 15.25 字数 300 千

版 次: 2000 年 1 月第 1 版

2001 年 2 月第 3 次印刷

印 数: 20 201 ~ 30 200 册

定 价: 38.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

Coloured Icones of Chinese Medicine

Volume V

Chief editor: Lo Hsien Shui

**Guangdong Science and Technology Press
Guangzhou China**

内 容 简 介

本图集第五册本着实用的宗旨，植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。本册收载西南地区产的中草药 211 种，其中全草类 82 种，根和根茎类 69 种，茎、枝和树皮类 17 种，叶类 15 种，花类 6 种，果实和种子类 17 种，苔藓、菌类 5 种。每种均附彩图，部分有药材图，对西南及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物（动物、矿物）及药材，均有很好的参考价值。

编写说明

1. 本册收载的品种均为西南地区常用中草药，计 211 种，其中全草类 82 种，根和根茎类 69 种，茎、枝和树皮类 17 种，叶类 15 种，花类 6 种，果实、种子类 17 种、苔藓、菌类 5 种。
2. 本册的编写体例和规格与前四册基本相同。有关体例和规格方面的问题，请参阅第一册编写说明，不赘述。
3. 《中华人民共和国药典》（一部），简称《药典》，本册中均指 1995 年版。

续编集前言

本套图集原拟编写 3 集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于 1994 年 8 月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于 2 种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1998 年 8 月于广州

目 录


一、全草类	(1)	西南千金藤	(50)
一匹莲	(2)	地构叶	(52)
大唇羊耳蒜	(4)	地黄瓜	(54)
大香附子	(6)	过山龙	(56)
大盖球子草	(8)	全叶马兰	(58)
小木通	(10)	异叶黄鹌菜	(60)
小斑叶兰	(12)	吊灯花	(62)
小活血	(14)	尖叶唐松草	(64)
小猪棕草	(16)	纤冠藤	(66)
车前草	(18)	红陈艾	(68)
中华水芹	(20)	红毛走马胎	(70)
水川芎	(22)	红鸡踢香	(72)
水母雪莲花	(24)	花佩菊	(74)
风顶红	(26)	针筒菜	(76)
毛药	(28)	青皮草	(78)
木莲金	(30)	抽心寒药	(80)
汉荭鱼腥草	(32)	软筋藤	(82)
石韦	(34)	岩冬菜	(84)
石苦蕒	(38)	苦丁	(86)
石刷把	(40)	茅膏菜	(88)
石生繁缕	(42)	刺子莞	(90)
四块瓦	(44)	虎头兰	(92)
四棱香	(46)	虎皮草	(94)
西南细辛	(48)	盾果草	(96)

金灯藤	(98)	滴水珠	(156)
金疮小草	(100)	醉魂藤	(158)
细辛	(102)	飘拂草	(160)
细圆藤	(104)	螺丝七	(162)
挖耳草	(106)	瞿麦	(164)
独角风	(108)	攀援星蕨	(166)
胎生铁角蕨	(110)		
香排草	(112)	二、根和根茎类	(169)
屏风草	(114)	九子莲	(170)
浆果苋	(116)	土百部	(172)
球花马蓝	(118)	大黄	(174)
峨眉排草	(120)	大剑叶木	(176)
峨眉石凤丹	(122)	山慈姑	(178)
饿蚂蟥	(124)	山梔茶	(182)
倒水莲	(126)	小升麻	(184)
鹿衔草	(128)	川木香	(186)
接骨仙桃	(130)	川莪术	(188)
黄海棠	(132)	川黄芩	(190)
黄牛草	(134)	川山豆根	(192)
野坝子	(136)	川贝母	(194)
野鸡草	(138)	川乌	(201)
蛇根草	(140)	川中南星	(204)
假杜鹃	(142)	川明参	(206)
银线盆	(144)	太子参	(208)
淫羊藿	(146)	巴山重楼	(210)
葱叶兰	(148)	水仙根	(212)
紫花络石	(150)	长药隔重楼	(214)
短药沿阶草	(152)	牛尾独活	(216)
落地秧	(154)	石刁柏	(218)

亮叶崖豆藤	(336)	金盏菊	(392)
草红藤	(338)	米仔兰	(394)
树参	(340)	野茉莉	(396)
柃林	(342)	紫花玉兰	(398)
峨眉黄肉楠	(344)	蜀葵	(400)
淮通	(346)		
兜唇石斛	(348)	六、果实和种子类	(403)
湖北络石	(350)	川泡桐	(404)
黑果茵芋	(352)	川白蔻	(406)
紫藤	(354)	云南小草蔻	(408)
四、叶类	(357)	水飞蓟	(410)
山矾	(358)	牛姆瓜	(412)
千年桐	(360)	瓜蒌	(414)
风车子	(362)	芥子	(416)
四川冬青	(364)	吕宋楸毛	(418)
四川蜡瓣花	(366)	红豆杉子	(420)
白檀	(368)	沙棘子	(422)
交让木	(370)	油菜子	(424)
黄泡叶	(372)	茄子	(426)
光叶绣线菊	(374)	柔毛五味子	(428)
红果楠	(376)	野燕麦	(430)
苦竹叶	(378)	楸子	(432)
剑叶金鸡菊	(380)	锦灯笼	(434)
香叶子	(382)	酸枣仁	(436)
狭叶洋地黄	(384)	七、苔藓和菌类	(439)
大青叶	(386)	独脚鸡	(440)
五、花类	(389)	小灰包	(442)
玉簪	(390)	毛木耳	(444)

毛头鬼伞	(446)	中文名索引	(450)
蜜环菌	(448)	拉丁名索引	(466)

一、全 草 类



一 匹 莲

别名 下延叉蕨、有柄三叉蕨。

来源 本品为蕨类三叉蕨科植物下延三叉蕨 *Tectaria decurvens* (Presl) Copel 的干燥全草。

原植物 下延三叉蕨(图1)为多年生草本，高约1m。根状茎粗大，直立，连同叶柄下部密生披针形鳞片。叶簇生；叶柄长20cm~30cm，两侧有狭翅下延几达基部，翅宽约3mm~5mm；叶片草质，长圆形或卵状长圆形，长30cm~100cm，基部楔形或戟形，下延，羽状深裂(基部羽片的下侧常叉裂出1枚小羽片)，沿叶轴有宽1cm~2.5cm的翅；裂片3对~8对，长15cm~25cm，披针形，顶端尾状渐尖，边全缘或波状；叶脉网状，网眼有单一或分枝的内藏小脉。孢子囊群圆形，下陷(叶肉常皱缩成旋涡状)，在侧脉间形成2行(叶轴两侧的阔翅上也有1行~3行)；囊群盖大，圆形，盾状着生，成熟时褐色。

生于海拔800m以下的山谷密林下湿地。分布于福建、台湾、广东、广西、云南、四川等省(自治区)。亚洲热带其他地区也有。

采收加工 夏、秋两季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品根状茎粗壮，直立，稍扭曲，连同叶柄下部密生黑褐色披针形鳞片。叶簇生于根状茎上；叶柄长约25cm，浅棕色，两侧有宽3mm~5mm的狭翅；叶片灰绿色，长30cm~100cm，宽25cm~50cm，基部楔形或戟形，下延，一回羽状深裂，裂片3对~8对，长15cm~25cm，宽2cm~5cm，披针形，顶端尾状渐尖，边缘波状或全缘，基部1对裂片常叉裂出1枚小羽片；叶轴有宽1cm~2cm的翅。孢子囊群圆形，下陷，在侧脉间形成2行。气无，味苦。以根茎粗壮、叶色绿者为佳。

性味和功用 苦，寒。清热解毒。用于疗疮肿毒。常用量10g~15g，水煎服，并用鲜品适量捣烂外敷。



图 1 下延三叉蕨

大唇羊耳蒜

别名 双叶金枪。

来源 本品为兰科植物大唇羊耳蒜 *Liparis dunnii* Rolfe 的全草。

原植物 大唇羊耳蒜(图2)为多年生草本。假鳞茎聚生，卵圆形，径达3cm。叶2枚，膜质，椭圆形或卵状椭圆形，长4cm~15cm，顶端锐尖或略钝，基部骤然收狭为鞘状叶柄，边缘微波状，具极细齿。花葶直立，具狭翅，远高出叶外；总状花序疏生多数花；苞片很小，卵状三角形，长约2mm；花淡紫色，萼片狭矩圆形，长8mm~17mm，宽2mm~3mm，中萼片与侧萼片相似；花瓣丝状，等长于萼片；唇瓣倒卵状矩圆形，直立，长10mm~20mm，宽7mm~12mm，顶端圆形并具短尖，深紫色，边全缘，中上部具极细齿，基部无胼胝体；合蕊柱弯曲，长约4mm，近顶端的蕊柱翅短而圆。蒴果纺锤状倒圆锥形，具纵肋，顶端截平。

生于溪边、林下阴湿处。分布于山西省及长江流域以南各省(自治区)。朝鲜、日本也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品须根较多，褐黑色，松泡内有淡黄白色细圆柱形维管束，径约1mm。假鳞茎聚生，卵圆形，粗1cm~3cm，表面灰褐色或绿褐色，具数枚鞘状叶。叶2枚，基生，椭圆形或卵状椭圆形，长4cm~15cm，宽2cm~6.5cm，顶端锐尖或略钝，基部圆形，急剧收狭成鞘状叶柄，弧状平行脉明显。花葶远高出叶外，具翅；总状花序顶生；苞片长约2mm；花大，浅紫色，排列较稀疏，花瓣丝状，唇瓣倒卵状矩圆形，长10mm~20mm。气微，味稍苦。以假鳞茎粗壮、须根多、叶色绿者为佳。

性味和功用 苦，凉。归肺、肝经。清热解毒，补肺止血。用于吐血，咯血，外伤出血，小儿惊风，毒蛇咬伤，疖肿。常用量15g~30g；外用适量捣烂敷患处。




图 2 大唇羊耳蒜