



SHIJIE
MINGHUA
BOLAN

世界 名花博览

卢思聪 卢炜 冯桂强 编著


河南科学技术出版社



SHIJIE
MINGHUA
BLOAN 世界
名花博览

卢思聪 卢炜 冯桂强 编著

河南科学技术出版社



世界名花博览

卢思聪 卢 炜 冯桂强 编著

责任编辑 赵中胜

河南科学技术出版社出版

新华书店发行

邮政编码: 450002 电话: (0371)5721450

深圳兴裕制版印刷有限公司印制

开本: 880 × 1092 1/16 印张: 9.5 字数: 230 千字

1997 年 7 月第 1 版 2001 年 1 月第 2 次印刷

印数: 4001-6000

ISBN 7-5349-1846-4/G · 482

定价: 126.00 元

目 录

香石竹	(1)	狗尾红	(38)
月季	(2)	一品红	(39)
唐昌蒲	(3)	何氏凤仙	(40)
扶郎花	(4)	扶桑	(41)
菊花	(5)	木槿	(42)
苏铁	(6)	三色堇	(43)
西瓜皮椒草	(7)	西番莲	(44)
叶子花	(8)	四季秋海棠	(45)
荷花	(9)	蟆叶秋海棠	(46)
睡莲	(10)	球根秋海棠	(47)
王莲	(11)	金琥	(48)
楼斗菜	(12)	绯牡丹	(49)
铁线莲	(13)	黄体绯牡丹	(50)
芍药	(14)	假昙花	(51)
牡丹	(15)	蟹爪	(52)
白头翁	(16)	瑞香	(53)
花毛茛	(17)	紫薇	(54)
荷包牡丹	(18)	倒挂金钟	(55)
玉兰	(19)	杜鹃花	(56)
蜡梅	(20)	鹅掌柴	(57)
东方罂粟	(21)	仙客来	(58)
八仙花	(22)	报春花	(59)
长寿花	(23)	连翘	(60)
蓟花山龙眼	(24)	迎春	(61)
贴梗海棠	(25)	茉莉花	(62)
梅花	(26)	桂花	(63)
碧桃	(27)	丁香	(64)
樱花	(28)	宿根福禄考	(65)
海棠花	(29)	勿忘草	(66)
榆叶梅	(30)	龙吐珠	(67)
火棘	(31)	爪哇常山	(68)
紫荆	(32)	五色梅	(69)
含羞草	(33)	一串红	(70)
紫藤	(34)	二色茉莉	(71)
天竺葵	(35)	荷包花	(72)
朱砂桔	(36)	美国凌霄	(73)
米兰	(37)	山茶花	(74)
		大岩桐	(75)
		非洲紫萝兰	(76)
		网纹草	(77)

金苞花	(78)	香雪兰	(118)
龙船花	(79)	德国鸢尾	(119)
猬实	(80)	垂花赫蕉	(120)
锦带花	(81)	地涌金莲	(121)
桔梗	(82)	红蕉	(122)
紫菀	(83)	鹤望兰	(123)
大丽花	(84)	郁金	(124)
瓜叶菊	(85)	美人蕉	(125)
散尾葵	(86)	天鹅绒竹芋	(126)
棕竹	(87)	三褶虾脊兰	(127)
花烛	(88)	卡特兰	(128)
花叶芋	(89)	中国兰花	(129)
大王黛粉叶	(90)	大花蕙兰	(131)
龟背竹	(91)	石斛	(133)
绿萝	(92)	密花石斛	(134)
红宝石喜林芋	(93)	蝴蝶石斛	(135)
白鹤芋	(94)	大瘤瓣兰	(136)
合果芋	(95)	兜兰	(137)
马蹄莲	(96)	黄花鹤顶兰	(139)
光萼荷	(97)	蝴蝶兰	(140)
艳凤梨	(98)	独蒜兰	(141)
水塔花	(99)	万带兰	(142)
红星果子曼	(100)	学名索引	(143)
花叶赭凤梨	(101)	主要参考文献	(145)
花叶丽穗凤梨	(102)	编后记	
六出花	(103)		
香龙血树	(104)		
萱草	(105)		
玉簪	(106)		
风信子	(107)		
郁金香	(108)		
百合	(109)		
凤尾丝兰	(110)		
百子莲	(111)		
大花君子兰	(112)		
文殊兰	(113)		
朱顶红	(114)		
美丽水鬼蕉	(115)		
中国水仙花	(116)		
喇叭水仙	(117)		



香石竹

香石竹 *Dianthus caryophyllus* 又名麝香石竹、康乃馨。石竹科多年生草本。茎直立，多分枝，高 70 厘米~100 厘米。通常分为两大类，露地栽种，作二年生花卉栽培；温室栽种，主要作切花栽培。香石竹切花是著名的“母亲节”之花，代表慈祥、温馨、真挚和不求代价的母爱。可做花篮、花束、花盘、花瓶及胸花。为世界五大切花之一，产量和消费量巨大。温室栽培可四季开花，花直径 5 厘米~10 厘米，花色鲜艳，有白、红、桃红、橘黄、紫及杂色。有宜人的香味。深受世界各国人民喜爱，是意大利、波兰、洪都拉斯和摩纳哥等国的国花。原产法国到希腊一带，现世界各地广泛栽培。用扦插组织培养法繁殖，温室栽培。喜凉爽气候，冬春季白天 15℃~18℃，夜间 10℃~12℃；夏秋季白天 18℃~21℃，夜间 12℃~15℃。通常大规模生产性栽培。



MAK 01/09




月季

月季 *Rosa hybrida* 又称现代月季。当前各地栽种的月季是在蔷薇属(*Rosa*)内许多种经过近 200 年的选种和杂交育种培育出来的。栽培的品种约有 20 000 个以上,是一群非常复杂的无性系。月季为蔷薇科有刺灌木或蔓性灌木。花形、花色极为丰富,并且培育出了适合于各种用途的品种,深受各国人民的喜爱,是世界著名的花卉、世界五大切花之一,也是中国十大传统名花的成员,还是英国、卢森堡、西班牙、伊拉克、伊朗、保加利亚、罗马尼亚等国的国花。主要用扦插和嫁接法繁殖;广泛栽植于除热带和寒带以外的世界各地。生长季节经常开花。通常气温低于 5℃ 时进入休眠;气温高于 35℃ 对其生长不利;冬季能耐 -15℃ 左右的低温。喜肥沃而排水良好的沙质壤土和充足的阳光;空气湿度过大和土壤积水,会生长不良,易生病害。

唐菖蒲

唐菖蒲 *Gladiolus hybridus* 又称十样锦，为鸢尾科多年生草本。有扁圆形的球茎；叶剑形，二列状基生；花梗粗壮无分枝，高可达 100 厘米~150 厘米，顶生穗状花序，有花 10 朵~20 朵，花通常排成二列，侧向一边，花冠偏漏斗状，花色多变，有白、黄、粉、红、蓝、紫、橙等色，花径大约 12 厘米~16 厘米，花期夏季。栽培品种极多，均为杂交种。分仔球繁殖。喜阳光充足，夏季气候较凉爽和土层深厚、肥沃及排水良好的土壤。华北地区于 5 月份种植，深度约 10 厘米。生长及开花前期均应注意追肥。通常用不同栽植期和促成栽培调解花期，以保证随时供应市场。唐菖蒲是世界五大切花之一，用作花篮、花束和插瓶等，每年的销售量十分巨大。






扶郎花

扶郎花 *Gerbera jamesonii* 又称非洲菊,为菊科多年生草本。高可达 60 厘米,多数叶为基生,长椭圆状披针形,有深浅不一的羽状裂,长 12 厘米~25 厘米,宽 5 厘米~8 厘米,叶柄长 12 厘米~20 厘米。头状花序单生,直径 8 厘米~12 厘米,有白、黄、橙红、红等色。原产南非,现世界广为栽培,为世界五大切花之一,也是重要的盆栽花卉。种子繁殖,播种温度 22℃,15 天~25 天发芽,在有光的条件下发芽整齐。喜冬季温和,夏季凉爽的气候条件。适于温室栽培。要求排水良好,富含有机质、深厚肥沃的土壤,pH 值为 6~6.5。大量生产切花用的种苗,需通过组织培养。这样生产的切花性状一致。切花品种花梗长而坚挺,盆花用品种花梗短。

菊花

菊花 *Dendranthema morifolium* 又称鞠、秋菊、节华、黄花、九华、女华、帝女花等。菊科多年生宿根草本。高 60 厘米~150 厘米,茎直立,基部稍木质化;单叶互生,卵圆或长圆形,边缘有锯齿。头状花序顶生或腋生,直径 10 厘米~30 厘米。花序大小、形状及花色变化极大。花色有白、黄、粉、红、紫及各种过渡色和复色。菊花为短日照植物,自然花期 10 月~12 月;经人工处理可全年开花。原产中国,栽培历史久远,约 1 500 年以上。优良品种多达 3 000 余个,千姿百态。园林中常用于花坛、花境,或作盆栽,亦是世界五大切花之一。菊花多姿多态,花形优美,色泽丰富,花期长,适应性强,深受各国人民的喜爱。是中国十大传统名花之一。用扦插、分株或嫁接法繁殖,大量生产切花用组织培养法繁殖。性喜凉爽和通风良好的环境,要求土壤肥沃、疏松及排水良好。喜强光、忌连作,要求充足的肥料和水分。依品种及栽培目的进行整形和修剪。





苏铁

苏铁 *Cycas revoluta* 又称铁树、避火蕉，为苏铁科常绿树。高1至数米，不分枝或偶尔分枝；羽状叶长0.5米~2米，羽片可达100对以上，条形，质坚硬，长9厘米~18厘米，宽4毫米~6毫米，边缘向下卷曲，深绿色有光泽。雌雄异株，雄花序圆柱形，长30厘米~70厘米，直径10厘米~15厘米；雌花序圆头状，大孢子叶扁平，羽状分裂，密生黄褐色长绒毛。种子朱红色，卵圆形，长2厘米~4厘米。分布于福建、广东；日本和印尼也有。用分株或播种法繁殖。喜温暖、干燥和光照比较强的环境。盆栽用腐殖土或泥炭土。越冬温度应在5℃以上。广泛用盆栽或大木桶栽培，供庭园中陈设，是有名的观赏用盆栽树种。

西瓜皮椒草

西瓜皮椒草 *Peperomia argyreia* 又称西瓜皮豆瓣绿。胡椒科多年生草本植物。高 15 厘米~30 厘米,茎较短;叶近基生,轮生或互生,成放射状,卵圆形,先端尖,长 12 厘米,宽 10 厘米,肉质,叶面暗绿色,有 9 条~11 条银白色斑纹,似西瓜皮,叶背面淡绿色,叶柄长 7 厘米~24 厘米,分布于美洲热带地区,现在作为室内盆栽观叶植物在世界各地流行。用分株和叶片扦插法繁殖。喜温暖、湿润和半荫的环境,忌强烈阳光直射,生长适温 18℃~24℃。栽培要求用疏松、排水良好的腐殖土或泥炭土。是优良的室内盆栽观叶植物。同属植物约 500 种,常见栽培的有:豆瓣绿、皱叶椒草、花叶垂枝豆瓣绿等。





叶子花

叶子花 *Bougainvillea spectabilis* 又名三角花、九重葛、宝巾等。紫茉莉科攀援灌木，茎干有刺；叶片卵圆形到椭圆状披针形，全缘、互生。花不显著，3朵聚生于枝端，为有色的苞片包围；苞片叶形，色泽鲜艳、大而美丽，为主要的观赏部分，有鲜红、砖红、紫红、黄、白和复色。观赏期甚长，可达半年之久。是热带和亚热带地区重要观赏花木，常植于花园、街道和庭园中。温带地区作盆栽花木。原产巴西，现广泛栽培于世界各热带地区。用扦插法繁殖，底温 25℃ 左右约 30 天可以生根。喜温暖、湿润和阳光充足；要求肥沃而排水良好的砂壤土。在热带地区需栽种在向阳而有支架的地方。北方温室盆栽，夏季需搬至室外阳光下载培，秋末移入温室越冬。

荷花

荷花 *Nelumbo nucifera* 又名莲花、芙蕖、芙蓉、水华、水芸、泽芝、藕等。睡莲科多年生挺水植物。具肥大的地下茎(藕);叶与花着生在节上,花大单生,挺出水面,单瓣或重瓣;花色鲜艳、花形美丽,有白色、粉红色至紫红色;花期较短约3天~4天。有品种约200余个,是中国十大传统名花之一。荷花与佛教有千丝万缕的联系,大乘佛教用荷花作佛像座,可能是取其出淤泥而不染之意。原产亚洲热带及大洋洲,分布较广。中国约有2500年的栽培历史。用分植地下茎繁殖,每段2节~3节,需带顶芽。华北地区清明前后用肥沃的壤土栽植于盆中或池塘。开始时水稍浅,出苗后逐渐增加水深,最深不可超过1.5米。同属植物还有美国黄莲,花黄色,产美洲。






睡莲

睡莲 *Nymphaea* 又名子午莲。睡莲科多年生水生植物。根状茎短粗；叶圆形，丛生浮于水面；花大型，直径5厘米~20厘米，耐寒种类花较小，浮在水面开花；热带睡莲花大，常高出水面20厘米~30厘米开花。每朵花可开3天~4天，中午开放，傍晚闭合，次日再开；也有夜间开，白天闭合的种类。睡莲花形美丽，色彩艳丽，有白、黄、粉红、红、紫和蓝等色，花期甚长。热带种常年开花，耐寒睡莲5月~9月开花。为水面优良观赏植物。中国有2000年左右的栽培历史，古希腊、古罗马时代敬睡莲为女神，泰国把睡莲定为国花。全属约40种，分布于热带至寒冷地区的世界各地，并有大量的杂交种。用分株和播种法繁殖。池塘或盆栽，喜强光，经常保持足够的水深。热带睡莲需在10℃以上的室内越冬，耐寒种越冬温度0℃~5℃左右。

王莲

王莲 *Victoria amazonica* 睡莲科多年生草本。有直立的短茎和发达的须根；叶缘直立，叶片圆形，像圆盘浮在水面，叶面光滑，背面和叶柄有许多坚硬的刺，直径可达2米以上；花大型，直径25厘米~40厘米，傍晚伸出水面开放，甚芳香，次日逐渐闭合，傍晚再次开放时为红色，第3天闭合并沉入水中。王莲是水生有花植物中叶片最大的植物，每叶片可承重数十公斤，为极有名的大型花卉。原产南美巴西，现已引种到世界各地大植物园和公园。甚受人们欢迎，用播种法繁殖，当年播种当年开花结果，作一年生栽培。喜阳光充足、肥沃深厚的土壤、大量的肥料，要求高水温和气温，播种水温30℃左右。种子不能离开水。冬春播种，春季下水定植，夏季开花。





耧斗菜

耧斗菜 *Aquilegia vulgaris* 毛茛科多年生宿根草本。茎直立，高约 60 厘米，分枝多；2 回 3 出复叶，具长柄，裂片浅而微圆；数朵花着生于茎上，花朵下垂，白、黄、红、蓝或紫色，直径约 5 厘米，距较短；花期 4 月~6 月。分布欧洲，中国及世界各地多有引种栽培，为美国国花。是较好的宿根花卉，常植于园林中林下，或植于花坛、花境，亦可作切花。培育出的大花栽培品种花色鲜艳、花大，且有重瓣品种。用播种或分株法繁殖。春秋播种，播种苗 2 年左右可以开花。定植苗 3 年~4 年需更新一次。耐寒、生长势强健，喜湿润而排水良好的砂质壤土。在半荫处生长更好。对高温、高湿抗性较弱。华北地区作宿根花卉栽培。