

田中榮信 編

皇漢醫學叢書

長沙證彙

人民衛生出版社

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

凡例

一此編撫長沙氏正經。櫟括諸章。去煩歸簡。欲易見也。如其傷寒論辨別。有逢原撰。不贅於此。

一世有傷寒類證者。其書本陰陽六經主脈狀。其杜撰謬妄。不可勝計。且與仲景氏之意。大有逕庭也。不必取。

一編中有證同方異者。蓋依有病毒之淺深緩急也。又不立發熱門者。熱之於病十八九。仲景氏依熱之大小有無耳。別無可處之方。無可加減之藥。病愈熱從之。

一此編傷寒金匱中。或有證無方。或有方無證者。其他可疑者。皆不載之。以俟識者耳。

男田中榮恒謹識

目次

嘔吐門(附唾涎沫噫噦).....	一	喘門(附咳嗽).....	二六
大便不通門(附艱難).....	四	諸黃門.....	二七
小便不利門(附難自利自調).....	五	下利門(附便膿血).....	二八
上衝門(附上氣氣逆).....	七	水腫門(附身重).....	二九
腹痛門(附滿脹少腹滿痛).....	八	短氣門.....	三〇
結胸門(附胸痹).....	一〇	咽痛門(附咽喉不利).....	三一
心下痞鞭門(附痞心中痞堅滿).....	一一	血證門(附經水不調).....	三一
胸脇苦滿門(附痛).....	一二	不仁門.....	三二
心下悸門(附臍下悸).....	一三	心中懊憹門.....	三三
惡寒門(附惡風往來寒熱振寒).....	一四	身瞤門.....	三三
厥冷門(附厥逆).....	一六	不得眠門(附臥起不安).....	三三
煩門.....	一七	識語門.....	三四
汗出門(附黃汗盜汗).....	一九	發狂門.....	三四
身疼痛門(附骨節痛).....	二一	癰膿門(附肺痿).....	三五
頭痛門.....	二二	蛇蟲門.....	三五
頸項強門.....	二三	陰疾門.....	三六
渴門(附口乾舌燥).....	二三	留飲門.....	三六
頭眩門(附冒眩).....	二五	宿食門.....	三六
裏急門(附拘攣痛).....	二五	雜門.....	三六

諸方目次

小半夏湯	三九	桂枝加厚朴杏子湯	四〇
小半夏加茯苓湯	三九	桂枝去芍藥加皂莢湯	四〇
大半夏湯	三九	桂枝加芍藥大黃湯	四〇
吳茱萸湯	三九	桂枝加龍骨牡蠣湯	四〇
大黃甘草湯	三九	桂枝加芍藥生薑人參湯	四〇
小薤胡湯	三九	桂枝去桂加茯苓朮湯	四〇
乾薑人參半夏丸	三九	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	四〇
乾薑黃連黃芩人參湯	三九	半夏瀉心湯	四〇
葛根湯	三九	甘草瀉心湯	四〇
葛根加半夏湯	三九	生薑瀉心湯	四〇
桂枝湯	三九	十棗湯	四〇
桂枝加桂湯	四〇	大薤胡湯	四一
桂枝加芍藥湯	四〇	黃芩人參湯	四一
桂枝去芍藥湯	四〇	黃芩湯	四一
桂枝加葛根湯	四〇	黃芩加半夏生薑湯	四一
桂枝加黃芪湯	四〇	四逆湯	四一
括蕋桂枝湯	四〇	四逆加人參湯	四一
桂枝加附子湯	四〇	茯苓四逆湯	四一
桂枝去芍藥加附子湯	四〇	通脈四逆湯	四一

通脈四逆加豬膽汁湯	四一	生薑甘草湯	四三
白通加豬膽汁湯	四一	桔梗湯	四三
附子粳米湯	四一	桔梗白散	四三
黃連湯	四一	梔子生薑豉湯	四三
茯苓澤瀉湯	四二	半夏厚朴湯	四三
文蛤散	四二	茯苓飲	四三
豬苓湯	四二	橘皮大黃朴消湯	四三
豬苓散	四二	生薑半夏湯	四三
五苓散	四二	調胃承氣湯	四三
芫胡加芒硝湯	四二	旋覆花代赭石湯	四三
真武湯	四二	橘皮湯	四四
白虎加桂枝湯	四二	橘皮竹茹湯	四四
芫胡加桂枝湯	四二	小承氣湯	四四
竹葉石膏湯	四二	大承氣湯	四四
甘草乾薑湯	四二	桂枝附子湯	四四
小青龍湯	四二	桂枝附子去桂加朮湯	四四
半夏乾薑散	四二	蜜煎導	四四
皂莢丸	四二	豬膽汁方	四四
苓甘薑味辛夏湯	四三	麻仁丸	四四
甘草粉蜜湯	四三	厚朴三物湯	四四
人參湯（一名理中丸）	四三	抵當湯	四四

茯苓戎鹽湯	四四	大黃牡丹湯	四六
蒲灰散	四五	抵當丸	四六
滑石白魚散	四五	苓桂朮甘湯	四六
桃花湯	四五	苓甘薑味辛夏仁黃湯	四六
八味丸	四五	大建中湯	四六
桂枝甘草附子湯	四五	瓜蒂散	四六
葵子茯苓散	四五	麥門冬湯	四七
越婢湯	四五	葶歷大棗湯	四七
越婢加朮湯	四五	桂枝枳實生薑湯	四七
越婢加半夏湯	四五	枳實薤白桂枝湯	四七
大黃硝石湯	四五	三物備急圓	四七
茵陳蒿湯	四五	走馬湯	四七
小建中湯	四五	當歸芍藥散	四七
芫胡桂枝乾薑湯	四五	芎歸膠艾湯	四七
芫胡加龍骨牡蠣湯	四六	枳實芍藥散	四七
括蘘瞿麥丸	四六	下瘀血湯	四七
苓桂五味甘草湯	四六	烏頭桂枝湯	四七
歸母苦參丸	四六	大烏頭煎	四七
大黃甘遂湯	四六	烏頭湯	四八
苓蘘朮甘湯	四六	當歸生薑羊肉湯	四八
芍藥甘草湯	四六	當歸建中湯	四八

厚朴七物湯	四八	附子瀉心湯	四九
厚朴生薑甘草半夏人參湯	四八	木防己湯	四九
己椒蘆黃丸	四八	木防己去石膏加茯苓芒硝湯	四九
梔子厚朴湯	四八	桂薑棗草黃辛附湯	五〇
梔子豉湯	四八	枳朮湯	五〇
硝礬散	四八	甘遂半夏湯	五〇
桃核承氣湯	四八	赤丸	五〇
天雄散	四八	麻黃湯	五〇
大陷胸湯	四八	厚朴大黃湯	五〇
土瓜根散	四八	苓甘五味薑辛湯	五〇
大陷胸丸	四九	葶藶湯	五〇
小陷胸湯	四九	大黃附子湯	五〇
茯苓杏仁甘草湯	四九	半夏麻黃丸	五〇
橘皮枳實生薑湯	四九	茯苓甘草湯	五〇
薏苡附子散	四九	桂枝甘草湯	五〇
括蕒薤白半夏湯	四九	苓桂甘棗湯	五〇
括蕒薤白白酒湯	四九	大青龍湯	五一
桂枝人參湯	四九	桂枝二越婢一湯	五一
赤石脂禹餘糧湯	四九	桂枝麻黃各半湯	五一
大黃黃連瀉心湯	四九	芍藥甘草附子湯	五一
瀉心湯	四九	附子湯	五一

防己黃芪湯	五二	頭風摩散	五三
白虎加人參湯	五一	芫胡去半夏加括蕢湯	五三
蜀漆散	五一	白頭翁湯	五三
牡蠣湯	五一	白頭翁加甘草阿膠湯	五三
白通湯	五一	文蛤湯	五三
白虎湯	五一	澤瀉湯	五三
當歸四逆湯	五一	雞屎白散	五三
當歸四逆加吳茱萸生薑湯	五一	葛根黃連黃芩湯	五三
烏梅圓	五一	一物瓜蒂湯	五三
桂枝甘草龍骨牡蠣湯	五一	麻黃醇酒湯	五三
酸棗仁湯	五一	豬膏髮煎	五三
乾薑附子湯	五一	梔子蘂皮湯	五三
黃連阿膠湯	五二	麻黃連軋赤小豆湯	五三
豬膚湯	五二	梔子大黃豉湯	五四
麻黃加朮湯	五二	麻黃甘草湯	五四
三物黃芩湯	五二	防己茯苓湯	五四
梔子乾薑湯	五二	麻黃附子甘草湯	五四
桂枝二麻黃一湯	五二	黃芪建中湯	五四
麻黃杏仁甘草石膏湯	五二	苓甘薑味辛夏仁湯	五四
黃芪桂枝苦酒湯	五三	牡蠣澤瀉散	五四
麻黃杏仁薤苳甘草湯	五三	梔子甘草豉湯	五四

半夏散及湯	五四	狼牙湯	五五
甘草湯	五四	蜘蛛散	五五
苦酒湯	五四	枳實梔子豉湯	五五
柏葉湯	五四	甘麥大棗湯	五五
黃土湯	五四	礬石湯	五五
赤小豆當歸散	五四	苦參湯	五五
桂枝茯苓丸	五四	薏苡附子敗醬散	五五
礬石丸	五五	排膿湯	五五
黃芪桂枝五物湯	五五	排膿散	五五
雄黃蘗	五五	茵陳五苓散	五五
蝕齒方	五五	杏子湯	五五
蛇牀子散	五五		

長沙證彙

播磨 田中榮信愿仲編撰

南部 村尾茂喬維遷
越後 奥田邦憲祐菴
播磨 菅原成美專輔
河野敬明淳治

同校

嘔吐門（附唾涎沫噎噦）

諸嘔吐穀不得下者。小半夏湯。嘔家本渴。渴者爲欲解。今反不渴。心下有支飲故也。同方胃反嘔吐者。大半夏湯。食穀欲嘔者。吳茱萸湯。食已卽吐者。大黃甘草湯。嘔而發熱者。小茈胡湯。傷寒五六日。嘔而發熱者。同方。妊娠嘔吐不止。乾薑人參半夏丸。傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆。吐下。若食入口卽吐。乾薑黃連黃芩人參湯。太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯。太陽中風。汗自出。漸漸惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯。產後中風。續得之。數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出者。同方。

右十二法嘔吐不得食或發熱證

嘔心下痞鞭者。大半夏湯。嘔而腸鳴心下痞者。半夏瀉心湯。傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹下雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔心煩不得安。甘草瀉心湯。太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人榮熱汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞭。滿引脇下痛。乾嘔。短氣。汗出。不惡寒者。十棗湯。傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞭。嘔吐而下利者。大茈胡湯。太陽病過經十餘日。反二三下之。後四五日。茈胡證仍在者。先與小茈胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。大茈胡湯。卒嘔吐。心下痞。膈間有水眩悸者。小半夏加茯苓湯。乾嘔下利者。黃芩人參湯。乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯。

右九法嘔吐心下痞鞭下利證

少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯。嘔而脈弱。小便復利。身有微熱見厥者。四逆湯。既吐且利。小便復

利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。同方。吐利。汗出發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷者。同方。少陰病飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐也。急溫之。同方。少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。或乾嘔。或咽痛。通脈四逆湯。少陰病下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加豬膽汁湯。

右七法嘔吐下利厥逆證

腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐者。附子粳米湯。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛欲嘔吐者。黃連湯。諸黃腹痛而嘔者。小茈胡湯。

右三法腹痛嘔吐證

胃反吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯。吐後渴欲得水而貪飲者。文蛤散。少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯。嘔吐而病在膈上。後思水者。猪苓散。先渴後嘔。爲水停心下。小半夏加茯苓湯。中風發熱六七日不解。而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散。

右六法嘔吐渴證

傷寒六七日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。小茈胡湯。陽明病。脇下鞭滿。不大便而嘔。舌上胎者。同方。本（按本字玉函無）太陽病不解。脇下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。同方。產婦云云。大便堅。嘔不能食者。同方。傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此胡加芒硝湯。嘔而胸滿者。吳茱萸湯。

右六法胸脇苦痛嘔證

少陰病腹痛小便不利。四肢沉重疼痛。自下利或嘔者。真武湯。溫瘧者身無寒但熱。骨節疼痛。時嘔者。白虎加桂枝湯。傷寒六七日熱。熱微惡寒。支節疼痛。微嘔。心下支結者。此胡加桂枝湯。

右三法支節疼痛嘔證

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。竹葉石膏湯。傷寒云云。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。甘草乾薑湯。右二法吐逆證

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯。婦人吐涎沫。小青龍湯。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬或喘者。同方。乾

嘔吐逆吐涎沫者。半夏乾薑散。欬逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠者。皂莢丸。欬逆倚息不得臥。小青龍湯。時復冒者。苓桂五味甘草湯。反更欬。胸滿者。苓甘五味薑辛湯。冒者必嘔。嘔者復內。半夏苓甘薑味辛夏湯。假令瘦人臍下悸。吐涎沫而癰眩。此水也。五苓散。虻蟲之爲病。令人吐涎沫。心痛發作有時。甘草粉蜜湯。大病差後喜唾。久不了了者。理中丸。

右九法乾嘔咳吐涎沫證

肺痿吐涎沫者。桂枝去芍藥加皂莢湯。肺痿欬唾。涎沫不止。咽燥而渴者。生薑甘草湯。肺痿吐涎沫而不咳者。甘草乾薑湯。欬而胸滿振寒。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯。同證。桔梗白散。

右五法肺痿肺癰涎沫濁唾證

發汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊懣。若嘔者。梔子生薑豉湯。胸滿心下堅。咽中怏怏。如有炙肉。吐之不出。吞之不下者。半夏厚朴湯。心胸中有停痰宿水。自吐出後。心胸間虛氣滿不能食。茯苓飲。飴食之在心胸間不化。吐復不出。速下除之。橘皮大黃朴硝湯。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中懊懣然無奈。生薑半夏湯。太陽病過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反澀。腹微滿。鬱鬱微煩者。調胃承氣湯。陽明病不吐不下。心煩者。同方。

右七法病在胸中欲嘔吐不出證

傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞鞭。噫氣不除者。旋覆代赭石湯。傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞭。乾（按乾字下脫嘔字。）噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯。

右二法心下痞鞭噯證

乾嘔噦若手足厥者。橘皮湯。噦逆者。橘皮竹茹湯。黃疸病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘噦者。小半夏湯。大便秘通。噦數識語者。小承氣湯。

右四法噦逆證

大便不通門（附鞭難）

中惡心痛腹脹。大便不通者。走馬湯。少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。大承氣湯。大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。同方。陽明病脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。可攻裏。大承氣湯。發熱惡寒。若腹大滿不通者。小承氣湯。

右四法大便不通腹脹滿證

傷寒若吐若下後不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。但發熱譫語者。大承氣湯。陽明病譫語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎也。同方。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足絳熱。汗出。大便難而譫語者。下之則愈。同方。產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱者。不食。食則譫語。同方。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏（按裏字衍）證。大便難。身微熱者。同方。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。同方。得病二三日云云。須小便利。尿定鞭。乃可攻之。同方。陽明病潮熱。大便微鞭者。可與大承氣湯。不鞭者。不與之。陽明病其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則譫語。小承氣湯。大便不通。噦數譫語者。同方。太陽病若吐若下若發汗。微煩。小便數。大便因鞭者。同方。傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。同方。

右十二法不大便譫語有燥屎證

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。若其人大便鞭。小便自利者。桂枝附子去桂加朮湯。陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖硬不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及與大豬膽汁。皆可為導。太陽病云云。小便數者。大便必鞭。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水者。五苓散。大便則難。其脾為約。麻仁丸。痛而閉者。厚朴三物湯。

右五法不大便鞭難證

陽明病脇下鞭滿。不大便。而嘔。舌上白胎者。小此胡湯。產婦云云。大便堅嘔不能食者。同方。

右二法不大便嘔證

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。尿雖鞭。大便反易。其色必黑。抵當湯。病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。不大便者。有瘀血。同方。

右二法大便鞭有瘀血證

小便不利門（附難自利自調）

小便不利者。茯苓戎鹽湯。小便不利者。蒲灰散。小便不利者。滑石白魚散。服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利者。桂枝去桂加苓朮湯。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。大承氣湯。少陰病二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利便膿血者。桃花湯。虛勞腰痛。小腹拘急。小便不利者。八味丸。

右七法小便不利或腹痛證

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或小便不利。少腹滿或喘者。小青龍湯。風濕相搏。骨節煩疼。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。桂枝甘草附子湯。妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩者。葵子茯苓散。少陰病二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重。疼痛。自下利者。真武湯。

右四法小便不利有水氣證

黃疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。大黃硝石湯。裏水者。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。故令病水。越婢加朮湯。黃汗之病。兩脛自冷。又從腰以上必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。桂枝加黃芪湯。傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯。陽明病發熱汗出。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此為瘀熱在裏。身必發黃。同方。太陽病。身黃脈沈。結少腹鞭。小便不利者。為無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯。男子黃。小便自利。小建中湯。黃疸病。小

便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。除熱必噦。噦者小半夏湯。

右八法小便不利或自利黃疸證

傷寒五六日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或心下悸。小便不利者。小茈胡湯。傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。此胡桂薑湯。傷寒八九日。下之。胸滿煩驚。小便不利。讞語。一身盡重。不可轉側者。此胡加龍骨牡蠣湯。

右三法胸脇苦滿小便不利證

太陽病發汗後。若脈浮。小便不利。微熱消渴者。五苓散。本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。渴而口燥煩。小便不利者。五苓散。陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯。小便不利者。有水氣。其人若渴者。括蕢瞿麥丸。

右四法小便不利渴證

太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難屈伸者。桂枝加附子湯。欬逆倚息不得臥云云。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕然如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。苓桂五味甘草湯。妊娠小便難。飲食如故者。歸母苦參丸。婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者。此爲水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯。

右四法小便難證

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澹者。桂枝附子湯主之。若其人大便鞭。小便自利者。桂枝附子去桂加朮湯。陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此爲津液內竭。雖硬不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。大豬膽汁方。及土瓜根方。若腎著之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。苓朮甘湯。太陽病六七日。表證仍在。脈微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞭滿。小便自利者。下血乃愈。抵當湯。

右四法小便自利證

太陽病若吐若下。若發汗微煩。小便數。大便因鞭者。小承氣湯。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急云。甘草乾薑湯。芍藥甘草湯。肺痿吐涎沫而不咳者。其人不渴。必遺尿。小便數者。甘草乾薑湯。

右三法小便數證

夫短氣有微飲。當從小便去之。八味丸。婦人病飲食如故。煩熱不得臥。而反倚息者。但利小便則愈。同方。夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯。諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。桂枝加黃芪湯。

右四法當利小便證

太陽病無汗。而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作剛瘕。葛根湯。陽明病發潮熱。大便溏。小便自可。胸脇滿不去者。小茈胡湯。傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。桂枝湯。腸澼者小腹痛。按之即痛。如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。大黃牡丹湯。

右四法小便自可證

嘔而脈弱。小便復利。身在微熱。見厥者。四逆湯。既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。同方。傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。抵當丸。男子消渴。小便反多。以飲一斗小便一斗。八味丸。

右四法小便復利證

上衝門（附上氣氣逆）

太陽病下之後。其氣上衝者。可與此方。桂枝湯。燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從少腹上衝心者。桂枝加桂湯。傷寒若吐若下後。心下厥滿。氣上衝胸。起則頭眩。苓桂朮甘湯。欬逆云云。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕然如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。苓桂五味甘草湯。治其氣衝。若面熱如醉狀。此爲胃熱上衝熏其面。加大黃以利之。苓乾薑味辛夏仁黃湯。心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝。皮起出見有頭足。上下痛而不可觸近者。大建中湯。太陽病無汗。而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。葛根湯。病如桂枝證。頭不痛。項不強。胸中痞硬。氣上衝咽喉。不得息者。瓜蒂散。