



家庭园艺丛书

# 观叶植物

陈榕生 主编

福建科学技术出版社

家庭园艺丛书



# 观叶植物

陈榕生 主编 谭忠奇 陈璋 编著

福建科学技术出版社



**图书在版编目 (CIP) 数据**

观叶植物/陈榕生主编. —福州: 福建科学技术出版社, 2001. 3

(家庭园艺丛书)

ISBN 7-5335-1769-5

I. 观… II. 陈… III. 园林植物, 观叶型—观赏园艺 IV. S687

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 86163 号

- 书 名** 观叶植物  
家庭园艺丛书
- 作 者** 陈榕生
- 责任编辑** 张晨曦
- 出版发行** 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
- 经 销** 各地新华书店
- 排 版** 福建省科发电脑排版服务公司
- 印 刷** 福建彩色印刷有限公司
- 开 本** 850 毫米×1168 毫米 1/32
- 印 张** 3
- 图 文** 96 码
- 版 次** 2001 年 3 月第 1 版
- 印 次** 2001 年 3 月第 1 次印刷
- 印 数** 1—8 000
- 书 号** ISBN 7-5335-1769-5/S·222
- 定 价** 16.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

家庭园艺丛书



# 观叶植物

陈榕生 主编 谭忠奇 陈璋 编著

福建科学技术出版社



**图书在版编目 (CIP) 数据**

观叶植物/陈榕生主编. —福州: 福建科学技术出版社, 2001. 3

(家庭园艺丛书)

ISBN 7-5335-1769-5

I. 观… II. 陈… III. 园林植物, 观叶型—观赏园艺 N. S687

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 86163 号

- 书 名** 观叶植物  
家庭园艺丛书
- 作 者** 陈榕生
- 责任编辑** 张晨曦
- 出版发行** 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
- 经 销** 各地新华书店
- 排 版** 福建省科发电脑排版服务公司
- 印 刷** 福建彩色印刷有限公司
- 开 本** 850 毫米×1168 毫米 1/32
- 印 张** 3
- 图 文** 96 码
- 版 次** 2001 年 3 月第 1 版
- 印 次** 2001 年 3 月第 1 次印刷
- 印 数** 1—8 000
- 书 号** ISBN 7-5335-1769-5/S·222
- 定 价** 16.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

# 写在前面



叶形、叶色具有较高观赏价值的一类植物通常称为观叶植物。这类植物种类繁多,并且大多数不受花期和果期的限制,叶色恒常,可终年观赏,在园艺应用上受到人们的广泛喜爱。随着人们生活水平的提高与居住条件的不断改善,这类植物被大量用于庭院的绿化和彩化,许多耐阴或阴性植物品种更是悄然入室,成为现代家庭居室装饰的首选材料。

阴生观叶植物大多数原产于美洲的低纬度地区、非洲南部以及东南亚的热带雨林地区,在自然环境中,许多种类属于林下植物。目前,蕨类、苏铁科、爵床科、大戟科、五加科、秋海棠科和单子叶植物中的天南星科、百合科、凤梨科、竹芋科、棕榈科和鸭跖草科等一些种类应用较多。但不同的观叶植物对于温度、光照、湿度等环境条件的要求不同,在生理生态上存在一定差异,因此在繁殖方法和栽培管理措施上必须因地制宜,因势利导,才能保证有较好的观赏性,达到优化、美化人居环境的目的。本书选择我国流行的 90 多种观叶植物,就其形态特点、家庭应用、生态习性、繁殖方法、栽培要点和病虫害防治等作了简明扼要的介绍,以期对观叶植物爱好者有所裨益■



# 目录

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 5 变叶木     | 34 海芋     | 66 紫背万年青  |
| 6 佛肚树     | 35 龟背竹    | 67 吊竹梅    |
| 7 花叶木薯    | 36 花叶万年青  | 68 紫露草    |
| 8 红桑      | 37 大王黛粉叶  | 69 铁十字秋海棠 |
| 9 红背桂     | 38 银肋亮丝草  | 70 白粉藤    |
| 10 斑叶橡皮树  | 39 春羽     | 71 吊金钱    |
| 11 琴叶榕    | 40 立叶喜林芋  | 72 球兰     |
| 12 黄金榕    | 41 青苹果喜林芋 | 73 尖叶红苋   |
| 13 垂叶榕    | 42 绿帝王喜林芋 | 74 紫叶酢浆草  |
| 14 马拉巴栗   | 43 三药槟榔   | 75 冷水花    |
| 15 彩叶草    | 44 夏威夷椰子  | 76 阔叶铁树   |
| 16 金边凤梨   | 45 袖珍椰子   | 77 苏铁     |
| 17 紫花凤梨   | 46 小琼棕    | 78 孔雀竹芋   |
| 18 美叶光萼荷  | 47 美丽针葵   | 79 玫瑰竹芋   |
| 19 彩叶凤梨   | 48 棕竹     | 80 饰叶肖竹芋  |
| 20 红星凤梨   | 49 散尾葵    | 81 旱伞草    |
| 21 火剑凤梨   | 50 加拿利椰子  | 82 鹅掌藤    |
| 22 荷兰铁    | 51 短穗鱼尾葵  | 83 澳洲鸭脚木  |
| 23 金边龙舌兰  | 52 金心吊兰   | 84 八角金盘   |
| 24 金边富贵竹  | 53 文竹     | 85 孔雀木    |
| 25 金心星点木  | 54 金边虎尾兰  | 86 长春藤    |
| 26 太阳神    | 55 蜘蛛抱蛋   | 87 豆瓣绿    |
| 27 金心巴西铁树 | 56 狐叶天门冬  | 88 竹节蓼    |
| 28 五彩朱蕉   | 57 网纹草    | 89 花叶良姜   |
| 29 酒瓶兰    | 58 紫金叶    | 90 花叶假连翘  |
| 30 绿萝     | 59 金脉爵床   | 91 金边水腊   |
| 31 白鹤芋    | 60 红刺露兜   | 92 南天竹    |
| 32 观音芋    | 61 翠云草    | 93 文殊兰    |
| 33 花叶芋    | 62 鹿角蕨    | 94 附录 观叶植 |
|           | 63 肾蕨     | 物的病虫害及    |
|           | 64 巢蕨     | 其防治方法     |
|           | 65 猪笼草    |           |

# 变叶木

*Codiaeum variegatum*

■ 变叶木又名洒金榕，大戟科变叶木属常绿灌木，原产南洋群岛及澳洲。

变叶木高可达3米；叶形、叶色变化极多，园艺上据叶形变化分为长叶系、正叶系、广叶系、有角系等品系；叶色有粉红、橙黄、暗红、紫红、亮绿、淡绿甚至黑褐，或数种颜色相混，并有灿烂的斑纹，名副其实，非常美丽。变叶木的许多品种适于室内盆栽，可以点缀几案或厅堂、会场，也可用于庭院、墙隅、花坛绿化，为观叶植物之上品。

**生态习性** 喜温暖湿润、光照良好的环境，忌干旱，忌浸水，不耐寒。

**繁殖** 扦插为主，于4~5月间剪下3~4节半木质化枝条，保留少许叶片，以草木灰蘸伤口，再扦插在基质中，20天后即生根。大苗也可用高压繁殖。

**栽培与病虫害** 栽培基质可用园土、腐叶土或塘泥。生长季节应保持盆土湿润，可常向叶面喷水。冬季气温低于8℃时，室外盆栽要移入室内并置于光照充足的东南或西南向的窗台为宜。室外盆栽每月施肥2次，室内株每月施肥1次，以氮肥为主，入秋后施2次磷钾肥，以增强抗性，入冬后不需施肥，可配合修剪每2年翻盆换土1次。变叶木不定芽多，适度

重剪可保持株形浓密。在高温、高湿和通风不良的环境中，易发生介壳虫和红蜘蛛危害。危害轻时，可用水清洗叶面或摘除病叶；严重时，用40%氧化乐果乳剂1000倍液喷杀之■



# 佛肚树

*Jatropha podagrica*

■ 肚树又叫玉树珊瑚、珊瑚花，大戟科麻风树属小灌木，原产中美洲西印度群岛，我国南方有栽培。

植株高 40~50 厘米，茎干粗壮，肉质，中部膨大如酒瓶，似佛肚。小枝红色，多分枝似珊瑚。叶大，盾状近圆形，3~5 裂，叶背粉绿色，叶面绿色。聚伞花序顶生，花小，橘红色。蒴果椭圆形，种子黑褐色。佛肚树茎肥肚鼓，叶大翠绿，四季有花，是极好的观叶、观花、观茎植物，适合各种不同的室内环境布置。

**生态习性** 喜较高温度，好充足阳光，较耐阴，耐干燥，忌积水，不耐寒。

**繁殖** 可用播种或扦插繁殖。种子发芽较缓慢，萌动约需 1 个多月。扦插前剪取嫩枝晾干浆汁后，插入沙床，保持介质潮湿，浇水不宜过多，在 22℃ 温度下，2~3 周可生根。

**栽培与病虫害** 盆栽宜用排水良好的沙质土壤种植。生长适温 20~28℃，生长季节每月应施 1~2 次复合液肥。夏天宜

置于遮阴、防雨、通风、阴凉处。入冬气温不低于 10℃，气温低时会落叶进入休眠期，此时要减少浇水，不需施肥。主要害虫有介壳虫、红蜘蛛，可用肥皂水冲洗叶片或摘除受害部分，严重时，用 80% 敌敌畏或 40% 的氧化乐果乳油 1000 倍液喷杀■



半島  
香語



# 花 叶 木 薯

*Manihot esculenta* cv. *Variegata*

■ 叶木薯又叫斑叶木薯，大戟科木薯属亚灌木，原产非洲西部。

植株高 1~2 米，有肉质块根，茎红色。叶互生，掌状深裂至全裂，有黄色斑块，叶柄红色，长约 20 厘米。花单性，雌雄同株，排成腋生或顶生的圆锥花序，黄绿色，无花瓣，夏季开花，花不显眼。花叶木薯绿色的叶片镶嵌黄色斑纹，叶柄和茎干红色，显得十分绚丽，是非常耐看且观赏期较长的观叶植物，适于多种场所的入口处和向阳处摆饰。

**生态习性** 喜光，喜温暖湿润气候，耐半阴和高温，不耐干旱，也不耐水湿。

**繁殖** 春夏初扦插繁殖。选择健壮茎干，剪成 3~4 节 10 厘米左右的茎段，放入清水中浸洗后晾干扦插，20 天左右生根。

**栽培与病虫害** 栽培宜用疏松、肥沃的微酸性壤土，环境不宜过干或过湿，太干会落叶，太湿易烂根。生长期应充分浇水，每月施 1 次复合液肥。秋季天气凉爽即落叶休眠，此时要减少浇水，控制施肥；次年春季才萌发新叶；越冬温度不低于 15℃。发生褐斑病或炭疽病时，用 1% 波尔多液或 50% 甲基托布津 1000 倍液或 45% 百菌清、多菌灵混合胶悬剂 1000 倍液喷洒。发现介壳虫时，用 40% 的氧化乐果乳油 1000 倍液喷杀 ■



# 红桑

*Acalypha wilkesiana*

■ 桑又叫铁苋菜，大戟科铁苋菜属常绿灌木，原产南洋群岛。

植株多分枝，高达 2~5 米。叶互生，宽卵形或卵状长圆形，长 10~15 厘米，顶端渐尖，叶柄、叶腋被疏毛，叶红色、绛红色或红色有紫斑，边缘有不规则锯齿。花单性，穗状花序淡紫色。红桑叶色奇特，南方常用作绿篱、点景或盆栽摆饰材料。


**生态习性** 喜温暖湿润气候和阳性环境。日照充足则叶色艳丽，光照不足则叶色变暗，耐干旱，忌积水，不耐严寒，生活力强。

**繁殖** 扦插繁殖。春、夏雨季取成熟嫩茎 10 厘米，插入沙床，约 3 周后可生根，成活率高，在温室中四季都可以扦插。

**栽培与病虫害** 栽培容易，管理粗放。每年春季修剪后换盆，盆土以疏松、肥沃的壤土为宜；生长期每半月施肥 1 次，以氮肥为主；冬季停止施肥，减少浇水，越冬温度宜在 13℃ 以上。常见红蜘蛛、介壳虫危害，可用水冲洗叶面；严重

时，用 40% 三氯杀螨醇乳油 1000~1500 倍液或 40% 的氧化乐果乳油 1000 倍液喷杀。

同类常见应用的还有金边红桑、银边红桑和黄桑等■





# 红背桂

*Excoecaria cochinchinensis*



■ 背桂又叫红背桂花、青紫木，大戟科土沉香属常绿灌木，原产我国广东、广西与越南。

植株高 1~2 米；叶对生，矩圆形或倒披针形，表面绿色，背面紫红色。花单性，雌雄异株，穗状花序腋生，花小，初始黄色，后为淡黄白色；南方夏、秋两季开花。红背桂枝叶扶疏，红绿相映，十分绚丽，是点缀会场、案头、几桌的观叶佳品，也可用于花坛、林下、院落、墙隅等处的绿化配置。

**生态习性** 喜温暖湿润气候和富含有机质、肥沃、排水良好的沙质土壤，耐半阴，耐干旱，不耐寒，忌强阳光。

**繁殖** 扦插繁殖。春夏期间取二年生小枝，剪成 8~10 厘米长的插条，晾干汁液后插于沙床，保持一定的空气湿度，1 个月左右便可生根长叶。

**栽培与病虫害** 栽培容易，可粗放管理，盆土以富含有机质、排水良好的沙质壤土为佳。生长期每月施饼肥稀液 1~2 次。盛夏置于半阴处养护，充分浇水，有利于保持叶色浓绿，太阳暴晒或缺水会使叶片变皱，越冬温度宜在 5℃ 以上。发生炭疽病时用 50% 多菌灵可湿性粉剂 600~800 倍液喷洒



# 斑 叶 橡皮 树

*Ficus elastica*

**斑**叶橡皮树又叫斑叶胶榕、斑叶印度橡胶树，桑科榕属木本观叶植物，原产热带亚洲的潮湿森林区，主要分布在印度、马来西亚等地。

常绿乔木，全株光滑，有乳汁，叶宽大有长柄，厚革质，亮绿色上有美丽花纹，长椭圆形或矩圆形，先端渐尖，边全缘，叶芽红色，具苞片。橡皮树叶大光亮，终年常绿，幼芽红色，颇为美丽，树形雄伟、挺拔，独具风格，是楼堂、大厅和庭院常用的大型摆饰观叶植物，在华南也是优良的风景区。

**生态习性** 性喜温暖、湿润气候，喜光，亦能耐阴，耐旱，喜肥，生长快。

**繁殖** 扦插或压条繁殖。压条在 5~8 月间进行，成活率高。扦插宜在 5 月份气温持续达 20℃ 以上时进行，将插穗插入砵糠灰、珍珠岩或黄沙等介质中，约 30 天生根，50 天后可移栽。盆栽幼苗，应放在半阴处。

**栽培与病虫害** 盆土宜用园土、腐叶土各半混合，盆底放些基肥。25℃ 以上的高温环境有利于生长，生长期间每月施液肥 1 次。盛夏每天除浇足水外，还需叶面喷水数次，秋冬减少浇水，长期低温和盆土潮湿易使根部腐烂；越冬温度不低于 5℃。成年植株每 2~3 年换盆 1 次。通风不良易生白粉病，高温干燥易致介壳虫和粉虱危害，可用 25% 粉锈宁可湿性粉剂 1000~1500 倍液或 40% 氧化乐果乳油 1000 倍液加 0.1% 中性洗衣粉喷杀■



# 琴叶榕

*Ficus lyrata*

■ 叶榕为桑科榕属大型木本观叶植物，原产热带非洲西部地区，热带地区栽培应用广泛。植株高大，有乳汁，叶革质，深绿，有蜡质，叶长 15~30 厘米，宽 10~20 厘米，先端阔而锐尖，近基部波状凹陷，似提琴，叶全缘呈波状，叶脉粗，黄绿色，具白点。琴叶榕叶形奇特，叶色亮绿，姿态优雅，是大堂、楼馆、客厅摆饰和庭院布景的高级观叶材料。

**生态习性** 喜高温多湿和通风透光的环境，以及肥沃、疏松、排水良好的土壤条件，耐阴，不耐寒。

**繁殖** 高压或扦插繁殖。压条一般在夏季选择粗壮的 2 年生枝条进行，成活率较高。一般在枝条上环剥 0.5~1 厘米宽的环带，但不损伤木质部，外面裹以糊状泥，用塑料布包裹，以保持湿度，防止水分蒸发，待长根后，连泥团剪下，上盆移植，幼苗宜置于半阴处。

**栽培与病虫害** 盆土宜用疏松、肥沃的沙质壤土或以园

土、腐叶土对半混合。生长适温 22~28℃，生长期每 2 周施 1 次腐熟的饼肥水。夏季要保持土壤湿润，保持较高的叶面水分和空气湿度，强光直射会使叶片缺乏光泽。冬季宜多照阳光，并要适当控制浇水，越冬温度不低于 8℃。成熟植株每 2~3 年换盆 1 次。很少发生病虫害■





## 黄金榕

*Ficus microcarpa* cv. Golden LEAVES

■ 金榕又叫金叶榕，桑科榕属常绿小乔木，是榕树的一个栽培品种，原产我国南部和亚洲热带地区。

植株常有气生根，叶互生，革质，卵圆形，长 5~10 厘米，金黄色，老叶或光照不足时叶会退化变成绿色。隐头花序球形。黄金榕枝叶浓密，叶色金黄，在阳光中极其雅丽耀眼，加之耐修剪，可成形，是盆栽摆饰和绿化应用的好材料，在我国南方园林绿化和庭院摆饰中大量栽培应用。

**生态习性** 喜光，喜高温多湿气候，适应性强，耐潮湿，耐瘠薄，喜肥沃、湿润的壤土。

**繁殖** 常用扦插繁殖。4~6 月间，剪取嫩枝顶端或 2 年生枝条长约 10 厘米，除去下部叶片，留上部 1~2 片叶，待伤口乳汁凝结后，插入沙盆中，保持 25℃ 左右的温度和较高的湿度，30 天左右即生根。

**栽培与病虫害** 盆栽宜置于阳光可及之处，生长较快，春季需换盆，增加肥土，并整形修剪，夏季高温应多浇水并保持较高空气湿度，生长期每月施肥 1~2 次，5℃ 以下低温易伤及叶、芽和嫩枝。生长期常有红蜘蛛危害，严重时用 20% 三氯杀螨醇乳油 1000~1500 倍液喷杀■



# 垂叶榕

**垂**叶榕又叫垂榕、垂枝榕，桑科榕属常绿乔木，原产印度，现世界各地都有栽种，我国南方应用很广。

垂榕自然分枝多，枝软如柳，下垂。叶互生，近革质，长圆形或椭圆形，长 3.5~10 厘米，顶端尾状渐尖，微外弯，隐头花序单个或对生于叶腋，球形。垂榕终年常绿，枝叶浓密，叶色青翠，盆栽常用来布置厅堂、宾馆及其入口处，也适合于客厅、窗台摆饰。

**生态习性** 喜高温湿润环境，需充足阳光，较耐寒，也耐阴。除夏天要适当遮阴外，其他季节可让阳光直射，忌低温干燥环境。

**繁殖** 扦插或高压繁殖。选取生长粗壮的成熟枝条或顶端嫩枝，每段 10~15 厘米，带 1~2 片叶作为插穗，于每年春、夏两季插入沙床，1 个月即可长根。苗期宜在半阴环境中养护管理。

**栽培与病虫害** 盆栽以疏松、肥沃、排水良好的壤土为宜，3~4 月结合换盆对植株进行修剪整形，增加肥土，有利生长。生长旺盛期要充分浇水，保持湿润，每半个月施 1 次液肥。越冬温度宜在 5℃ 以上。生长迅速，耐修剪。夏、秋季发生红蜘蛛危害时，可用水冲洗叶面，剪修病枝并移开病株；严重时用 20% 三氯杀螨醇乳油 1000~1500 倍液喷杀。

同类具有较高观赏价值的还有花叶垂榕，其叶面有白色或黄色斑，但不如垂榕耐寒



# 马拉巴栗

*Pachira macrocarpa*

**马**拉巴栗又名瓜栗，木棉科常绿小乔木，俗称“发财树”。原产墨西哥至哥斯达黎加，现广泛栽培。

植株高 3~5 米。掌状复叶有小叶 5~11 片，小叶倒卵状长圆形，下面被星状茸毛。花期 4~5 月，果期 9~10 月。幼枝柔软，易于编结造型，树姿优美；茎基部常膨大长成浑圆可爱的“萝卜头”，观赏价值很高，除编辫造型外，还可通过嫁接进行动物造型，适合宾馆、客厅等多种室内环境的摆饰布置。

**生态习性** 性喜高温多湿和阳光充足的环境，忌直射强光，耐阴，稍耐旱；忌积水；喜肥沃、疏松、排水良好的土壤环境。

**繁殖** 以播种、扦插为主。种子随采随播，晾晒收藏会影响发芽率。将种子点播在沙盆内，覆沙 2~3 厘米，浇透水，注意防止鼠害，3~5 天后开始发芽，20~30 天后幼苗上盆，置半阴环境养护。第二年当植株高达 60~100 厘米时，编辫加工。扦插在南方四季都可进行，北方宜在气温较高的夏季（5~8 月）进行。剪下成熟枝条 10~15 厘米，插于素沙中，10 周许生根，成活率很高，但头茎膨大不如播种苗明显。

**栽培与病虫害** 栽培土壤以肥沃、疏松的壤土为好。盆栽土不宜过湿，水分管理为不干不浇，浇则浇透，宁少勿多。生长季节每月可施复合液肥 1~2 次，盛夏要适当遮阴，向叶面喷水，以保持较高的空气湿度，对保持叶色和生长有利；强光直射易使叶片变黄变皱。入秋后，要减少浇水，控制施肥，不耐寒，冬季温度不低于 5℃。耐修剪，少见病虫害。

常见栽培的还有花叶马拉巴栗■

