




夏宜平 编著

家庭养花精品丛书

春季养花

CHUN
JIYANGHUA

传统花卉
一二年生花卉
多年生花卉
观叶与多肉植物



上海科学技术出版社

家庭养花精品丛书

春

季养花

夏宜平 编著



上海科学技术出版社

家庭养花精品丛书

春季养花

夏宜平 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

新华书店上海发行所经销

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 3

2000年11月第1版 2001年1月第2次印刷

ISBN 7-5323-5808-9/S·578

印数 6 001-11 200

定价: 16.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

目 录



概 述 1

传统花卉

国 兰 4

牡 丹 6

杜鹃花 8

山茶花 9

碧 桃 10

白玉兰 11

红 枫 12

兜 兰 13

蝴蝶兰 14

卡特兰 16

石斛兰 17

大花蕙兰 18

瓜叶菊 20

麦秆菊 34

金盏菊 22

西洋樱草 35

麝香菊 23

紫罗兰 36

金鱼草 24

香豌豆 38

金莲花 25

猴面花 40

虞美人 26

霞 草 41

报春花 27

柳穿鱼 42

蛾蝶花 28

花烟草 43

毛地黄 30

矢车菊 44

羽扇豆 31

福祿考 32

一二年生花卉

金盏菊 22

西洋樱草 35

麝香菊 23

紫罗兰 36

金鱼草 24

香豌豆 38

金莲花 25

猴面花 40

虞美人 26

霞 草 41

报春花 27

柳穿鱼 42

蛾蝶花 28

花烟草 43

毛地黄 30

矢车菊 44

羽扇豆 31

福祿考 32

目
录

多年生花卉

观叶与多肉植物

洋水仙	46	宽瓣嘉兰	63	橡皮树	74	生石花	86
郁金香	48	龙吐珠	64	蒲 葵	75	银脉单药花	87
风信子	50	虎耳草	65	喜林芋	76	佛肚树	88
马蹄莲	52	雪花莲	66	南洋参	78	鸡蛋花	89
花毛茛	53	宝莲灯花	67	凤尾蕨	79	黄花夹竹桃	90
鸢 尾	54	珊瑚花	68	白鹤芋	80	褐斑伽蓝	91
朱顶红	56	鸢尾蒜	69	彩云阁	81	小花龙舌兰	92
大岩桐	58	彩色海芋	70	箭山积雪	82		
满天星	60	地涌金莲	72	艳山姜	83		
贝 母	61			沙鱼掌	84		
蛇鞭菊	62			杪 櫟	85		

概述



近年来,人们为美化居住环境、陶冶情操,在庭院、厅堂、居室、阳台,甚至盥洗室等处都摆设观赏植物。然而,我国传统的家庭养花多以木本花卉为主,如杜鹃花、山茶花、牡丹等,当然还有传统的兰花。20世纪90年代以来,南方生产的和直接来自国外进口的众多花卉植物步入市场和家庭,或观叶、或观花、或观形、或观果。有些种类我们虽已熟知,但其新品种以及经新型工厂化生产的产品,仍令人耳目一新,如樱草、郁金香、彩色海芋、各类洋兰和多种观叶植物、多肉植物等。

本书采用图文对照形式,并按开花季节或主要观赏期分为春、夏、秋、冬四季介绍,共300余种。本册介绍春季花卉。

3~5月份正当万物复苏、生长旺盛、春花烂漫之时,盆栽花卉大多也已移出温室,但因植物种类不同,还需采取不同的管理措施。

☆ 温度管理——准备温室出房的植物应先接受锻炼,即在早春开始打开温室门窗或掀起保护地设施的保温膜等。而喜高温、高湿环境的白鹤芋、喜林芋、蝴蝶兰、卡特兰等还应继续置于温室内保温。为调控花期,可将准备春末夏初开花的杜鹃花、梅花、山茶花等置于5~15℃的相对低温处。

☆ 光照管理——大多数观花植物和仙人掌类、多肉植物应接受充分光照,但要特别注意开始为蝴蝶兰、蕨类植物等进行遮阳处理,避免强光直射。

☆ 水分管理——开春后植株的蒸腾量和需水量增加,为满足生长需要,

概述



应加大浇水量，以保持盆土湿润为宜；仙人掌与多肉植物也要间干间湿。但同时要防止春雨后盆中积水，如有积水应及时倾倒，地栽花卉更要注意防涝。

☆ 施肥管理——春季生长旺盛，需肥量加大，多数花卉可每隔1~2星期追施1次腐熟的稀薄液肥，尽可能以有机肥料为主，也可用复合肥，液肥浇灌的盐分浓度不能超过4%。采用有机液肥浇施后，应用清水淋洗叶面，防止沾污后造成烂叶现象。

☆ 病虫害防治——春季病虫害以预防为主，加强栽培地的通风，经常喷施百菌清、多菌灵、托布津等杀菌剂，尤其是雨后务必喷施。一旦植株叶面上形成一层薄薄的粉状层，往往说明已具有相当的抗病能力。

☆ 繁殖工作——春季是繁殖的黄金季节，夏秋季开花的一二年生草花需在春季播种；木本花卉中的杜鹃花、鸡蛋花，草本花卉中的菊花、海棠类、荷兰菊、合果芋等需在春季大量扦插；而结合春季出房换盆，又是蕨类植物、仙人掌类植物等进行分株繁殖的最佳时期。

A large indoor greenhouse filled with orchids. The foreground is dominated by a dense cluster of orchids, with several white flowers in sharp focus and many pink flowers in the background. The greenhouse structure, including the metal frame and translucent panels, is visible in the upper half of the image. The text "传统花卉" is overlaid in the center.

传统花卉

国兰

【学名】 *Cymbidium* spp.

【科属】 兰科，兰属

【原产】 中国

【习性】 属多年生常绿草本植物。具肉质根，根部常共生“根菌”，帮助吸收水分和养分。自然分布多在山林及丘陵地带，喜温暖、阴湿和通风良好的环境，忌阳光直晒，宜排水良好、富含腐殖质的微酸性土壤。

【养护管理】 常用分株繁殖，也可采取播种和组培法育苗。以3月份分株为最适宜，春兰长到7~8筒草、蕙兰长到11~12筒草时进行，每丛3筒草左右。注意若切割根系后，应在切口处涂上炭末或硫磺粉，防止腐烂。宜用腐叶土（又称“兰花泥”）作培养土，上盆时通过不断摇盆，使土向下，并将兰草叶基部四周的土按实，最后做成中间高、四周低的馒头形盆面，上盖细石子或翠云草。上盆后用细喷壶浇水，需放置在阴处10天左右后才可见光。兰花的适宜生长温度为15~25℃，在生长期应进行50%~70%的遮光和保持80%的湿度。春兰和蕙兰的耐寒力较强，但一些名品仍要保护越冬；墨兰、寒兰、建兰的耐寒力较差，需置室内朝南处，越冬保持3℃以上温度。

我国养兰有“春不出、夏不日、秋不干、冬不湿”之说，落实在具体措施上，即：
①浇水从盆边浇入，浇水时防止盆土过干或过湿，以免损伤根系，导致叶片发黄或枯焦。春、夏生长旺期可多浇，夏季炎热时还应喷水，以增加空气湿度；秋季保持盆土湿润即可；冬季则应严格控制水量。6~9月份为兰花新草生长旺盛季节，应结合浇水，每隔2~3星期追施稀薄、腐熟的饼肥或粪肥1次。
②兰花应置通风的荫棚下养护，冬季入室防寒，室温保持在1~3℃，并注意充分采光、透气。
③兰花易发生炭疽病，






高温多雨时更易感病，可用波尔多液、托布津或多菌灵等防治。此外，在梅雨季节易发生白绢病，也可用杀菌剂进行防治。

【特点与应用】中国兰恬淡素雅，清心似水，品质幽洁，养兰是一种高雅的享受。兰花又是著名的香花植物，古称“王者之香”。作为传统盆栽花卉，兰花可置书房、厅堂的案头、几架，平添诗情画意；也可露地配置于庭院的假山石旁或作花台，以梅兰竹菊“四君子”入画。

注：全世界兰属植物有50~60个种，分为地生兰和附生兰两大类，我国约产30个种，大多是地生兰，一般通称“中国兰”。按花期可分为：①春季开花类——春兰 (*Cymbidium goeringii*)，自然花期1~3月份；②夏季开花类——蕙兰 (*C. faberi*)，又称九节兰、夏兰，花期4~5月份；③秋季开花类——建兰 (*C. ensifolium*)，又称秋兰、四季兰，花期7~9月份；④冬季开花类——寒兰 (*C. kanran*)，墨兰 (*C. sinense*)，墨兰又称报岁兰，花期1~3月份。



牡丹

【学名】 *Paeonia suffruticosa*


【别名】 洛阳花、木芍药、百两金

【科属】 毛茛科，芍药属

【原产】 中国西北秦岭

【习性】 落叶灌木。性喜终年凉爽、阳光充足的环境，但忌强光曝晒，最怕高温高湿气候，不耐涝，宜深厚、富含腐殖质而又排水良好的黏质壤土。自然花期4~5月份。

【养护管理】 繁殖常用分株、嫁接法，也可播种。牡丹多用芍药根为砧木嫁接，秋季根接为主，根接苗栽于苗床中，经2~3年





取出移植。牡丹属深根系，地栽需先行深耕，并施足有机质基肥。肥水管理以开春后新梢抽生期和花谢后的生长期最为关键，追肥以速效液肥为主，浇水宜保持土壤适度湿润。盆栽时应在盆底垫碎瓦片等粒状物，以利充分排水。注意夏季高温时遮阳降温，尤其雨季必须及时排出盆中积水，否则极易烂根。花谢后，结合打残花，对植株进行整形修剪，保留主枝5~6枝，以使养分集中、花大色艳。

【特点与应用】牡丹为我国特产名花，花中之王，“国色天香”，名品甚多。地栽、盆栽皆宜，可配置庭院山石或于花坛丛植；亦有经促成栽培的年宵盆花，花开富贵。



杜鹃花

【学名】 *Rhododendron simsii*

【别名】 映山红、山踯躅、鹃花

【科属】 杜鹃花科，杜鹃花属

【原产】 分布广泛，以亚洲居多

【习性】 杜鹃花属种类多达近千种，习性差异大，但多数种产于高海拔地区，喜凉爽、湿润气候，忌酷热干燥。生长适温为 15 ~ 25℃，对光有一定要求，但不耐曝晒。要求富含腐殖质、疏松湿润及 pH 5.5 ~ 6.5 的酸性土壤。冬季有短暂休眠期，自然花期为 3 ~ 5 月份。

【养护管理】 常用扦插、嫁接与播种法繁殖，也可行压条和分株。嫁接时间不受限制，砧木多用一二年生毛鹃。毛鹃、夏鹃可以盆栽，栽培土多用山泥，也可在半荫蔽条件下地栽。杜鹃花根系扩展缓慢，属浅根性，盆内不可积水，地栽时夏季需覆盖，以防过干并利于降低地温。每隔 3 ~ 5 年换盆 1 次，同时修整根系。浇水以保持土壤湿润，水质忌碱性；要薄肥勤施，除高温季及冬季外，均可施用。杜鹃花超过 30℃ 或低于

5℃ 温度则生长趋于停滞，夏、秋季置荫棚内养护，并经常喷洒地面。杜鹃花一般在春、秋两季抽梢，以春梢为主，常通过摘心、摘蕾以加速植株成形。花后应及时摘去残花，并适当修剪和施肥。

【特点与应用】 杜鹃花为中国传统名花，以花繁叶茂、绮丽多姿著称，最宜在疏林下片植，是庭院中池畔、岩石旁点缀和作花篱的良好材料。因其萌发力强、耐修剪，可盆栽或制作树桩盆景。





山茶花

【学名】 *Camellia japonica*

【别名】 山茶、茶花、曼陀罗树

【科属】 山茶科，山茶属

【原产】 中国、日本

【习性】 常绿小灌木或乔木。喜温暖湿润和半阴环境，生长适温 18~25℃，不耐 0℃ 以下或 30℃ 以上温度。不耐积水，宜疏松、排水良好、呈微酸性的土壤，要求一定的

空气湿度。自然花期 3~5 月份。

【养护管理】 常用扦插、嫁接和播种繁殖。扦插适期为梅雨季，扦插苗至第 3 年可开花；嫁接以单瓣山茶花和油茶为砧木。地栽宜在 10 月下旬至 3 月上旬进行，因此时为其半休眠期，成活率高。盆栽的上盆时间为 11 月份或 2~3 月份，高温期间忌上盆。叶片呈革质，叶面蒸腾量不大，浇水勿过多，以保持土壤湿润而不积水为原则；植株终年常绿而花蕾孕育期长达 10 个月以上，因此耗肥量很大，必须施足基肥、合理追肥，并以腐熟、稀薄的有机肥为主。为使株形完美，花大色艳，需常修剪，除去病弱枝、过密枝，并及时疏蕾，以保证每个枝条上开出 1~2 朵大花。

【特点与应用】 山茶花青枝绿叶，花团锦簇，周年观赏，是著名的中国十大传统名花之一，也是家庭养花的常见种类。无论美化庭院及公共绿地，还是家庭盆栽摆设，均非常相宜，并是制作盆景的好材料。



碧桃

【学名】 *Prunus persica* f. *duplex*

【别名】 桃花、桃

【科属】 蔷薇科，李属

【原产】 中国

【习性】 落叶小乔木。耐寒，喜光，耐旱怕涝。浅根性，但须根多，适宜富含腐殖质而排水良好的轻质土壤，忌盐碱土和黏重土。树龄寿命长。自然花期3~4月份。

【养护管理】 以嫁接为主，砧木取毛桃或山桃，多在7~8月份进行芽接，也可于春季切接，成活率都较高。庭院地栽宜在早春或秋冬落叶后进行，种植穴内施足有机质基肥如堆肥、饼肥等，但种植不能过深。盆栽培养土掺入饼肥、骨粉等，盆底垫碎砖粒，以保证排水，并置采光充足处。碧桃每年需修剪整形，疏去中间密生枝，整成自然开心形。

同属植物中寿星桃适宜做盆栽和桩景，紫叶桃为观叶树种。

【特点与应用】 花开于明媚春日，栽于庭院内或草坪边缘，再配植垂柳，则成桃红柳

绿的传统春景。盆栽玩赏于室内，烂漫花开时，也颇快意。





白玉兰

【学名】 *Magnolia denudata*

【别名】 木兰、玉兰

【科属】 木兰科，木兰属

【原产】 中国

【习性】 落叶乔木。性喜温暖湿润，耐寒，稍耐阴，成年树较喜光。根肉质，喜肥，忌旱、涝。宜微酸性、富含腐殖质的土壤。先

花后叶，自然花期3~4月份。对温度敏感，花期变化大。

【养护管理】 可用播种、嫁接、压条或扦插法等繁殖。嫁接用木兰（紫玉兰）或山玉兰为砧木，秋接为主，嫁接苗经4年后可定植。不耐移植，露地庭院定植时需带土球，可在春季花谢后刚展叶或9月份移植，否则难以成活。施足基肥，春、秋生长期追施2~3次液肥。一般不必修剪，定植2~3年后，进入盛花期。

二乔玉兰为一杂交种，花呈淡紫色，欧美各国庭院中广为栽植。

【特点与应用】 为经典早春赏花树种，配植于庭院或厅堂前，尤显富贵高尚。



红 枫

【学名】 *Acer palmatum* var. *atropurpureum*

【别名】 紫红叶鸡爪槭

【科属】 槭树科，槭树属

【原产】 中国长江流域

【习性】 落叶小乔木，为鸡爪槭的变种。喜温暖湿润、气候凉爽的环境，喜光，但忌烈日曝晒，较耐寒，黄河以南都可露地越冬。根系发达，适宜土层深厚、微酸性和富含腐殖质的砂质壤土。

【养护管理】 采用播种和嫁接方式。秋季随采随播，或春播；嫁接以鸡爪槭为砧木，常在6~8月份用当年生嫩枝接。地栽选择阴湿肥沃而又排水良好处，秋冬落叶后移栽。生长最佳环境为白天晴朗，夜间凉爽，雨露滋润，昼夜温差大。盆栽养护也应移至阴凉湿润处，适当整形修剪，追施2~3次氮肥，以使枝叶繁茂、枝冠丰满。

【特点与应用】 红枫叶常年紫红色，为重要的园林色叶树种，我国长江流域一带广为栽植。庭院地栽、盆栽均宜，也是制作盆景的好材料。

