


中国植物志

第七十九卷



科学出版社

中国植物志

中国科学院中国植物志编辑委员会

国家自然科学基金资助项目

第七十九卷

科学出版社

1996

FLORA

REIPUBLICAE POPULARIS SINICAE

DELECTIS FLORAE REIPUBLICAE POPULARIS SINICAE
AGENDAE ACADEMIAE SINICAE EDITA

Tomus 79

Science Press

1996

(京)新登字 092 号

中国植物志

第七十九卷

责任编辑 曾桂芳

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1996 年 2 月第 一 版	开本: 787×1092 1/16
1996 年 2 月第一次印刷	印张: 7 3/4 插页: 2
印数: 1—2 200	字数: 167 000

ISBN 7-03-004914-4 / Q · 609

定价: 24.00 元

第七十九卷

被子植物门

双子叶植物纲

菊科(九)

帚菊木族

编辑

程用谦

编著者

程用谦(中国科学院华南植物研究所)

Tomus 79

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONEAE

COMPOSITAE (9)

MUTISIEAE

Redactor

Tseng Yung-chien

Auctor

Tseng Yung-chien (*Institutum Botanicaum Austrto-Sinense Academiae Sinicae*)

中国植物志第七十九卷系统目录

菊科 COMPOSITAE (9)

12. 帚菊木族 MUTISIEAE Cass.

184. 白菊木属 *Gochnatia* H. B. K.

1. 白菊木 *G. decora* (Kurz) A. L. Cabrera 2

185. 帚菊属 *Pertya* Sch.-Bip.

组 1. 帚菊组 Sect. *Pertya*

系 1. 华帚菊系 Ser. *Sinenses* Ling

1. 华帚菊 *P. sinensis* Oliv. 5
2. 狭叶帚菊 *P. angustifolia* Y. C. Tseng 7
3. 两色帚菊 *P. discolor* Rehd. 8
4. 单花帚菊 *P. uniflora* (Maxim.) Mattf. 9

系 2. 圆锥花序系 Ser. *Paniculatae* Y. C. Tseng

5. 昆明帚菊 *P. bodinieri* Vaniot 9

系 3. 卷叶系 Ser. *Phylicoides* Ling

6. 针叶帚菊 *P. phylicoides* J. F. Jeffrey 10
7. 异叶帚菊 *P. berberidoides* (Hand.-Mazz.) Y. C. Tseng 11
8. 单头帚菊 *P. monocephala* W. W. Smith 12
9. 巫山帚菊 *P. tsoongiana* Ling 12

系 4. 三脉系 Ser. *Scandentes* Ling

10. 长花帚菊 *P. glabrecens* Sch.-Bip. 13
11. 台湾帚菊 *P. shimozawai* Masamune 14
12. 尖苞帚菊 *P. pungens* Y. C. Tseng 16
13. 瓜叶帚菊 *P. henanensis* Y. C. Tseng 16

14. 疏花帚菊	<i>P. corymbosa</i> Y. C. Tseng	17
15. 腺叶帚菊	<i>P. pubescens</i> Ling	18
16. 心叶帚菊	<i>P. cordifolia</i> Mattf.	18
17. 聚头帚菊	<i>P. desmocephala</i> Diels	19

186. 蚂蚱腿子属 *Myripnois* Bunge

1. 蚂蚱腿子	<i>M. dioica</i> Bunge	21
---------	------------------------	----

187. 兔儿风属 *Ainsliaea* DC.

组 1. 花葶组 *Sect. Scaposae* Beauverd

1. 心叶兔儿风	<i>A. bonatii</i> Beauverd	27
2. 薄叶兔儿风	<i>A. mattfeldiana</i> Hand. - Mazz.	29
3. 多苞兔儿风	<i>A. multibracteata</i> Mattf.	30
4. 狭翅兔儿风	<i>A. apteroides</i> (Chang) Y. C. Tseng	30
5. 杏香兔儿风	<i>A. fragrans</i> Champ.	31
6. 红脉兔儿风	<i>A. rubrinervis</i> Chang	33
7. 厚叶兔儿风	<i>A. crassifolia</i> Chang	34
8. 泸定兔儿风	<i>A. mollis</i> Diels ex Limpr.	34
9. 花莲兔儿风	<i>A. paucicapitata</i> Hayata	35
10. 边地兔儿风	<i>A. chapaensis</i> Merr.	35
11. 宽叶兔儿风	<i>A. latifolia</i> (D. Don) Sch. - Bip.	36
12. 大头兔儿风	<i>A. macrocephala</i> (Mattf.) Y. C. Tseng	39
13. 药山兔儿风	<i>A. mairei</i> Lévl.	40
14. 异花兔儿风	<i>A. heterantha</i> Hand. - Mazz.	41
15. 长穗兔儿风	<i>A. henryi</i> Diels	41
16. 长柄兔儿风	<i>A. reflexa</i> Merr.	42
17. 细穗兔儿风	<i>A. spicata</i> Vaniot	43
18. 云南兔儿风	<i>A. yunnanensis</i> Franch.	44
19. 黄毛兔儿风	<i>A. fulvipes</i> J. F. Jeffrey	45
20. 闭花兔儿风	<i>A. cleistogama</i> Chang	45
21. 秀丽兔儿风	<i>A. elegans</i> Hemsl.	46
22. 莲沱兔儿风	<i>A. ramosa</i> Hemsl.	48
23. 红背兔儿风	<i>A. rubrifolia</i> Franch.	49

24. 小兔儿风	<i>A. nana</i> Y. C. Tseng	50
25. 马边兔儿风	<i>A. angustata</i> Chang	51
26. 屏边兔儿风	<i>A. pingbianensis</i> Y. C. Tseng	52
27. 直脉兔儿风	<i>A. nervosa</i> Franch.	52
28. 细茎兔儿风	<i>A. tenuicaulis</i> Mattf.	53
29. 四川兔儿风	<i>A. sutchuenensis</i> Franch.	55
30. 狭叶兔儿风	<i>A. angustifolia</i> Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke	56

组 2. 密聚组 Sect. *Aggregatae* Beauverd

31. 槭叶兔儿风	<i>A. acerifolia</i> Sch. - Bip.	57
32. 灯台兔儿风	<i>A. macroclinidioides</i> Hayata	59
33. 粗齿兔儿风	<i>A. grossedentata</i> Franch.	60
34. 纤枝兔儿风	<i>A. gracilis</i> Franch.	61
35. 蓝兔儿风	<i>A. caesia</i> Hand. - Mazz.	62
36. 车前兔儿风	<i>A. plantaginifolia</i> Mattf.	62
37. 异叶兔儿风	<i>A. foliosa</i> Hand. - Mazz.	63
38. 三脉兔儿风	<i>A. trinervis</i> Y. C. Tseng	64
39. 华南兔儿风	<i>A. walkeri</i> Hook. f.	66
40. 无翅兔儿风	<i>A. aptera</i> DC.	66
41. 紫枝兔儿风	<i>A. smithii</i> Mattf.	67
42. 光叶兔儿风	<i>A. glabra</i> Hemsl.	68
43. 穆坪兔儿风	<i>A. lancifolia</i> Franch.	69

组 3. 多叶组 Sect. *Frondosae* Beauverd

44. 腋花兔儿风	<i>A. pertyoides</i> Franch.	70
-----------	------------------------------	----

188. 栌菊木属 *Nouelia* Franch.

1. 栌菊木	<i>N. insignis</i> Franch.	73
--------	----------------------------	----

189. 大丁草属 *Gerbera* Cass.

组 1. 唇舌组 Sect. *Anandria* (Siegesb. ex Linn.) O. Hoffm.

1. 箭叶大丁草	<i>G. maxima</i> (D. Don) Beauverd	77
2. 合纓大丁草	<i>G. connata</i> Y. C. Tseng	78

3. 长喙大丁草	<i>G. kunzeana</i> A. Br. et Aschers.	78
4. 丽江大丁草	<i>G. lijiangensis</i> Y. C. Tseng	79
5. 红缨大丁草	<i>G. ruficoma</i> Franch.	81
6. 翼齿大丁草	<i>G. pterodonta</i> Y. C. Tseng	82
7. 大丁草	<i>G. anandria</i> (Linn.) Sch. - Bip.	82
8. 早花大丁草	<i>G. bonatiana</i> (Beauverd) Beauverd	83
9. 弯苞大丁草	<i>G. curvisquama</i> Hand. - Mazz.	84
10. 晚花大丁草	<i>G. serotina</i> Beauverd	85
11. 石上大丁草	<i>G. saxatilis</i> Chang ex Y. C. Tseng	86

组 2. 大丁草组 Sect. *Gerbera*

12. 白背大丁草	<i>G. nivea</i> (DC.) Sch. - Bip.	86
13. 阔舌大丁草	<i>G. latiligulata</i> Y. C. Tseng	87
14. 光叶大丁草	<i>G. raphanifolia</i> Franch.	89
15. 钩苞大丁草	<i>G. delavayi</i> Franch.	89
16. 蒙自大丁草	<i>G. henryi</i> Dunn	90
17. 巨头大丁草	<i>G. macrocephala</i> Y. C. Tseng	92
18. 钝苞大丁苞	<i>G. tanantii</i> Franch.	93

组 3. 毛足菊组 Sect. *Lasiopus* (Cass.) O. Hoffm.

19. 毛大丁草	<i>G. piloselloides</i> (Linn.) Cass.	94
20. 非洲菊	<i>G. jamesonii</i> Bolus	96

中名索引	97
拉丁名索引	100

12. 帚菊木族 MUTISIEAE Cass.

Cass. in Dict. Sci. Nat. 8: 395. 1817, 20: 379, 1821, 32: 462. 1824, 60: 584.

1830; Less. in Linnaea 5: 239. 1830, Synops. Comp. 93. 1832; O. Hoffm.

in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. 5: 333. 1894.

草本或灌木，稀为乔木。叶互生。头状花序有异型小花，放射状或盘状，边缘小花雌性，中央小花两性，或头状花序仅有同型小花，小花全部两性或雌花和两性花（子房不育）异株；总苞片通常多层，覆瓦状排列，少仅有5枚而大小近相等者；花托平、微凸，少有凹陷，无托片；雌花花冠二唇形，外唇具舌片或否，顶端具3齿，内唇丝状2裂；两性花花冠二唇形，两侧对称或冠檐深5裂而辐射对称；花药基部箭形，具尖的长尾部，顶端常有附片；两性花的花柱分枝顶端截平、圆、钝，少有略尖。瘦果随不同的属、种而异。冠毛毛状或极少无冠毛。

主要分布于美洲和非洲，次为亚洲东南部。O. Hoffmann 将本族分为3个亚族，我国产的6个属分别隶于白菊木亚族 (Subtrib. Gochnatinae O. Hoffm.) 和大丁草亚族 (Subtrib. Gerberinae O. Hoffm.)。

分属检索表

1. 两性花花冠辐射对称 (白菊木亚族 Subtrib. Gochnatinae O. Hoffm.).
 2. 小乔木；头状花序聚集成放射状的复头状花序，花先叶开放；冠毛2层，外层略短 184. 白菊木属 *Gochnatia* H. B. K.
 2. 灌木、亚灌木或草本；头状花序单生、双生或组成疏松的伞房花序或具叶的大圆锥花序，稀排成团伞花序，花后叶开放；冠毛1层，近等长 185. 帚菊属 *Pertya* Sch.-Bip.
1. 两性花花冠二唇形，两侧对称 (大丁草亚族 Subtrib. Gerberinae O. Hoffm.).
 3. 头状花序同性，全为两性花或雌花和两性花（子房不育）异株。
 4. 总苞片仅5枚，大小近相等；头状花序雌花和两性花（子房不育）异株 186. 蚂蚱腿子属 *Myrtilloides* Bunge
 4. 总苞片多数、多层，大小极不等；头状花序全为能育的两性花。
 5. 草本；头状花序少花，通常3朵，稀有4朵或1朵，花冠无舌片；冠毛为羽状毛 187. 兔儿风属 *Ainsliaea* DC.
 5. 小乔木；头状花序多花，边缘花花冠具舌片；冠毛为具齿的糙毛 188. 栉菊木属 *Nouelia* Franch.
 3. 头状花序异性，边缘花雌性，盘花两性 189. 大丁草属 *Gerbera* Cass.

184. 白菊木属 *Gochnatia* H. B. K.

H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Pl. 4: 19. 1820; A. L. Cabrera in Revista

Museo La Plata (nueva serie) Secc. Bot. 12: 7. 1971. — *Leucomeris* D.

Don, Prodr. Fl. Nepal. 169. 1825.

灌木至小乔木。叶互生，具柄，全缘或有疏齿，背面被白色绒毛或无毛而具粘性分泌物。头状花序同型，盘状，于枝顶作伞房状、圆锥状或复头状花序式排列，稀有单生；总苞倒锥形或近卵形，总苞片多层，覆瓦状排列，外层短，卵形，向内各层渐次较长而为披针形或长圆形；花托平坦，无毛或被流苏状毛。花全部两性，均结实，花冠管状，檐部稍扩大，5深裂，裂片略整齐，多少外卷；花药基部箭形，具毗连的长尾；花柱分枝略增厚，短而扁，顶端钝、圆。瘦果近圆柱形，具纵棱，常被长毛。冠毛多数，2层，外层略短，粗糙，刚毛状。

66种，分布于美洲和亚洲东南部。我国仅1种，产云南。

1. 白菊木

Gochnatia decora (Kurz) A. L. Cabrera in Revista Museo La Plata (Nueva serie) Secc. Bot. 12: 131. 1971; Koyama in Acta Phytotax. Geobot. 32: 60. 1981. — *Leucomeris decora* Kurz in Journ. Asiat. Soc. Beng. 41(2): 317. 1872; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 387. 1881; Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 28: 77. 1889; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 660. f. 1-6, 1924; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20: 53. 1967; Kitamura in Acta Phytotax. Geobot. 23: 144. 1969; 中国高等植物图鉴 4: 657. 图 6727. 1975.

落叶小乔木，高2—5米。枝有条纹，幼时白色，被绒毛。叶片纸质，椭圆形或长圆状披针形，长8—18厘米，宽3—6厘米，顶端短渐尖或钝，基部阔楔形，两侧常不等长，边缘浅波状，具极疏的胼胝体状小齿，上面光滑，仅幼时被毛，下面被绒毛；中脉两面均凸起，于下面尤著，侧脉8对或有时更多，基部近平展几成直角从中脉发出，后弧形上升离缘弯拱连接，网脉明显，网眼小；叶柄长1.5—4厘米，多少被毛，内侧腋芽厚被绢毛。头状花序于花期直径近1厘米，近无梗或有短梗，通常8—12个或有时更多复聚成复头状花序；总苞倒锥形，直径4—5毫米；总苞片6—7层，外层卵形，被绵毛，长2—4毫米，宽约2毫米，顶端钝，中层长卵形或卵状披针形，略被毛，长约6毫米，宽2—2.2毫米，顶端钝或短尖，最内层狭长圆形或线形，长约13毫米，宽1.3—2毫米，质薄，无毛，顶端尖；花托圆盘状，无毛，直径约1毫米。花先叶开放，白色，全部两性；花冠管状，长约2厘米，檐部稍扩大，5深裂，裂片近等长，卷曲，长7—8毫米；花药顶端尖，长约10毫米，尾部向下渐尖，长为花药的1/3；花柱分枝内侧略扁，钝，长达1.5毫米。瘦果圆柱形，长约12毫米，基部略狭，具纵棱，密被倒伏的绢毛。冠毛淡红色，不等长，长13—15毫米。花期3—4月。

产于云南南部至西部（北至大理）。生于山地林中，海拔1100—1900米。越南、泰国、缅甸也有分布。

185. 帚菊属 *Pertya* Sch.-Bip.

Sch.-Bip. in Bonplandia 10: 109. 1862; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 493. 1873; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. 5: 340. 1894. — *Macroclinidium* Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 15: 375. 1870; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 493. 1873.

灌木、亚灌木或多年生草本。枝纤细，斜展呈帚状或罕有近攀援状，大部分有长枝和短枝之别。叶在长枝上的互生，在短枝上的数片簇生，然亦有无短枝而叶全为互生者，具柄，全缘、具疏粗齿或细齿。头状花序无梗或具长短不等的梗，腋生、顶生或生于簇生叶丛中，单生、双生、排成紧密的团伞花序或疏松的伞房花序，稀有作广展具叶的大圆锥花序式排列，盘状，全为两性能育的小花，少有雌雄异株者，每一头状花序通常有花数朵，稀有多达 10—15 花或少至 1 花；总苞钟形、狭钟形或圆筒状，总苞片少层至多层，覆瓦状排列，草质或近革质，外层极短，向内各层渐次较长，顶端常钝圆，少有短尖或刺尖状，背面多少被毛；花托小，平坦或蜂窝状，无毛或沿窝孔边缘密被长软毛；花冠管状，冠檐微扩大，5 深裂，裂片狭而长，外卷；花药合生，顶端尖，基部箭形，具线形的长尾，仅 1 种其花药离生而基部无尾；花柱长，花柱分枝极短，外展，顶端钝。瘦果圆柱形、倒卵形或倒锥形，顶端略收狭，基部渐狭，具 5—10 纵棱，被柔毛。冠毛为具细齿的糙毛，1 层，白色、污白色至褐色。

24 种，全分布于亚洲（日本有 5 种，阿富汗有 2 种，泰国仅 1 种）。我国有 17 种，1 变种，分布很广，东起台湾，西至青海，北达甘肃、宁夏，南抵广东、广西及西南部的云南等省区。

本属种类少，其分布范围亦狭。1900 年，T. Makino (Bot. Mag. Tokyo 14: 144.) 根据日本产的 5 个种将本属分为 2 个组 [Sect. *Pertya*, Sect. *Macroclinidium* (Maxim.) Makino]。嗣后，S. Kitamura (Journ. Jap. Bot. 14: 379—382. 1938) 和林镕 (Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6: 24. 1948) 均赞同 T. Makino 的分组概念。时至今日，本属的种类虽已增至 24 种，然而 T. Makino 的分组概念仍然是恰当的，故本志亦采用之。但是，Sect. *Macroclinidium* (Maxim.) Makino 所包含的 3 个种皆为日本所特有，我国不产。

分种检索表

1. 叶长圆形、线状披针形或线形，极少有近椭圆者，很狭，宽 1—6 (15) 毫米，边全缘，少有于叶片中部具 1 对角状粗齿；1 脉或罕有不明显或纤细的侧脉，但无 3 基出脉。
 2. 总苞片 3—4 层，少有 5 层，少数；叶片扁平。
 3. 头状花序多花或有时雌株的仅具 2 朵花。
 4. 总苞宽，直径 5—8 毫米，总苞片无毛或边缘多少被毛；头状花序具长达 2—3 厘米的梗。

5. 叶通常宽12—15毫米, 有明显的侧脉和网脉; 花雌雄异株, 雌头状花序具退化雄蕊; 总苞长达12毫米 1. 华帚菊 *P. sinensis* Oliv.
5. 叶较狭, 宽3—6毫米, 1脉, 无侧脉和网脉; 头状花序全为两性花; 总苞短, 长5—6毫米 2. 狭叶帚菊 *P. angustifolia* Y. C. Tseng
4. 总苞狭, 直径2—3毫米, 总苞片背面密被白色绵毛; 头状花序近无梗或具长2—5毫米的短梗 3. 两色帚菊 *P. discolor* Rehd.
3. 头状花序仅有1花。
 6. 叶长圆形至线形, 长11—40毫米, 宽2—5毫米; 头状花序单生于簇生叶丛中, 总苞片3层; 花药离生, 基部无尾 4. 单花帚菊 *P. uniflora* (Maxim.) Mattf.
 6. 叶椭圆形或倒卵形, 长2—12毫米, 宽1—6毫米; 头状花序腋生或顶生, 复组成开展、具叶的大圆锥花序 5. 昆明帚菊 *P. bodinieri* Vaniot
2. 总苞片多数, 至少6—7层, 叶片边缘强背卷而几成圆柱状, 倘略背卷而叶片扁平时, 则其总苞片达16—18层之多。
 7. 头状花序多而小, 长10—15毫米, 直径7—10毫米, 单生于簇生叶丛中或兼生于小枝之顶, 每一头状花序具花4—6朵。
 8. 短枝簇生叶同型, 均强背卷近圆柱状, 顶端具针刺状尖头, 上面无毛, 下面未被卷盖的沟槽内密被白色绢毛, 但无星状毛 6. 针叶帚菊 *P. phyllicoides* J. F. Jeffrey
 8. 短枝簇生叶异型, 有强背卷而近圆柱状者, 亦有略背卷而扁平者, 二者顶端均钝或圆; 扁平的叶长圆形或匙状长圆形, 上面被白色星状毛, 下面无毛 7. 异叶帚菊 *P. berberidoides* (Hand.-Mazz.) Y. C. Tseng
 7. 头状花序少而大, 长2.5—3厘米, 直径15—25毫米, 单生于枝顶, 稀兼有腋生, 每一头状花序具花7—11朵。
 9. 头状花序全部顶生, 具5—25毫米长的梗; 总苞钟形, 基部圆, 总苞片约6层; 叶边缘强背卷几成圆柱状, 下面未被卷盖的沟槽内密被白色绢毛, 顶端具锐利的刺状尖头 8. 单头帚菊 *P. monocephala* W. W. Smith.
 9. 头状花序顶生和腋生俱存, 无梗; 总苞陀螺状钟形, 基部长渐狭似梗, 总苞片16—18层; 叶扁平, 下面无毛, 顶端钝或圆, 间有中脉延伸而成小的凸尖 9. 巫山帚菊 *P. tsoongiana* Ling
1. 叶卵形至阔卵形, 稀有短枝上的为椭圆形, 较大, 宽3 (2.5) —7.5厘米, 边缘有多数锯齿, 具3条强壮基出脉。
 10. 枝有长短枝之别, 长枝上的叶互生, 短枝上的叶3—4片簇生; 头状花序单生于长枝之顶或短枝的簇生叶丛中。
 11. 短枝簇生叶椭圆形; 头状花序单生于短枝簇生叶丛中; 总苞片顶端全部钝、圆或有时具小凸尖 10. 长花帚菊 *P. glabrescens* Sch.-Bip.
 11. 短枝簇生叶卵形; 头状花序单生于长枝之顶; 总苞片自外向内各层其顶端由短尖、渐尖至长渐尖 11. 台湾帚菊 *P. shimozawai* Masamune
 10. 枝无长枝和短枝之别, 叶全部互生; 头状花序于上部叶腋内组成紧密的团伞花序或疏松的伞房花序, 极小为双生与单生兼有者。
 12. 头状花序有花4—12朵; 总苞阔钟形或狭钟形, 直径5—12毫米。
 13. 总苞片自外向内各层其顶端由短尖至渐尖, 尖头锐利, 针刺状 12. 尖苞帚菊 *P. pungens* Y. C. Tseng
 13. 总苞片顶端圆或钝, 倘内层顶部稍狭, 其尖端仍钝, 绝不成为针刺状。
 14. 头状花序具1—4厘米长的梗, 单生与双生兼有或复组成疏松的伞房花序; 叶基部阔楔形、钝圆或截平。
 15. 头状花序全为两性花; 总苞狭钟形, 直径5—6毫米; 瘦果无毛或顶部被极疏的短柔

- 毛；冠毛干时污白色 13. 瓜叶帚菊 *P. henanensis* Y. C. Tseng
 15. 头状花序外围1层为雌花，中央的为两性花；总苞阔钟形，直径达12毫米；瘦果密被粗毛；冠
 毛干时褐色 14. 疏花帚菊 *P. corymbosa* Y. C. Tseng
 14. 头状花序无梗或稀有具长约4毫米的短梗，常3—8复组成紧密的团伞花序，团伞花序柄长4—20毫
 米；叶基部通常阔心形至浅心形，少有截平。
 16. 叶顶端短尖或钝，两面密被柔毛，下面还有亮褐色小腺点；头状花序有花9—12朵
 15. 腺叶帚菊 *P. pubescens* Ling
 16. 叶顶端渐尖至长渐尖，尖头长1—2厘米，两面被疏毛，下面无腺点；头状花序仅有花4—5朵
 16. 心叶帚菊 *P. cordifolia* Mattf.
 12. 头状花序仅有1朵花；总苞狭，圆筒形，直径仅3毫米 17. 聚头帚菊 *P. desmocephala* Diels

组 1. 帚菊组 Sect. *Pertya* — *Macroclinidium* auct. non (Maxim.) Makino: Beauverd
 in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 1: 386. 1909.

灌木或亚灌木，枝常有长枝和短枝之别；叶在长枝上的互生，在短枝上的簇生；花托
 通常无毛或罕有被极疏的柔毛。

系 1. 华帚菊系 Ser. *Sinenses* Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 6: 26. 1948.

叶小，披针形或线状披针形，全缘，通常1脉，稀具细弱的侧脉；头状花序单生于短
 枝的簇生叶丛中；苞片3—4层，少数。

1. 华帚菊(中国高等植物图鉴) 图版 1: 1—3

Pertya sinensis Oliv. in Hook. Icon. Pl. 23: t. 2214. 1892; Diels in Bot. Jahrb. 29: 628.
 1901; Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 1: 387. 1909; Bean in Kew Bull. 1910: 174.
 1910; Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 104. 1934; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 13: 409.
 1932; Mattf. in Acta Hort. Gotob. 8: 78. 1933; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 3:
 180. 1935, et op. cit. 6: 27. 1948; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20: 296, 1967; 中国
 高等植物图鉴 4: 657. 图 6728, 1975. 秦岭植物志 1(5): 383. 图 275, 1985. — *Myrionis*
maximoviczii C. Wink. in Acta Hort. Petrop. 13: 12. 1893.

落叶灌木，高1—2米。枝有长短枝之别，长枝纤细，具显著纵棱和沟槽，老枝的皮
 易开裂。长枝上的叶互生，叶片长圆状披针形至披针形，长3—5厘米，宽12—15毫米，
 顶端渐尖或短尖，基部渐狭或有时钝，全缘，两面沿脉被疏毛，中脉上尤著，边缘有柔
 毛，毛随叶变老而后逐渐脱落；中脉和柔弱的侧脉于两面均凸起，网脉明显；叶柄纤细，
 短，长2—4毫米；腋芽为被白色柔毛的鳞片所包裹，卵球形，直径约2毫米；短枝上的
 叶4—6片簇生，叶片长圆状披针形或狭椭圆形，大小常不等，大者长4—6厘米，宽12
 —15毫米，小者仅为大者之半或更小，顶端钝或有时略尖，基部长渐狭，其它性状与长
 枝的互生叶相似。头状花序单生于短枝簇生叶丛中，雌雄异株，雌头状花序于花期长约
 10毫米，具花4—5朵，雄者略短，长6—7毫米，具花9—12朵；总花梗极纤细，长2—
 3厘米，被疏毛或后脱毛；总苞狭钟形或近圆筒状，长约12毫米，直径约5—8毫米；总



图版 1 1—3. 华帚菊 *Pertya sinensis* Oliv.: 1. 花枝; 2. 头状花序; 3. 瘦果和冠毛。4—10. 两色帚菊 *Pertya discolor* Rehd.: 4. 花枝; 5. 叶放大示背面的毛; 6. 头状花序; 7. 花; 8. 花冠展开; 9. 雄蕊展开和花柱及其分枝; 10. 瘦果和冠毛。(邓盈丰绘)

苞片4—5层，无毛或边缘被疏毛，外层阔卵形，长和宽近相等，约2毫米，顶端尖，中层倒卵形，长约5.2毫米，上部宽达3毫米，下部宽不足2毫米，最内层倒披针形，长8—9毫米，宽约2.5毫米，二者顶端均圆；花托狭，直径约1毫米，无毛；雌花花冠管状，长约9毫米，向上稍扩大，5深裂，裂片不等长，向上渐狭，长者达4.5毫米，短者仅2—3毫米；退化雄蕊5枚，花药线形，长约4毫米，基部圆钝而无尾；雄花花冠檐部扩大呈钟状，5深裂；雄蕊5枚，花药基部具被毛的长尾；花柱分枝短而扁，顶端略尖。瘦果纺锤形，具10纵棱，密被粗毛，长约7毫米；冠毛干时黄白色，粗糙，有细短毛，雌株的长约10毫米，雄株的略短，长约7毫米。花期7—8月。

产于青海东部、甘肃东南部（隆德）及西南部、宁夏、陕西东南至西南部（眉县、太白山、佛坪、渭南、华县、华山）、山西南部（霍县、垣曲）、河南西部（卢氏）、湖北西部（兴山、巴东）及四川东部（城口、巫溪）。生于山坡或溪边灌丛或针叶林中，海拔2100—2500米。模式标本采自湖北兴山。

2. 狭叶帚菊

Pertya angustifolia Y. C. Tseng in *Guihaia* 5(4): 328. 图1, 1. 1985.

小灌木。枝有长短枝之别，长枝极纤细，具显著纵棱和沟槽，被白色柔毛，其与老枝的皮均易开裂。长枝上的叶互生，无柄或具长约1毫米的短柄，叶片薄纸质，披针形或狭披针形，长2—3.5厘米，宽3—6毫米，顶端渐尖，基部稍狭，全缘，略背卷，上面被极疏的柔毛，边缘有缘毛，下面近无毛；中脉在上面微凹入，在下面显著凸起，无侧脉和网脉；短枝上的叶3—4片簇生，大小常不等，长圆形或倒卵状长圆形，大者长2.2—3厘米，宽3—6毫米，小者长8—12毫米，宽约2—3毫米，顶端圆，有微凸尖，下面最顶端的凸尖处丛生绢毛，其它性状与长枝的叶同。头状花序单生于短枝的簇生叶丛中，花序长约10毫米，直径7—8毫米，有花7朵；总花梗线状，长约2厘米或不及，被白色短柔毛；总苞阔钟形，长5—6毫米，直径约5毫米，总苞片约3层，边缘多少被蛛丝状毛，外层卵形，长约3毫米，宽约2毫米，顶端短尖，中层倒卵状长圆形或近椭圆形，长6—7毫米，宽2—2.5毫米，顶端钝，最内层倒披针形，长4.5—6毫米，宽0.8—1毫米，顶端短尖或钝；花托狭，无毛，直径约1.5毫米。花全部两性，花冠管状，长7—8.5毫米，向上稍扩大，5深裂，裂片稍不等长，长圆形，长者达3毫米，短者仅2.5毫米或更短；雄蕊5枚，花药长3.5毫米，顶端尖，基部具渐狭的尾部；花柱分枝短，紧倚，内侧扁而顶端略尖；子房倒锥形，被白色疏毛，长仅1毫米。成熟的瘦果未见。冠毛干时雪白色，略粗糙，长约6毫米。花期4月。

产于四川西部（道孚）。生于草地或灌丛中，海拔约3550米。模式标本采自四川道孚。

本种与阿富汗帚菊 *P. mattenfeldii* Bornm. 极近缘，然本种叶背面除顶端有簇生的长软毛和边上有缘毛外，余均无毛，头状花序比总花梗短，长约10毫米，总花梗长达2厘米而与其有别。