

敘

東坡云。藥雖進於醫手。方多傳於古人。旨哉是言。談歧黃者。詎得昧所自來乎。胎產之係人禍福大矣。而竹林寺獨聞名於天下。聞渠有祕方一帙。遞相師承。久而弗替。惜世莫得而見之也。予友陳子秉元。自言其祖昔寄居竹林。與寺僧最厚。嘗乘閒取其祕本數卷。以歸。予曾向陳子借錄。而陳子未之許也。今年春。陳子館於郡城之清道橋。予往候之。陳子他適。啟其笥。曩所謂胎產祕本在焉。亟攜回抄錄數日。而還其原本。陳子猶未知也。嗟乎。竹林不肯以傳之人者。陳子之祖計而得之。陳子不欲以授之。乃祖者示好友。而予錄而歸之。於以知物苟有濟於人。不容終祕。大抵如斯矣。顧予不知醫。且所錄係陳氏家藏。眞贋尙未可定。又其間方症恐猶未備。行將詣善於女科者。別白而校正之。如果係良方。當設法傳流。表予濟世之微衷云。爰志其自來於右。

敘

余孩提時。聞嫂氏數小產。而不能成孕。諸藥罔效。家大兄往竹林寺取藥數服。而後有孕。竟得十月滿足而生男。其時因心知竹林寺女科之名。後又聞張姓戴姓之女。婦得奇疾。皆往竹林取藥而愈。始知竹林寺女科。師弟相承。其來已久。祕方不傳之世。其視病或說病原。彼不立方。但包藥以應。是以人亦不知其方。今年秋暮。余偶至襟丈樊元圃家。元圃知余能視

藥書。謂余曰。兄亦知竹林寺之女科乎。我有抄錄祕本。曷爲我校訂之。余聞之色喜。卽閱其書。見條分縷晰。立案用方。與世不同。雖用藥或有過不及之處。然望之令人了了。真女科之祕要。因袖歸而抄錄之。抄竟。並志余欣幸之意。乾隆癸丑孟冬。望後二日茶垞吳煜書於清暉書屋。

胎產新書目次

女科秘要卷一

脈法	一
辨男女脈法	一
調經	一
經閉	二
崩漏	二
赤白帶	三
安胎	三
漏胎	四
胎痛	五
惡阻	五
胎腫	六
子煩	七
子癰	七
子懸	八
子淋	八
胎死上喘	九

難產橫生	九
胎衣不下	九
產後寒熱	〇
產後血暈	一
產後中風	一
宿血腫脹	二
產後腹痛	二
半產	三
陰戶脫	三
惡血入心	三
惡血入脾	四
惡血入肺	四
惡血入肝	四

女科秘要卷二

胎前惡阻	五
胎前潮熱氣痛	五
胎前寒熱	五

孩兒攻心	六
胎前氣急不得臥	六
胎前咳嗽	六
胎前衄血	七
胎前泄痢	七
胎前漏紅	七
胎前赤帶	八
胎前白帶	八
胎前氣緊咳嗽動紅	八
胎前動紅	八
胎前小便不通	九
胎前大便不通	九
胎前半產	九
胎前怔忡	九
胎前浮腫	九
胎前陰門腫	〇
胎前偏身痠懶	〇

胎前下血……………一〇

胎前脚痛……………一〇

胎前中風……………一〇

胎前癰瘕……………一一

胎前腰痛……………一一

胎前頭痛……………一一

胎前泄瀉……………一一

胎前心痛……………一二

胎前昏迷……………一二

胎前大便虛急……………一二

胎前偏體痠癢……………一二

胎前陰門痒……………一二

胎前濕熱不化陰門痒……………一二

胎前乳腫……………一三

胎前咽痛……………一三

胎前消渴……………一三

胎前耳鳴……………一四

胎前潮熱不退……………一四

臨產胎不降生……………一四

死胎不下……………一五

胎衣不下……………一五

產後血氣痛……………一五

產後血盡作痛……………一五

產後惡露發熱……………一五

產後咳嗽……………一六

產後子宮突出……………一六

產後癰疽突出……………一六

產後一月惡露重來……………一六

產後氣急……………一六

產後舌黑……………一六

產後譫語……………一六

女科秘要卷三

月經前期……………一七

月經後期……………一七

月經或前或後……………一八

血虛發熱……………一八

血閉發熱……………一九

行經氣痛……………一九

經來不止……………三〇

經來如黃泥水……………三〇

經來如銅綠水……………三〇

經來全白色……………三一

經來成塊如葱白色……………三一

經來臭如夏月腐……………三一

經來如魚髓……………三一

經來如牛膜片……………三一

經來下肉胞……………三一

經來弔陰痛不可忍……………三一

經來小便痛如刀割……………三一

經來未盡潮熱氣痛……………三三

經來盡作痛……………三四

經來脇氣痛……………三四

經來小腹有血塊痛……………三四

經來徧身疼痛……………三四

觸經傷寒……………三五

逆經……………三五

經從口鼻出咳嗽氣急……………三五

每月經來二三次	三六
經來狂言如見鬼神	三六
經來嘔吐	三七
經來飲食後即吐	三七
經來偏身浮腫	三八
經來泄瀉	三八
經前經後痢疾	三八
經來大小便俱出	三八
經來常咳嗽	三九
經阻腹大如鼓	三九
經來小便出白蟲	三九
經來吐衄蟲	四〇
經來潮熱旬日不思飲食	四〇
室女經閉	四〇
血山崩	四〇

女科秘要卷四

原經水不調	四三
經水不調症	四三
過期經行症	四四

一月經再行症	四五
數月行經症	四五
經期或前或後症	四六
行經腰腹作痛症	四六
經後腹痛症	四七
經水多少症	四七
驗經色症	四七
浮腫症	四八
原經水不行	四九
經閉不行症	四九
石瘕症	五一
腸覃症	五一
治崩漏次第	五一
崩漏症	五二
原赤白帶	五三
赤白帶症	五四
白淫症	五五
白濁症	五五

女科秘要卷五

保胎法	五七
保胎撮要	五九
竹林寺真傳生化湯論	六一
胞衣不下	六三
產後調護法	六四

女科秘要卷六

產後便覽	六七
產後厥	六八
產後氣短汗喘痰嗽聲重	六九
產後頭痛發熱氣急喘汗	七〇
血虛極產畢即汗	七一
產後氣血竭汗多形色脫	七一
產後氣短似喘	七二
產後汗多口噤筋搐類傷	七二
寒	七二
產後崩脫暈厥	七三
產後崩泄	七四
產後瀉	七四
產後赤白痢	七五

產後嘔不納穀……………七七

女科秘要卷七

產後傷食服消食藥致滿

悶……………七九

產後類外感……………七九

產後服消耗藥增滿悶積

久成脹……………八〇

產後感風寒嗽鼻塞聲重

惡寒……………八一

產後類瘧……………八二

產後惡露凝結成塊虛症

百出……………八三

產後大便不通……………八四

產後妄言妄見……………八四

產後少乳……………八五

產後乳癰……………八六

女科秘要卷八

方症補遺……………八九

女科秘旨卷一

安胎論……………九七

辨胎歌……………九八

養胎……………九九

安胎……………一〇〇

小產……………一〇三

女科秘旨卷二

惡阻……………一〇五

胎痛……………一〇七

胎漏……………一〇七

跌撲傷胎……………一〇九

毒藥傷胎……………一一〇

胎動……………一一〇

滿悶……………一一一

子腫……………一二二

子氣……………一二三

女科秘旨卷三

子懸……………一二五

子煩……………一二六

子癰……………一二七

子淋……………一二八

淋閉……………一二八

溺血……………一二九

遺尿……………一二九

轉胞……………一二〇

中風……………一二二

中惡……………一二三

瘕……………一二三

眩暈……………一二四

女科秘旨卷四

心痛……………一二五

心腹痛……………一二五

小腹痛……………一二六

腰腹背痛……………一二六

子鳴……………一二七

積聚……………一二七

咳嗽……………一二七

霍亂……………一二九

不語……………一三〇

泄瀉	一三〇	產後傷食	一四七
痢	一三〇	產後忿怒	一四八
瘧疾	一三一	產後類瘧	一四九
煩渴	一三一	產後類傷寒二陽症	一五〇
熱病	一三二	產後發熱頭疼	一五一
胎蒸	一三三	產後類傷寒陽明及三陰症	一五一
吐衄	一三三	產後類三陰傷寒症	一五一
爽期	一三五	產後大便不通	一五二
女科秘旨卷五		女科秘旨卷七	
有孕婦家預知修合	一三七	產後類中風	一五三
臨產須知	一三七	產後汗	一五四
論產後調護	一三七	產後虛汗不止	一五四
論治血塊	一三七	產後盜汗	一五五
產後血暈	一三八	產後口渴或兼小便不利	一五五
產後厥	一三九	產後遺尿	一五六
產後血崩	一四一	產後類瘧	一五七
產後短氣似喘	一四二	產後泄瀉	一五七
女科秘旨卷六			
產後妄言妄見	一四五		

產後完穀不化	一五九
產後痢	一六〇
附產後積滯	一六〇
女科秘旨卷八	
產後霍亂	一六三
產後嘔逆不食	一六四
產後口渴	一六四
產後水腫	一六五
產後怔忡驚悸	一六五
產後骨蒸	一六六
產後心痛	一六七
產後腹痛	一六八
產後小腹痛	一六八
產後指節頭痛	一六九
產後偏身痛	一六九
產後腰痛	一七〇
產後淋	一七〇
產後小便數	一七一
產後流注	一七一

陰蝕五疳……………一七二

女科旨要卷一

婦女逐年經症……………一七五

女科旨要卷二

診婦人有孕論……………一八三

按月受胎形症……………一八四

女科旨要卷三

診產後證論……………一八九

女科旨要卷四

治十八般難產論……………一九七

附兒科問候……………二〇二

女科祕要卷一

靜光輪應禪師考定

仁和吳煜茶垞校訂
杭州徐志源句讀

脈法

左手寸脈洪。主胸中之怒氣。關脈洪。主胸中之冷。尺脈洪。主腎虛。左三指脈一般大。主孕。有孕在內。尺脈細如絲髮。主作脹。女人血室病。月水或前或後。右手寸脈洪。主上焦熱。咳嗽有痰。身發潮熱。關脈洪。主冷氣作痛。尺脈洪。主孕。尺脈小。主子宮冷。兩手六脈一般洪緩而清利。主壽高。六脈俱小。如線大。主脾胃弱。不能飲食。腰痛頭痛。頭暈敗血。六脈俱洪大浮弦。主有瘋氣。女人除此并產後。餘與男子同。男子左手脈洪。右手弱。主大利。女人右手脈洪。左手弱。主大利。

辨男女脈法

左手實大是男胎。右手弦洪女孕來。兩尺偏大分男女。命門滑實主懷胎。

調經

趨前爲熱。退後爲虛。血滯宜破。血枯宜補。時常經前作痛爲血積。經後作痛爲血虛。當時發熱爲血虛有積。經後發熱爲血虛有熱。

主意

婦人坤道血如期。氣血調和體最宜。血盛氣衰應可治。血衰氣旺漸乖違。

血熱先期風熱紫寒痰黃淡濕違期作痛行經氣血滯行過作痛氣血虛經血欲調宗四物溫膽枳朮二陳推脈數黃芩荆芥穗氣虛力弱用參芪沈遲氣滯檳榔佐作痛滿悶入青皮虛熱逍遙補心類清其經血自如期

經閉

夫經閉不通或墮胎及多產傷血或久患潮熱消血或久發盜汗耗血或脾胃不和食少而不生血或痢疾腸風失血或七情傷心氣結鬱結致血閉而不行也治宜生血補血調血

主意

經凝氣滯不流通啓閉將來紫淡紅病後汗多思損血或因濕熱冷兼風氣鬱沉微當利氣緊寒積血又疎通四物檳榔附朮桃仁牛膝桂蟲蟲弦濡氣虛參白朮黃芪甘草牡丹芍其間胃火乾枯酒佐將軍大有功

崩漏

皆由勞傷氣血損任衝二脈氣血俱虛不能約制其經血故血漏下或漸成淋漓蓋婦人多由心事不足或伏事人少或故貴勢衰先富後貧致心火上炎治當勸諭而行鎮壓心火之藥

主意

崩漏皆由氣血傷脈來弦細大而長東垣下陷不言熱學者須知要付量丹溪要論虛濕熱陽搏陰弱病之詐脈弦而數當清熱荆芥黃芩未服良百草霜研宗四物痛入元胡炒黑姜脈濡氣弱參白朮續斷防芪功效強

久崩下陷宜升舉。養血調脾瀉二陽。

赤白帶

赤屬血。白屬氣。濕熱爲病漏爲帶。俱是胃中痰積下流。滲入膀胱。稠粘者是。又有如白湯者。名曰白濁。主燥濕爲先。法當升之。甚用吐法以提其氣。宜斷厚味。

主意

白帶根因濕熱多。赤由營衛不調和。來時骨膝皆酸痛。漏若多時真水磨。脈弦而緩傷風火。炒姜梔子絕其疴。伏龍肝散多靈驗。脈數樗根效如何。

伏龍肝散

伏龍肝

艾葉

川芎

各一錢五分

赤石脂

麥冬

各四分

乾姜 五分

川歸 三錢

肉桂 一錢

甘草

熟地

各二錢

棗 二枚

煎服。或爲末米湯送。或酒送。

安胎

胎氣宜清不宜熱。宜靜不宜動。有因胎病而母不安者。有因母病而胎氣不安者。宜詳察之。

主意

妊婦全憑氣血。傷情冷熱便爲災。傷血脈濡宜四物。四君脈大漸安排。挫氣縮砂爲末服。芎歸苓朮不傷胎。

安胎散

當歸

川芎

白芍

熟地各二錢

白朮

茯苓

黃芪炙

甘草

阿膠蛤粉炒

地榆各錢半

半夏一錢

艾葉三分

姜三片

研末米湯調送。

〔吳按〕半夏礙胎。宜少用爲妥。

脾氣虛弱者。六君子湯加枳殼。一錢

紫蘇六分 姜二片 棗五枚

胎氣鬱滯者。參

蘇飲。

參蘇飲

人參二錢

蘇葉五分

煎服

鬱結傷脾者。歸脾湯

歸脾湯

人參

黃芪

茯苓

炙草各二錢

木香八分

白朮

棗仁

元眼肉各二錢

加柴胡砂仁各等分姜一片煎服

鬱怒肝脾傷者。四七湯

四七湯

姜炒厚樸

茯苓

蘇葉各一錢

姜夏一錢五分

加川芎川歸

各二錢 姜二片 棗二枚 煎服

怒動肝火者。四七湯加柴胡六分 五味子四分 同煎。

漏胎

妊娠月水時下。皆因衝任脈虛。不能約制經血。血漏盡則胎斃矣。亦有勞後喜怒不節。或飲食觸冒風寒。或母有宿疾。爲風冷所乘者。或氣失度。而漏下者。

主意

漏胎血少氣偏虛。不能衝護熱傷之。脈數黃芩加白朮。安胎聖藥。善扶持。弱脈血虛全四物。艾膠製炒要知宜。下陷升提分濕熱。氣虛應可用參芪。

胎痛

夫胎痛皆娠婦不知禁忌。或因生冷。或觸風寒。邪正相擊。隨氣上下。衝於心則心痛。攻於腹則腹痛。傷於胎則胎痛也。

主意

胎痛分明胎氣傷。致令娠婦痛聲長。脈來細緊寒食氣。縮砂四七最爲良。脈瀉脈虛宜四物。紫蘇香附服安祥。尺數熱痛黃連炒。診脈須分陰與陽。由婦人稟氣怯弱。或有風疾。或有痰飲。凡娠便是有痰。其婦顏色如故。脈息和順。但覺肢體沉重。頭目昏眩。擇食惡聞氣味。好食酸醎。甚者作寒熱。嘔吐痰水。輕者不必服藥。重者以半夏湯扶苓丸可也。

主意

血奪胃中嘔吐下。一云痰火自相搏。飲食下咽隨口出。致令惡阻食難吞。半夏扶苓湯要藥。二陳藿香亦爲尊。脈分冷熱間虛實。順氣和平胎自甯。

半夏湯

姜半夏

扶苓各二錢

煨姜六分

白朮

杏仁

陳皮

白芍各錢半

竹葉二十片

大棗五枚

煎服

扶苓丸

赤扶苓

一兩

人參五錢

桂心三錢

乾姜八分

半夏

陳皮

白朮

甘草各四錢

甘草二錢

枳殼二錢

爲末。蜜丸。每日三服。每服三十丸。

半夏扶苓湯

半夏

扶苓各八分

砂仁

陳皮

甘草各四分

加烏梅一枚

姜二片

棗五枚

煎服

回春方

扶苓

半夏

厚樸

蒼朮各一錢

陳皮

砂仁各五分

炙甘草

乾姜各三分

藿香八分

烏梅一個

姜三片

煎服

胎腫

凡娠婦有通身腫者。有脚腫者。俗呼爲胎腫。又曰胎水。有脾虛不能制水。血散四肢而腫者。有胎挾水。水血相搏者。有脾胃虛濕者。有乘風冷者。有痢疾後而腫者。有飲食太過者。有腹脹而腫者。治宜詳察。

主意

腫脹皆因濕熱多。山梔萊菔炒宜過。研末米稠調服下。管教虛腫盡消磨。

子煩

夫娠婦而子煩者。是肺臟虛而熱乘於心。則心煩。停痰積飲在心胸之間。或衝於心。則亦煩也。若熱煩者。但熱而已。如有痰而煩者。口吐涎沫。惡聞食氣。則煩躁也。

主意

娠婦心驚悶子煩。病因二火在其間。竹葉湯除虛燥病。門冬飲子似仙丹。

犀角散

生犀角 六分

地骨皮

麥冬

赤茯苓

甘草 各二錢

研末水送。

竹葉湯

白茯苓 二錢

防風 一錢

麥冬

黃芩 各一錢五分

竹葉 二十片

煎服

門冬飲子

麥冬

人參

知母 各一錢

五味子

瓜蒌

葛根 各五分

生地 八分

伏神 七分

甘草 三分

竹葉 二十片

煎服

子癰

孕婦忽然冒悶。不省人事。角弓反張。須臾則甦。狀如中風。名曰子癰。亦謂之風症。又名子冒。治宜四物養血。加芩連降火。姜夏湯破逆。

主意

娠婦筋強語塞痰。或時發搐故名癰。脈浮弦滑鈴羊角。煎服除風漸漸寬。

鈴羊角散

鈴羊角

棗仁

獨活

五加皮

防風

川芎

川歸

伏神

杏仁

木香

甘草

加姜

三片

研末酒送。

子懸

胎氣不和。懷胎逆上。脹滿疼痛。謂之子懸。恐難產。

主意

胎氣凌上胸膈間。滿悶脹痛曰子懸。紫蘇散子安胎氣。頓教一服遂安然。

紫蘇散

蘇葉

人參

橘紅

歸尾

川芎

各二錢

粉草

白芍

大腹皮

各錢半
酒洗淨

姜

五片

葱白

五寸

胎前諸症。俱用此方加減。如腹痛加木香香附。嗽加枳殼桑白皮。熱加條芩。嘔加砂仁。瀉加白朮。扶芩。均研末米湯調送。

子淋

妊婦腎虛。膀胱熱也。腎虛不能制水。則小便數也。膀胱熱則小便澀而不宣。懷孕之婦。胞系於腎。腎間虛熱而成淋症。甚者心煩悶亂。名曰子淋。

主意

子淋水聚在胞中。熱結便難氣不通。安樂散子殊多效。服之寬快有奇功。

安榮散

麥冬

通草

滑石

當歸

人參

甘草

各八分

細辛 三分

燈心 一圓

研末米湯水送。

胎死上喘

因母患熱症。至六七月。以致臟腑極熱。薰蒸其胎。而至胎死。不能自出。故作此喘。胎死母舌青者是。

主意

脈沉病喘死胎中。動熱傷胎氣上衝。桂麝和勻酒調下。黑神散子自然通。

黑神散

熟地

當歸

白芍

桂心

蒲黃 各三錢

乾姜

炙甘草 各三分

炒黑豆 去皮二合半

爲末。每服二錢。童便和酒服。

難產橫生

妊婦失忌。或氣逆而然。

主意

婦人氣逆胎遂橫。益母童便酒下行。但將神應催生散服之。不久兒即生。

如聖散

黃蜀葵花 焙

爲末。熱湯調服二錢。若漏血胎胞乾澹難產。速進二帖。

即產。若無花。用子合半爲末。酒服催生如神。

胎衣不下