

神農本草經

神農本草經中藥彩色圖譜

主編 沈連生

中國中醫藥出版社

神農本草經

神農本草經中藥彩色圖譜

主編 沈連生

中國中醫藥出版社

图书在版编目(CIP)数据

神农本草经中药彩色图谱/沈连生主编. —北京:中国中医药出版社,1996.5
ISBN 7-80089-542-4

I. 神… II. 沈… III. 神农本草经-中草药-图谱 IV. R281.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 08465 号

内 容 提 要

本书共收载药物 365 种,分上、中、下三品,上品药 120 种,中品药 120 种,下品药 125 种,少数几种有附药。除考证不清的 5 种中药外,每种中药文字部分包括日文名称、本经原文、基原考证、形态分布、药材特征、功能主治;配图包括基原彩图(原植物、原动物、矿物)及药材、饮片彩图。全书共计彩图 782 幅。

本图谱是学习研究《神农本草经》的一部很有价值的参考书。适合中医临床医生及高等和中等中医药院校教师与学生选用,也可供中药科学研究人员参考。

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话:64151553 邮政编码:100027)

印刷者:人民美术印刷厂印刷

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:1129 千字

印 张:45.375

版 次:1996 年 5 月第 1 版

印 次:1996 年 5 月第 1 次印刷

册 数:1—2500

书 号:ISBN 7-80089-542-4/R·542

定 价:380.00 元

编写说明

《神农本草经》是我国第一部本草学专著,至今已 2000 多年,是历代学习中医中药的四大必读经典专著之一,对中医中药学的发展起到了巨大推进作用。但是,所有《神农本草经》的辑注本均只有文字记载,从未见到相应药图的编辑本。为了更好地学习、继承与发扬这部著作的成就,我们在参考各有关著作的基础上,经过考证核实,编撰了《神农本草经中药彩色图谱》。

本书【本经原文】一项,采用马继兴研究员主编的《神农本草经辑注》;【基原考证】一项,主要依据刘衡如《本草纲目》校点本,并参考了清代吴其浚氏《植物名实图考》及曹元宇先生辑注《本草经》;日文名主要采用日本学者提供的《神农本草经》中药目录中的音译名称。

《神农本草经》各撰辑本均收载中药 365 种,但 365 种的具体中药种类稍有出入。我们综合各撰辑本的中药品种,适当调整,也编入 365 种。经考证核实,其中有 5 种中药,即屈草、姑活、别羆、黄环、礞石,至今尚未考证清楚其基原,本书对这 5 种中药只作部分文字介绍,不予配图;另有一些中药,如白兔藿、薇藿、淮木、彼子、藿菌、牙子、羊桃、茵茹、乌韭、蜀羊泉、腐婢、青琅玕、木虻等,各家对其基原的考证结论不尽相同,我们综合各家考证,参考有关资料,初步确定了这些药物基原,配以药图,可作进一步考证。

《神农本草经》所载中药,一般无加工炮制品,为了便利今人应用,本书对药材与饮片进行了介绍,并编入【功能主治】一项。有些中药品种在药用部位与中药来源方面的介绍,适当作了增加,如茺蔚子一药,同时介绍了益母草,因为当今用益母草远比茺蔚子用得更多而广泛;又如通草一项,古之用木通,主要是木通科白木通,而今主要应用马兜铃科的木通马兜铃(关木通)及毛茛科的小木通(川木通),本书在介绍白木通同时,也介绍了木通马兜铃及小木通以及相应的中药,目的是为了利于今人应用。

《神农本草经》收载的少数动物药,现今是我国重点保护的珍稀动物,个别品种我国已明令禁用,我们应遵守国家法令,保护珍稀动物。但为了尊重原著,本书也做了配图。

本书的原植物、原动物以及矿物的彩色照片是著者多年从全国各地亲自摄制来的,色泽鲜艳,形态真实;药材与饮片的彩色照片是著者选用较为典型的中药标本拍摄而成,外形清晰,易于辨认。

本图谱是学习研究《神农本草经》较好的参考书,适合中医临床医生及高等和中等中医药院校教师与学生选用,也可供中药科学研究人员参考。

由于《神农本草经》历史久远,各种中药均无基原及其形态描述,其中一部分中药现今已很少应用,虽经各医药学家考证评述,其基原仍不甚清楚。加之涉及内容广泛,时间仓促,不足甚至错误在所难免,恳请同行指正。

沈连生

1996.12.20

目 录

上 品

- | | | | |
|---------------|------|----------------|-------|
| 1. 菖蒲 | (2) | 32. 赤芝 | (73) |
| 2. 菊花 | (5) | 33. 黑芝 | (75) |
| 3. 人参 | (9) | 34. 青芝 | (76) |
| 4. 天门冬 | (12) | 35. 白芝 | (77) |
| 5. 甘草 | (14) | 36. 黄芝 | (78) |
| 6. 干地黄 | (16) | 37. 紫芝 | (79) |
| 7. 术 | (18) | 38. 卷柏 | (80) |
| 8. 菟丝子 | (22) | 39. 蓝实 | (81) |
| 9. 牛膝 | (25) | 40. 藜蘼 | (83) |
| 10. 茺蔚子 | (28) | 41. 丹参 | (84) |
| 11. 女娄 | (30) | 42. 络石 | (86) |
| 12. 防葵 | (31) | 43. 蒺藜子 | (89) |
| 13. 柴胡 | (33) | 44. 黄耆 | (91) |
| 14. 麦门冬 | (36) | 45. 肉苁蓉 | (93) |
| 15. 独活 | (39) | 46. 防风 | (95) |
| 16. 车前子 | (41) | 47. 蒲黄 | (97) |
| 17. 木香 | (43) | 48. 香蒲 | (98) |
| 18. 薯蓣 | (46) | 49. 续断 | (100) |
| 19. 薏苡仁 | (48) | 50. 漏芦 | (102) |
| 20. 泽泻 | (49) | 51. 天名精 | (104) |
| 21. 远志 | (52) | 52. 决明子 | (106) |
| 22. 龙胆 | (54) | 53. 飞廉 | (108) |
| 23. 细辛 | (56) | 54. 五味子 | (110) |
| 24. 石斛 | (58) | 55. 旋花 | (112) |
| 25. 巴戟天 | (61) | 56. 兰草 | (114) |
| 26. 白英 | (63) | 57. 蛇床子 | (116) |
| 27. 白蒿 | (65) | 58. 地肤子 | (118) |
| 28. 赤箭 | (66) | 59. 景天 | (120) |
| 29. 菴藟子 | (68) | 60. 茵陈蒿 | (122) |
| 30. 葶藶子 | (70) | 61. 杜若 | (124) |
| 31. 瞿实 | (72) | 62. 徐长卿 | (126) |
| | | 63. 石龙刍 | (128) |
| | | 64. 王不留行 | (129) |

141. 石龙芮	(285)	180. 桑根白皮	(360)
142. 茅根	(287)	181. 芫荽	(362)
143. 紫菀	(289)	182. 枳实	(364)
144. 紫草	(290)	183. 厚朴	(366)
145. 茜根	(293)	184. 秦皮	(369)
146. 白鲜	(295)	185. 秦椒	(371)
147. 酸浆	(296)	186. 山茱萸	(373)
148. 紫参	(298)	187. 紫葳	(375)
149. 藁本	(300)	188. 猪苓	(377)
150. 狗脊	(302)	189. 白棘	(379)
151. 葶藶	(304)	190. 龙眼	(380)
152. 白兔藿	(306)	191. 木兰	(382)
153. 营实	(308)	192. 柳花	(385)
154. 薇蕨	(310)	193. 卫矛	(386)
155. 水萍	(312)	194. 合欢	(388)
156. 王瓜	(313)	195. 松萝	(391)
157. 地榆	(315)	196. 干漆	(392)
158. 海藻	(317)	197. 石南	(394)
159. 泽兰	(319)	198. 蔓椒	(396)
160. 防己	(320)	199. 栾花	(398)
161. 牡丹	(324)	200. 淮木	(400)
162. 款冬花	(326)	201. 彼子	(402)
163. 石韦	(328)	202. 梅实	(403)
164. 马先蒿	(329)	203. 蓼实	(405)
165. 女菀	(331)	204. 葱实	(407)
166. 王孙	(333)	205. 薤	(409)
167. 云实	(335)	206. 假苏	(410)
168. 爵床	(337)	207. 水苏	(412)
169. 黄连	(338)	208. 瓜蒂	(414)
170. 沙参	(341)	209. 水蘩	(415)
171. 桔梗	(342)	210. 粟米	(417)
172. 菘蓂子	(344)	211. 黍米	(419)
173. 陆英	(346)	212. 麻蕒	(421)
174. 翘根	(348)	213. 石硫黄	(424)
175. 萱草	(350)	214. 石膏	(425)
176. 梔子	(352)	215. 磁石	(426)
177. 竹叶	(354)	216. 阳起石	(428)
178. 槲木	(356)	217. 理石	(429)
179. 吴茱萸	(358)	218. 长石	(430)

219. 孔公孽	(431)	256. 蜀漆	(502)
220. 殷孽	(432)	257. 甘遂	(503)
221. 发髮	(433)	258. 白蔹	(505)
222. 白马茎	(435)	259. 青箱子	(507)
223. 鹿茸	(436)	260. 藿菌	(508)
224. 羴羊角	(439)	261. 白及	(510)
225. 牡狗阴茎	(441)	262. 大戟	(512)
226. 羚羊角	(443)	263. 泽漆	(515)
227. 牛黄	(445)	264. 茵芋	(516)
228. 麝香	(447)	265. 贯众	(518)
229. 天鼠屎	(449)	266. 茺花	(522)
230. 伏翼	(451)	267. 牙子	(525)
231. 蠹鱼	(452)	268. 羊躑躅	(527)
232. 鲤鱼胆	(454)	269. 茺花	(529)
233. 乌贼鱼骨	(456)	270. 商陆	(530)
234. 海蛤	(457)	271. 羊蹄	(532)
235. 石龙子	(460)	272. 篇蓄	(534)
236. 白僵蚕	(463)	273. 狼毒	(536)
237. 桑螵蛸	(465)	274. 鬼臼	(537)
238. 姑活	(467)	275. 白头翁	(539)
239. 屈草	(467)	276. 羊桃	(541)
240. 别羴	(468)	277. 女青	(543)

下 品

241. 附子	(470)	278. 连翘	(545)
242. 乌头	(472)	279. 石下长卿	(547)
243. 天雄	(474)	280. 茴茹	(549)
244. 半夏	(476)	281. 乌韭	(550)
245. 虎掌	(478)	282. 鹿藿	(552)
246. 鸢尾	(482)	283. 蚤休	(554)
247. 大黄	(484)	284. 石长生	(555)
248. 葶苈	(486)	285. 苈草	(557)
249. 草蒿	(489)	286. 牛扁	(559)
250. 旋覆花	(491)	287. 夏枯草	(560)
251. 藜芦	(493)	288. 败酱	(562)
252. 钩吻	(494)	289. 白薇	(564)
253. 射干	(496)	290. 积雪草	(565)
254. 蛇含	(498)	291. 蜀羊泉	(567)
255. 恒山	(500)	292. 巴豆	(569)
		293. 蜀椒	(571)
		294. 皂荚	(573)

295. 楝实	(576)	332. 龟甲	(639)
296. 郁李仁	(577)	333. 虾蟆	(641)
297. 莽草	(579)	334. 鲛鱼甲	(644)
298. 雷丸	(581)	335. 鳖甲	(646)
299. 梓白皮	(582)	336. 蚱蝉	(647)
300. 桐叶	(584)	337. 露蜂房	(649)
301. 药实根	(586)	338. 马刀	(651)
302. 溲疏	(588)	339. 蟹	(653)
303. 鼠李	(590)	340. 蛇蛻	(654)
304. 桃核仁	(592)	341. 猬皮	(656)
305. 杏核仁	(593)	342. 螭螬	(658)
306. 苦瓠	(596)	343. 蛻螂	(659)
307. 大豆黄卷	(598)	344. 蛭螭	(661)
308. 赤小豆	(600)	345. 白颈蚯蚓	(663)
309. 腐婢	(601)	346. 蛭螬	(665)
310. 石胆	(603)	347. 雀瓮	(667)
311. 雄黄	(605)	348. 雉鸡	(669)
312. 雌黄	(606)	349. 斑蝥	(671)
313. 水银	(607)	350. 蜈蚣	(673)
314. 凝水石	(609)	351. 蜈蚣	(675)
315. 铁落	(610)	352. 马陆	(676)
316. 铁(附:铁精)	(611)	353. 萤火	(678)
317. 铅丹	(613)	354. 衣鱼	(680)
318. 粉锡	(615)	355. 鼠妇	(682)
319. 代赭	(616)	356. 水蛭	(683)
320. 卤咸	(618)	357. 木虻	(685)
321. 戎盐(附:大盐)	(619)	358. 蜚虻	(687)
322. 青琅玕	(621)	359. 蜚蠊	(688)
323. 石灰	(622)	360. 虻虫	(690)
324. 白垩	(624)	361. 贝子	(692)
325. 冬灰	(625)	362. 石蚕	(694)
326. 六畜毛蹄甲	(626)	363. 地胆	(695)
327. 犀角	(629)	364. 黄环	(696)
328. 豚卵	(632)	365. 礞石	(697)
329. 麋脂	(634)	拉丁学名索引	(698)
330. 鼯鼠	(636)	日文名索引	(704)
331. 燕屎	(638)	中文药名索引	(710)

上品

1. 菖蒲

日文名 ショウブ

【本经原文】

菖蒲，一名昌阳。味辛，温，无毒。治风寒湿痹，咳逆上气。开心孔，补五脏，通九窍，明耳目，出音声。久服轻身，不忘，不迷惑，延年。生池泽。

【基原考证】

古又称昌阳、尧韭、水剑草。[别录曰]菖蒲生上洛池泽及蜀郡严道。一寸九节者良。露根不可用。五月、十二月采根，阴干。[弘景曰]上洛郡属梁州，严道县在蜀郡，今乃处处有。生石磧上，概节为好。在下湿地，大根者名昌阳，不堪服食。真菖蒲叶有脊，一如剑刃，四月、五月亦作小厘花也。东间溪泽又有名溪荪者，根形气色极似石上菖蒲，而叶正如蒲，无脊。俗人多呼此为石上菖蒲者，谬矣。[大明曰]菖蒲，石涧所生坚小，一寸九节者上。出宣州。二月、八月采。[颂曰]处处有之，而池州、戎州者佳。[时珍曰]菖蒲凡五种：生于池泽，蒲叶肥，根高二三尺者，泥菖蒲，白菖也；生于溪涧，蒲叶瘦，根高二三尺者，水菖蒲，溪荪也；生于水石之间，叶有剑脊，瘦根密节，高尺余者，石菖蒲也；人家以砂栽之一年，至春剪洗，愈剪愈细，高四五寸，叶如韭，根如匙柄粗者，亦石菖蒲也；甚则根长二三分，叶长寸许，谓之钱蒲是矣。服食入药须用二种石菖蒲，余皆不堪。

据上考证，《本经》所指菖蒲的正品为石菖蒲，而亦包括了菖蒲(水菖蒲)的应用，这与现今菖蒲使用相合。

【形态分布】

1-1 石菖蒲

天南星科石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.。多年生草本，株高 20~40cm，芳香。根状茎长 5~10cm，上部多分枝，成丛生状。叶基生，剑状线形，中脉不显，基部对褶，二列。花葶高 10~25cm，扁三棱形；佛焰苞狭长成叶状。肉穗花序较短小，圆柱形，花小而密；花被片 6；雄蕊 6；子房六角形。浆果卵圆形。种子基部被毛。花期 5~6 月，果期 7~8 月。主产四川、浙江、江苏、福建等省。生于山涧溪流浅水石上或河边石缝间。根茎入药，全年均可采收。

1-2 菖蒲

天南星科菖蒲 *Acorus calamus* L.。多年生草本，植株较高，芳香。根茎粗大，直径 10~15mm。叶线状剑形，自根茎端丛生，中脉突出明显，基部扁平，对褶。花葶高 40~70cm；佛焰苞与叶同形。肉穗花序长 5~8cm，圆柱形；花密集，两性，花被片 6，黄绿色；雄蕊 6；子房长圆形，2~3 室，每室具胚珠数粒。浆果长圆形，红色。花期 5~8 月，果期 6~9 月。主产东北、西北及河北、河南、江苏等地。生长于沼池、湖、河流水中。根茎入药，称水菖蒲，全年可采收。



图 1-1 石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.



图 1-2 菖蒲 *Acorus calamus* L.

【药材特征】

1-3 石菖蒲 石菖蒲片

药材 呈扁圆柱形,常有分枝,直径0.3~1cm。表面棕褐或灰棕色,粗糙,有环节,节间长0.2~0.8cm,具细纵纹;叶痕呈三角形,左右交互排列;有的残留叶基,下面残留须根或圆点状根痕。质硬,断面纤维性,类白或微红色,内皮层环明显,可见多数维管束小点及棕色小点。气芳香,味苦、微辛。

饮片 一般为斜薄片,厚约 2mm。表面棕褐或灰棕色,粗糙。切面纤维性,类白或微红色,内皮层环明显,可见多数维管束小点及棕色小点。气芳香,味苦、微辛。



图 1-3 石菖蒲 石菖蒲片

1-4 水菖蒲 水菖蒲片



图 1-4 水菖蒲 水菖蒲片

药材 呈扁圆柱形,有时有分枝,较粗,直径 1~1.5cm,节间也较长,约 1~3cm。上方有大形三角状叶痕,左右交互排列;下方具有多数凹陷的圆点状根痕。质硬,断面海绵样,类白或淡棕色,内皮层环明显,有少数小空洞及维管束小点。气较浓而特异,味辛。

饮片 斜薄片,厚约 2~3mm。表面黄棕色,具环节;节间长 1~3cm。切面海绵样,类白

或淡棕色,内皮层环明显,有多数小空洞及维管束小点。气较浓而特异,味辛。

【功能主治】

化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。用于脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痫,健忘耳聋等。

2. 菊 花

日文名 キクカ

【本经原文】

菊花,一名节华。味苦,平,无毒。治风头头眩,肿痛,目欲脱,泪出,皮肤死肌,恶风,湿痹。久服利气血,轻身,耐老,延年。生川泽及田野。

【基原考证】

古又称菊华、节华、女节、女华、女茎、日精、更生、傅延年、治蒿、金蕊、阴成、周盈。[别录曰]菊花生雍州川泽及田野。正月采根,三月采叶,五月采茎,九月采花,十一月采实,皆阴干。[弘景曰]菊有两种:一种茎紫气香而味甘,叶可作羹食者,为真菊;一种青茎而大,作蒿艾气,味苦不堪食者,名苦意,非真菊也。华正相似,惟以甘苦别之。南阳酃县最多,今近道处处有之,取种便得。又有白菊,茎叶都相似,惟花白,五月取之。仙经以菊为妙用,但难多得,宜常服之。[藏器曰]白菊生平泽,五月花,紫白色。[颂曰]处处有之,以南阳菊潭者为佳。初春布地生细苗,夏茂,秋华,冬实。然种类颇多。惟紫茎气香,叶厚至柔者,嫩时可食,花微小,味甚甘者,为真;其茎青而大,叶细气烈似蒿艾,花大味苦者,名苦意,非真也。南阳菊亦有两种……。[宗奭曰]菊花近世有二十余种。惟单叶花小而黄,绿叶色深小而薄,九月应候而开者是也。邓州白菊单叶者,亦入药。余皆医经不用。[时珍曰]菊之品凡百种,宿根自生,茎叶花色,品品不同。

据以上考证,《本经》所指菊花及后世各代使用菊花均与当今菊花应用相似,包括甘菊、黄菊、野菊。

【形态分布】

1-5 菊

菊科菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.。多年生草本,基部木质,全体具白色绒毛。叶互生,叶片卵形或披针形,边缘有粗大锯齿或羽状分裂。头状花序单生或数个集生枝顶,直径2~5cm;总苞片多层,边缘膜质;外围舌状花雌性,黄、白、红、紫各色;中央管状花两性,黄色,基部具膜质鳞片。瘦果具棱,无冠毛。花期9~11月,果期10~11月。全国各地有栽培。药用部位为花序。秋季霜降前花正开时采收。河南产者称怀菊花,安徽产者称滁菊花或亳菊花,浙江产者称杭菊花。

1-6 黄菊

菊科菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.。多年生草本,高60~150cm,茎基部常木化,上部多分枝,具细柔毛。叶互生,边缘具粗大锯齿或深裂成羽状,下面有白色毛茸。头状花序




图 1-5 菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

顶生或腋生，外周舌状花黄色，中央管状花，黄色。瘦果，无冠毛。花期 9~11 月。全国各地均有栽培。花序入药，称为黄菊花。秋末冬初花盛开时采收已开放的花。



图 1-6 黄菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

1-7 野菊

菊科野菊 *Chrysanthemum indicum* L.。多年生草本，高 25~100cm。茎直立或基部铺展。茎生叶卵形，羽状深裂，顶裂片大，侧裂片常 2 对，全部裂片边缘浅裂或有锯齿，叶上面具腺体及疏柔毛，下面灰绿色，毛较多；下部渐狭成具翅的叶柄；基部有具锯齿的托叶。头状花序直径

1.5~2.5cm, 在枝顶端排成伞房状圆锥花序或不规则伞房花序; 外围舌状花一层, 雌性, 黄色; 中央管状花两性。瘦果具5条细纵纹, 无冠毛。全国各地均有。生于路旁、山坡或杂草丛中。花序入药。秋季花盛开时采收。



图 1-7 野菊 *Chrysanthemum indicum* L.

【药材特征】

1-8 杭菊花



图 1-8 杭菊花