

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明 夏甫 編輯
明 古吳 薛 己 立齋 補註
鄧縣 曹赤電 炳章 圈校

卷二十二

產後痢疾作渴方論第一

產後下痢作渴者。乃力亡津液。或胃氣虛不能生津液。但止其渴。痢自差。愚按。前症若渴而不止喜冷飲。屬胃氣虛不能生津液。宜用七味白朮散。夜間發熱口渴。屬腎水弱而不能潤。宜用六味丸。並佐以益氣湯。以滋化源。

附治驗方藥

一產婦瀉痢發熱作渴。吐痰。肌體消瘦。飲食少思。或胸膈痞滿。或小腹脹墜。年餘矣。余以爲脾腎之瀉。朝用二神丸。夕用六君子。二月餘而痊。

一產婦患前症。形體倦怠。飲食不進。與死爲鄰。此脾胃俱虛也。用四神丸。十全大補湯。數劑而愈。

附方

七味白朮散

方見三十一卷第二論

六味丸

方見二十四卷第十一論

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

十全大補湯

方見二十四卷第四論

四神丸

二神丸

二方見八卷第八論

產後大便秘澹方論第二

產後大便秘澹。因腸胃虛弱。津液不足也。若腹悶脹。宜服麻仁丸潤之。若用苦寒藥通則危矣。

愚按前症。若計其日期。飲食數多。卽用藥通之。禍在反掌之間。必待腹滿覺脹。欲去不能者。乃結在直腸。宜用豬膽汁潤之。若服苦寒疎通。反傷中氣。通而不止。或成痞症。若去血過多。用十全大補。血虛火燥。用加味四物。氣血俱虛。用八珍湯。雖數日不通。飲食如常。腹中如故。仍用八珍加桃仁杏仁治之。若泥其日

期。飲食數多而通之。則誤矣。

附治驗

一產婦大便七日不通。飲食如常。腹中如故。此腹未滿也。用八珍加桃杏二仁。至二十一日。腹滿欲去。用豬膽汁潤去而安。

一產婦大便不通。或用通利之藥。中脘脹痛。飲食甚少。又用蜜導之。大便不禁。吃逆不食。余以爲脾腎復傷。用六君加吳茱、肉果、骨脂、五味數劑。喜其年壯而愈。不然。多致不起。

一產婦大便秘結。小腹脹痛。用大黃等藥。致吐瀉不食。腹痛胸痞。余用六君子加木香、炮薑治之而愈。一婦人大便秘瀉。諸藥不應。苦不可言。令飲人乳而安。

麻仁丸

大麻仁研如泥

枳殼

人參各四分

大黃二分

右爲末。入麻仁。煉蜜丸。桐子大。每服二十九。空心溫酒下。未通。漸加。不可過服。阿膠枳殼丸。治產後大便秘澀。以阿膠枳殼二味。等分爲末。蜜丸。桐子大。滑石末爲衣。溫水下二十九。如或未通再服。

校註婦人良方 卷二十三 產後門 產後大小便不通方論第三 四

附方

十全大補湯

八珍湯二方見二十四卷第四論

加味四物湯方見二十四卷第六論

產後大小便不通方論第三

產後大小便不通。因腸胃虛弱。津液燥竭故也。

愚按前症若參前後論及八卷八論主治。

附治驗

一產婦大小便不通。諸藥不應。將危矣。令飲牛乳。一日稍通。三日而痊。人乳尤善。

桃花散 治膀胱積滯血澁。大小便秘。

桃仁

葵子

滑石

檳榔等分

右爲末。每服二錢。空心。葱白湯調下。

通氣散 治產後大小便不通。方見八卷第七論

產後遺糞方論第四

產後遺糞。取故燕窠中草燒爲末。或枯礬、牡蠣。或白斂、芍藥。各等分爲末。俱用酒調服。或用固腸丸亦可。

愚按前症若脾腎虛弱。用還少丹。仍以補中益氣湯爲主。虛寒加肉苳蔻、補骨脂。或四神丸。若脾腎虛寒。用八味丸。兼四神丸。仍佐以前二方。

附治驗方小便出尿

一產婦大便秘。飲食少思。五更或侵晨遺尿。此中氣虛寒。脾腎不足。用補中益氣。送四神丸而痊。

一產婦小便出糞。名大小腸交。乃氣血俱虛。失行常道。先用六君子湯二劑。又用五苓散二劑而痊。循常腸交。亦可用。

附方

還少丹 治脾腎虛寒。飲食少思。發熱盜汗。遺精白濁。又治真氣虧損。肌體瘦弱等症。

肉蓯蓉

遠志去心

茴香

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黃

石菖蒲

山茱萸 去核

牛膝

杜

仲薑製

楮實子

五味子

白茯苓 各二兩

右各另爲末。用棗肉百枚并煉蜜丸。桐子大。每服五七十丸。空心。溫酒。或鹽湯下。日三服。

補中益氣湯

六君子湯 四方見二十卷第六論

四神丸 方見八卷第八論

八味丸 方見二十四卷第十一論

五苓散 方見二十一卷第十論

產後諸淋方論第五

產後諸淋。因熱客於脬。虛則頻數。熱則澀痛。氣虛兼熱。血入胞中。則血隨小便出。而爲血淋也。

愚按前症若膀胱虛熱。用六味丸。若陰虛而陽無以化。用滋陰腎氣丸。蓋土生金。金生水。當滋化源。仍參第八卷小便淋瀝頻數類。

附治驗

一產婦小水淋瀝。或時自出。用分利降火之劑。二年不愈。余以爲脾腎之氣虛。用

補中益氣湯、六味地黃丸而痊。

滑石散 治熱淋。

滑石 五分

通草

車前子

葵子 各等

右爲末。以漿水調服。

治小腸有熱。小便瀉痛。或爲血淋。

藟麥

黃芩

冬葵子 各二

通草 二兩

大棗 十二枚

右以水七升。煎二升半。分二服。

治脾氣不利。小便不通。桔紅爲末。每服二錢。空心溫酒下。

治肺氣不利。小便不通。杏仁十四枚。去皮尖炒食之。

治脾轉小便不利。滑石一錢半。寒水石一錢。水煎服。

附方

六味丸 方見二十四卷第十一論

滋陰腎氣丸

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

產後小便頻數方論第六

產後小便數者。乃氣虛不能制故也。

愚按前症若因穩婆不慎。以致胞損而小便淋瀝者。用八珍湯以補氣血。若因膀胱氣虛而小便頻數。當補脾肺。若膀胱陰虛而小便淋瀝。須補肺腎。仍參第八卷小便頻數諸類。

附治驗

一產婦小便頻數。時忽寒戰。乃屬脾肺虛弱。用補中益氣。加山茱、山藥為主。佐以桑螵蛸散而愈。後患發熱肺熱。盜汗自汗。月水不調。用加味逍遙散而安。一產婦患前症。吐痰發熱。日晡作渴。此膀胱陰虛。用補中益氣湯。佐以六味丸而愈。又患痢後小便頻數。手足俱冷。屬陽氣虛寒。用前湯及八味丸而瘳。

桑螵蛸散 治陽氣虛弱。小便頻數。或爲遺尿。

桑螵蛸三十箇炒

鹿茸酥炒

黃耆各三兩

牡蠣煨

人參

厚朴

赤石脂各二兩

右爲末。每服二錢。空心。粥飲調下。又方。用益智仁爲末。米飲下。

附方

八珍湯

六味丸

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論補中益氣湯方見二十四卷第六論

八味丸

二方見二十四卷第十一論

產後小便不禁方論第七

廣濟治產後小便不禁。用鷄尾燒灰。千金翼用白薇、芍藥爲末。俱用溫酒下。日三服。或桑螵蛸半兩。龍骨一兩。爲末。每服二錢。粥飲調下。
愚按前症若脾肺陽虛。用補中益氣湯。若肝腎陰虛。用六味地黃丸。若肝腎之氣虛寒。用八味地黃丸。

附治驗

一產婦小便不禁。二年不愈。面色或青赤。或黃白。此肝脾氣血虛熱。用加味逍遙散爲主。漸愈。佐以六味丸而痊。後因怒。小便自遺。大便不實。左目頓緊。面色頓赤。仍用前散。佐以六君子湯。以清肝火。生肝血。培脾土而瘳。
補脾飲 治胞破小便淋瀝。

生

絹黃色者一尺

白牡丹用根并皮

白各一錢

右水一碗煎至絹爛溫服服後忌言語否則無效

雞內金散 治氣虛弱床用雄雞腔脰并腸燒爲末溫酒調服

附方

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

六味丸

八味丸

二方見二十四卷第十一論

加味逍遙散

方見二十四卷第四論

產後小便出血方論第八

產後小便出血者因虛熱血滲於脬也以亂髮洗淨燒爲末米飲調服或滑石末一錢生地黃汁調下

愚按前症若膏粱積熱用加味清胃散醇酒濕毒葛根解醒湯怒動肝火加味小柴胡湯鬱結傷脾加味歸脾湯思慮傷心妙香散大腸風熱四物側柏槐花大腸血熱四物炒連槐花腸胃虛弱六君升麻柴胡元氣下陷補中益氣茯苓半夏胃氣虛弱六君升麻血虛四物升麻氣血俱虛八珍柴胡升麻大凡元氣

虛弱而發熱者。皆內真寒而外假熱也。但用六君。或補中益氣加炮薑。溫補脾氣。諸症悉退。若四肢畏冷。急加附子。

附治驗方藥血附下

一產婦尿血面黃。脇脹少食。此肝木乘脾土也。用加味逍遙。補中益氣。兼服而愈。後爲懷抱不樂。食少體倦。驚悸無寐而仍作。用加味歸脾湯。二十餘劑。將愈。惑於衆論。服犀角地黃湯。諸症復作。仍服前湯而愈。

一產婦糞後下血。食少體倦。此脾氣虛熱。用補中益氣。加吳茱炒黃連五分。四劑頓愈。用歸脾湯而痊。

一婦人怒則便血。寒熱口苦。或胸脇脹痛。或小腹痛悶。此肝木乘脾土。用六君。柴胡。山梔而愈。用補中益氣。加味逍遙而不復作。

一婦人久下血在糞前。屬脾氣虛寒。用補中益氣。加連炒吳茱一錢。數劑稍緩。乃加生吳茱五分。數劑而愈。黃連炒吳茱黃法見七卷第五論

一產婦大便後血。口乾飲湯。胸脇膨滿。小腹悶墜。內熱晡熱。食少體倦。日晡面赤。洒淅惡寒。此脾肺氣虛。先用六君加乾薑。木香。漸愈。用補中益氣。將愈。用歸脾

湯全愈。後勞役兼怒。發熱血崩。夜間譫語。此熱入血室。用加味小柴胡。二劑而熱退。用補中益氣。一劑而血止。用逍遙散。歸脾湯。調理而安。

葛花解醒湯 治酒積上下。外消其濕。

白荳蔻

砂仁

葛花 各五

木香 五分

青皮 三錢

陳皮

白茯苓

猪苓

人參 各半

白朮

神麴

澤瀉

生乾薑 各二錢

右爲末。每服五錢。白湯調下。

加味清胃散 方見二十卷首論

加味小柴胡湯 方見二十四卷第二論

加味歸脾湯

歸脾湯

八珍湯

逍遙散

加味逍遙散 方見二十四卷第四論 妙香散 方見六卷第八論

四物湯

六君子湯

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

產後陰脫玉門不開方論第九

產後陰脫。玉門不閉。因坐產努力。舉動房勞所致。或脫肛陰挺。逼迫腫痛。小便淋。愚按。玉門不閉。氣血虛弱也。用十全大補湯。腫脹熈痛。肝經虛熱也。加味逍遙散。若因憂怒。肝脾氣血傷也。加味歸脾湯。若因暴怒。肝火血傷也。龍膽瀉肝湯。仍參第八卷末諸論。

附治驗

一產婦玉門不閉。發熱惡寒。用十全大補加五味子。數劑而寒熱退。用補中益氣加五味子。數劑而玉門閉。

一婦人脾胃素弱。兼有肝火。產後玉門腫痛。寒熱作渴。嘔吐不食。外敷大黃等藥。內用驅利之劑。腫及於臀。諸症蜂起。此真氣虛而邪氣盛也。先用六君子以固腸胃。次用補中益氣以補陽氣。不數劑而全愈。

一產婦患此失治。腫潰不已。形體消瘦。飲食少思。朝寒暮熱。自汗盜汗。半年矣。用補中益氣加茯苓。半夏。膿水漸少。飲食漸進。用歸脾湯共五十餘劑而愈。

一產婦玉門不閉。小便淋瀝。腹內一塊。攻走脇下。或脹或痛。用加味逍遙散。加車前子而愈。

一婦人子宮腫大。二日方入。損落一片。殊類猪肝。面黃體倦。飲食無味。內熱晡熱。自汗盜汗。用十全大補湯。二十餘劑。諸症悉愈。仍復生育。

硫黃散 治產後陽氣虛寒。

硫黃

烏賊骨 各半

五味子 五錢

右爲末。搽患處。日三易。

一方。蛇床子一升。炒熱。帛裹熨患處。亦治陰痛。

一方。子宮脫出。以草麻子仁十四枚。研塗頂心。入卽洗去。

附方

十全大補湯

加味逍遙散

加味歸脾湯

歸脾湯

四方見二十四卷第四論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第八論

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

婦人陰蝕疳方論第十

婦人少陰脈數而滑者。陰中有瘡。名曰匿。或痛或痒。如蟲行狀。膿水淋瀝。亦有陰

蝕幾盡者。皆由心神煩鬱。脾胃虛弱。氣血流滯耳。內當補心養胃。外以藥傅洗乃可。

愚按。前症乃肝脾鬱結之症。木旺生蟲耳。宜解鬱清肝。備見八卷陰中生瘡類。

附治驗

一產婦素有肝火患此。內潰痒痛。食少熱渴。小水淋瀝。用加味逍遙散。加味歸脾湯兼服。間以蘆薈丸。外以鶴虱草煎洗而愈。

治疳蟲蝕下部。用蒲黃研勻傅入內。平胃散加貫衆末二錢。以熟猪肝拌藥。內陰中。

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論
蘆薈丸方見七卷第七論

產後乳少或止方論第十一

婦人乳汁。乃氣血所化。若元氣虛弱。則乳汁短少。初產乳房焮脹。此乳未通。若怒氣乳出。此肝經風熱。若累產無乳。此內亡津液。蓋乳汁資於衝任。若婦人疾在衝

任。乳少而色黃者。生子則怯弱而多疾。

愚按前症若氣血虛弱而不能化生。宜壯脾胃。怒動肝膽而乳腫汁出。宜清肝火。夫乳汁乃氣血所化。在上爲乳。在下爲經。若屢產無乳。或大便澀滯。當滋化源。

附治驗

一產婦因乳少服藥通之。致乳房腫脹。發熱作渴。余謂血氣虛。以玉露散補之而愈。

湧泉散 能下乳。忌食薑、椒、辛辣飲食。

王不留行

藴麥

麥門冬

龍

骨 各二錢

右用猪蹄汁一碗。酒一杯。煎服。以木梳於乳上梳下。

冷氣血虛。鍾乳粉每服二錢。煎漏蘆湯調。

附方

玉露散 治乳脈不行。身體壯熱。頭目昏痛。大便澀滯等症。

人參

白茯苓

桔梗 炒

芍

藥 各一錢

甘草 六分

右水煎服。

產後乳出方論第十二

產後乳汁自出。乃胃氣虛。宜服補藥止之。若乳多滿痛。用溫帛熨之。未產而乳自出。謂之乳泣。生子多不育。

愚按。前症氣血俱虛。用十全大補湯。肝經血熱。用加味逍遙散。肝經怒火。用四物參朮柴梔。肝脾鬱怒。用加味歸脾湯。

附治驗

一產婦勞役。忽乳汁如湧。昏昧吐痰。此陽氣虛而厥也。灌以獨參湯而甦。更以十全大補湯。數劑而安。若婦人氣血方盛。乳房作脹。或無兒飲脹痛。增寒發熱。用麥芽二三兩炒熟水煎服。立消。其耗散血氣如此。何脾胃虛弱。飲食不消。方中多用之。

十全大補湯

加味逍遙散

加味歸脾湯 三方見二十四卷第四論