


皇漢醫學叢書

方
機



吉益東洞
乾省守業
口授
編

皇漢醫
學叢書

方

機

人民衛生出版社

皇漢醫學叢書
方 機

書號：1886 開本：787×1092/32 印張：2 字數：25千字

吉益東洞 口授 乾省守業 編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版
(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)
• 北京崇文區矮子胡同三十六號。

人民衛生出版社 印刷・新華書店發行
長春印刷廠

1955年11月第1版—第1次印刷
印數：1—2,500 (長春版) 定價：0.25元

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

方機目錄

桂枝湯	澤瀉湯	九
桂枝附子湯	五苓散	一〇
桂姜棗草黃辛附湯	牡蠣澤瀉散	一〇
小建中湯	八味丸	一一
桂枝甘草附子湯	麻黃湯	一二
桂枝人參湯	麻黃附子甘草湯	一二
人參湯	麻黃杏仁甘草湯	一二
茯苓杏仁甘草湯	麻黃附子細辛湯	一二
苓桂朮甘湯	麻黃杏仁甘草石膏湯	一三
苓姜朮甘湯	麻黃杏仁薏苡甘草湯	一三
苓桂五味甘草湯	牡蠣湯	一四
苓甘五味姜辛湯	小青龍湯	一四
苓甘姜味辛夏仁湯	大青龍湯	一四
苓桂甘棗湯	越婢湯	一五
茯苓澤瀉湯	葛根湯	一六
	葛根黃芩黃連湯	一七
	小柴胡湯	一九

柴胡姜桂湯

一九

大柴胡湯

一〇

白虎湯

一〇

小承氣湯

一一

厚朴三物湯

一二

厚朴七物湯

一三

大承氣湯

一三

瀉心湯

一三

大黃附子湯

一四

大黃甘遂湯

一四

抵當湯

一五

橘皮大黃朴消湯

一五

大黃消石湯

一六

大黃牡丹皮湯

一六

調胃承氣湯

一六

桃核承氣湯

一七

甘草湯

一七

桔梗湯

一八

芍藥甘草湯

二八

甘遂半夏湯

二八

芍藥甘草附子湯

二九

甘麥大棗湯

二九

生姜甘草湯

二九

甘草乾姜湯

二九

四逆湯

三〇

茯苓四逆湯

三一

乾姜附子湯

三一

附子粳米湯

三一

薏苡附子敗醬散

三一

大烏頭煎

三一

烏頭湯

三一

赤丸

三一

真武湯

三三

附子湯

三四

天雄散

三四

梔子豉湯

三四

梔子藥皮湯	三六
梔子厚朴湯	三六
梔子乾姜湯	三六
大陷胸湯	三七
小陷胸湯	三七
栝薑薤白白酒湯	三八
瓜蒂散	三八
大半夏湯	三九
小半夏湯	三九
半夏苦酒湯	三九
半夏厚朴湯	四〇
半夏乾姜散	四〇
乾姜人參半夏丸	四一
半夏瀉心湯	四一
吳茱萸湯	四一
厚朴生姜半夏甘草人參湯	四二
黃連湯	四二
乾姜黃連黃芩人參湯	四三
大建中湯	四三

黃連阿膠湯	四三
黃芩湯	四四
六物黃芩湯	四四
三物黃芩湯	四五
白頭翁湯	四五
木防己湯	四五
防己茯苓湯	四六
防己黃耆湯	四六
枳實芍藥散	四七
枳朮湯	四七
排膿散	四七
桂枝枳實生姜湯	四七
枳實薤白桂枝湯	四八
橘皮枳實生姜湯	四八
茯苓飲	四八
橘皮竹茹湯	四九
橘皮湯	四九
桂枝茯苓丸	四九
芎歸膠艾湯	五〇

旋覆花代赭石湯

五〇

走馬湯

五三

赤石脂禹餘糧湯

五一

備急圓

五三

桃花湯

五一

礬石湯

五四

酸棗仁湯

五一

消鑿散

五四

葶藶大棗湯

五二

蛇床子散

五四

十棗湯

五二

黃土湯

四五

桔梗白散

五三

桂枝芍藥知母湯

五五

方機

吉益東洞先生口授

乾省守業筆記

殷經文緯校訂

桂枝湯

桂枝、芍藥、生姜各三兩。大棗十二枚（今用各七分五厘）甘草一二兩（今用五分）。

右五味。㕮咀以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫服一升。今以水一合四勺。煮取六勺。服已須臾。飲熟稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身熱熱。微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗後服小促其間。半日許令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病症猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。

頭痛發熱。汗出惡風者。正證也。頭痛一證亦當投此方矣。若因咳嗽。嘔逆而頭痛者。則非此湯之所治也。

惡寒。鼻鳴。乾嘔者。外邪之候也。此方主之。脈浮弱。或浮數而惡寒者。雖不具證。亦用此方。浮數浮弱。蓋桂枝湯之脈狀也。

汗吐下後更癢一證。又發熱汗出而身疼痛者。此方猶爲可用。若脈浮緊而疼痛者。則非此湯之所治也。

發汗後疼痛甚。脈沉遲。或痹或四肢拘攣。心下痞塞者。桂枝加芍藥生姜人參湯主之。於本方內加芍藥生姜各一兩。人參三兩。今用桂枝大棗人參各六分。芍藥大棗生姜各六分。桂枝一錢。芍藥一錢。甘草四分。以上六味。煮如桂枝湯。兼用太簇或應鐘。上衝甚者。桂枝加桂湯主之。於桂枝湯方內加桂二兩。桂枝一錢。芍藥大棗生姜各六分。甘草四分。右五味。煮如桂枝湯。兼用應鐘。若有拘急鞭滿之證者。則桂枝湯不宜與焉。凡上衝者。非上逆之謂。氣從少腹上衝于胸是也。

煩。脈浮數無鞭滿狀者。

腹滿寒下脈浮。或惡寒。或腹時痛者。桂枝加芍藥湯主之。於本方內加

芍藥二兩。桂枝大棗生姜各六分。芍藥一錢二分。甘草四分。右五味。煮如本方。

寒下已止。而大實痛者。桂枝加芍藥大黃湯主之。於前方內加大黃一兩。今於前方內加大黃二分。兼用應鐘散。

項背強。汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。於本方內加葛根四兩。桂枝芍藥大棗生姜各六分。葛根一錢二分。甘草四分。右六味。煎如本方。

身體強脈沉遲者。發熱汗出四肢拘急者。或桂枝湯證而渴者。括蔥桂枝湯主之。於本方內加括蔥根二兩。桂枝芍藥大棗生姜各六分。括蔥根一錢二分。甘草各四分。右六味。煮如本方。

黃汗四肢弛痛。或身疼重煩燥小便不利者。煩燥小便不利者立方證也。身體疼重爲主證也。或盜汗

出者。發熱惡風而發黃色者。桂枝加黃耆湯主之。於本方內加黃耆二兩。桂枝芍藥大棗生姜各六分。甘草黃耆各四分。右六味。煮如本方。

發汗遂漏不止。其人惡風小便難。四肢發急難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。於本方內加附子一枚。桂枝芍藥大棗生姜各六分。甘草四分。附子三分。右六味。煮如本方。

胸滿無拘急之證者。桂枝去芍藥湯主之。於本方內去芍藥。桂枝芍藥大棗生姜各六分。甘草四分。以上四味。煮法如本方。

若有喘而胸滿或痛或脇下痞鞕等證者。非此湯之所知也。端家桂枝加厚朴杏子湯主之。於本方內加厚朴二兩。杏子五十個。桂枝芍藥大棗生姜各六分。右七味。甘草厚朴杏仁各四分。若喘而身疼痛者。非此湯之所主也。

胸中熱而吐涎沫或咳者。南呂桂枝去芍藥加皂莢湯主之。於本方內去芍藥加皂莢二枚。桂枝生姜大棗各七分五厘。桂枝生姜大棗各七分五厘。甘草皂莢各五分。右五味。煮法如本方。若咳而腹中拘攣或咳逆倚息者。非此湯之所治也。

驚狂兼用紫圓起臥不安者。或火逆躁胸腹動劇者。及瘧疾而有上衝者。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯主之。桂枝、生姜、蜀漆各三兩。大棗十二枚（今各四分五厘）。牡蠣五兩（九分五厘）。龍骨四兩（六分）。甘草二兩（三分）。

右爲末。以水一斗一升。先煮蜀漆減二升。內諸藥煮取三升。去滓溫服一升。今以水二合四勺。煮取七勺。若有胸膈苦滿之症。則別有主治矣。

頭項強痛。發熱無汗。心下滿微痛。

兼用南呂

小便不利者。桂枝去桂加朮苓

湯主之。於桂枝湯方內去桂加朮朮各三兩。

芍藥大棗生姜菝朮各六分。甘草四分。右六味一齊法如桂枝湯。

失精胸腹有動者。兼用應鐘桂枝加龍骨牡蠣湯主之。於本方內加龍骨牡

蠣各三兩。桂枝芍藥大棗生姜龍骨牡蠣各四分五厘。甘草三分。右七味。黃如本方。

外感之證咽痛者。或咽喉中生瘡或腫痛

兼用應鐘。割者以梅肉攻之。

湯主之。於本方內加桔梗八分。黃法如本方。濕家骨節疼痛

兼用應鐘七寶者。或半身不遂口眼喎斜。

或紫者。或頭疼重^{應鐘}者。或身體麻痹者。或頭痛劇者。

應鐘時時以七寶紫圓之類攻之。

水附湯主之。桂枝芍藥大棗生姜朮各六分。附子四分。右七味。姜如本方。

濕家眼目不明者。圓或七寶桂枝去桂加朮苓湯主之者也。或耳聾或肉瞞筋惕者。

桂枝加朮朮附湯主之。桂枝去桂加朮朮各四分。右七味。姜如本方。

桂枝附子湯。

桂枝四兩(今八分)附子二枚(九分)甘草二兩(四分)生姜三兩、大棗十二枚(各六分)

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服。

今以水一合八勺。煮取六勺。

身體疼煩不能自轉側者。七寶應鐘若其人大便鞭^鐘小便自利無衝逆者。

桂枝附子去桂加朮湯主之。於桂枝附子湯方內去桂加朮四兩。

附子九分。朮分。朮八分。甘草四分。大棗生姜各六分。右五味。養法如桂枝附子湯。

右五味以水三升。煮取一升。去滓。分溫三服。一服覺身癆。半日許再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。即是水附走皮中。逐水氣未得除故耳。

桂姜棗草黃辛附湯。

桂枝生姜各三兩。大棗十二枚（各六分）。甘草、麻黃、細辛、各二兩（各四分）。附子一枚（三分）。

右七味。以水七升。煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取一二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。卽愈。以水一合四勺。養取六勺。

惡寒或身體不仁。或手足逆冷。而心下堅者。南呂及有痰飲之變者。四肢痠痛。惡寒甚者。圓時攻之。

世俗所謂勞咳。脊骨之炎骨蒸惡熱。惡寒。心中鬱鬱。或心下痞堅者。南呂無痞堅者。紫圓解毒散。俱以紫

小建中湯。

桂枝、甘草、生姜各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）。芍藥六兩（九分）。膠鈎一升（二錢）。

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內膠鈎。更上微火。消解。溫服一升。日三服。以水一合五勺。養取六勺。去滓。內膠鈎。令消。腹中急痛。鐘或拘攀者。此其正證也。若有外閉之證。則非此湯之所主治也。

鵝毒 解 **失精下血** 鐘應 之人。腹中攣急或痛。手足煩熱者。

產婦手足煩熱。咽乾口燥。腹中拘攣者。

鐘若有塊者。夷則。

心悸或肉瞞筋惕。或頭眩者。

鐘心悸甚者。解

茯苓建中湯主之。

於本方內加茯苓四分五厘。

厘。養法。如本方。

盜汗。或汗出多。或身重或不仁者。黃蓍建中湯主之。

兼用

於小建中湯

桂枝甘草附子湯。

甘草、朮各二兩（六分）。附子二枚（九分）。桂枝四兩（一錢二分）。

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗。則解。能食汗出。復煩者。服五合。恐一升多者。服六七合。以水一合二勺。養取六勺。服。

骨節煩疼掣痛。不得屈伸。近之則痛劇者。

紫圓或七寶。

桂枝人參湯。

桂枝、甘草各四兩（八分）。朮、人參、乾姜各三兩（六分）。

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。更煮取一二升。溫服一升。日再夜一服。以水一合八勺。養取六勺。服。

桂枝人參湯。

表裏有熱。下利。心下痞鞕太者。痢病發熱惡寒。心下痞鞕紫者。

人參湯。

人參。甘草。朮。乾姜。各三兩。(各七分五厘)

右四味。搗篩爲末。蜜和丸如雞黃大。以沸湯數合和一丸研碎。溫服之。日三服。夜二服。腹中未熟益至三四丸。然不及湯。湯法以四物依兩數切。用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。以水一合六勺。煮取六勺。服。

心下痞鞕大。所謂霍亂。者。心下痞。喜睡。不了了者。南呂圓。

暑病嘔吐下利。心下痞鞕者。紫圓。

茯苓杏人甘草湯。

茯苓三兩(一錢五分)。杏人五十個(一錢)。甘草一兩(五分)。

右三味。以水一斗。煮取五升。溫服一升。日三服。不差者更服。以水一合二勺。煮取六勺。

短氣息迫或喘急紫圓。酒客最多此病。以此湯大有効。

芩桂朮甘湯。

茯苓四兩(一錢二分)。桂枝三兩(九分)。朮。甘草各二兩(各六分)。

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。以水一合二勺。煮取六勺。

心下逆瀉。起則頭眩應鐘。或紫圓。者。

眼痛生赤脈。不能開者。應鐘。或紫圓。者。

耳聾衝逆甚。頭眩者。應鐘。及七寶。

芩姜朮甘湯。

甘草、朮各二兩（五分）乾姜、茯苓、各四兩（一錢）

右四味以水五升煮取三升分溫二服。以水一合二勺。煮取六勺。

身體重、腰冷、小便自利者。

鐘應

苓桂五味甘草湯。

茯苓桂枝各四兩（八分）甘草三兩（六分）五味子半升（一錢二分）

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服。以水一合六勺。煮取六勺。

咳後衝逆劇手足厥冷或心下悸或頭眩或肉瞞筋惕者。

以上諸症皆兼用南呂丸

若衝逆已愈但咳滿者苓甘五味姜辛湯主之於前方內去桂加茯苓四

兩（六分）乾姜細辛各三兩（四分五厘）

苓甘姜味辛夏湯。

茯苓四兩（九分）甘草、細辛、乾姜各三兩（各三分）五味子、半夏各半

升（各九分）

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日二服。以水一合六勺。煮取六勺。

前方證而嘔者。

苓甘姜味辛夏仁湯。於前方內加杏仁半升（九分）

前方證而微浮腫南呂者。

苓甘姜味辛夏仁黃湯。於前方內加大黃三兩（三分）

前方證而大便不通者。

芩桂甘棗湯。

茯苓半斤（一錢一分）甘草三兩（四分五厘）大棗十五枚（五分五厘）桂枝四兩（六分）

右四味以水一斗先煮茯苓減一二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服（以水二合煮取六勺）

臍下悸者。

奔豚迫于心胸短氣息迫

圓紫者。

茯苓澤瀉湯。

茯苓半斤（一錢一分）澤瀉生姜各四兩（各六分）甘草桂枝各一二兩（各三分）朮二兩（四分五厘）

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉更煮取一二升半溫服八合日三服

以水二合五勺先煮五味取八勺內澤瀉更煮取六勺

吐而渴欲飲水者此正症也

紫圓渴渴也

而小便不利心下悸或腹脹滿

水滿者種實紫圓仲呂之類選用

澤瀉湯。

澤瀉五兩（一錢五分）朮二兩（一錢）