

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛 己立齋補註
鄞縣 曹赤電炳章圖校

卷二

婦人中風諸症方論第一

夫中風者。因內虛而中之也。蓋風爲四時八方之氣。常以冬至之日。自坎而起。從其鄉來者。主長養萬物。否則名爲虛風。賊害萬物。從背而入。或中腑。或中臟。或中血脈經絡。其症或肢體不遂。或手足偏枯。或痰涎壅塞。或口眼歪斜。或牙關緊急。或腰背反張。若眼開口閉。涎流失音者。難治。如眼閉口開。鼾睡遺尿者。死。中風中氣。皆用蘇合香丸。中氣用三生飲。若作風治。百無一生。

愚按中風者。卽內經所謂偏枯。風痺。風懿。風痺是也。而有中腑。中臟。中血脈之

分焉。夫中腑者爲在表。中臟者爲在裏。中血脈者爲在中。在表者宜微汗。在裏者宜微下。在中者宜調榮。中腑者多着四肢。如手足拘急不仁。惡風寒。此數者病淺。皆易治。用加減續命湯之類。中臟者多滯九竅。如眼瞶者。中於肝。舌不能言者。中於心。脣緩便秘者。中於脾。鼻塞者。中於肺。耳聾者。中於腎。此數者病深。多難治。中血脈者。外無六經之證。內無便溺之阻。肢不能舉。口不能言。用大秦芫湯主之。中腑者。多兼中臟。如左關脈浮弦。面目青。左脇偏痛。筋脈拘急。目瞶頭目眩。手足不收。坐踞不得。此中膽兼中肝也。用犀角散之類。如左寸脈浮洪。面舌赤。汗多惡風。心神顛倒。言語蹇澀。舌強口乾。忪悸恍惚。此中小腸兼中心也。用麻黃散之類。如右關脈浮緩。或浮大。面唇黃。汗多惡風。口喎語澀。身重怠惰嗜臥。肌膚不仁。皮肉咽動。腹膨不食。此中胃兼中脾也。用防風散之類。如右寸脈浮濇而短。面色白。鼻流清涕。多喘。胸中冒悶。短氣。自汗聲嘶。四肢痿弱。此中大腸兼中肺也。用五味子湯之類。如左尺脈浮滑。面目黧黑。腰脊痛引小腹。不能俛仰。兩耳虛鳴。骨節疼痛。足痿善恐。此中膀胱兼中腎也。用觸活散之類。此皆言真中風也。而有氣血之分焉。蓋氣虛而中者。繇元氣虛而賊風襲之。則

右手足不仁。用六君子湯。加鈎藤、薑汁、竹瀝。血虛而中者。絲陰血虛而賊風襲之。則左手足不仁。用四物湯。加鈎藤、竹瀝、薑汁。氣血俱虛而中者。則左右手足皆不仁也。用八珍湯。加鈎藤、薑汁、竹瀝。其與中風相類者。則有中寒、中濕、中火、中氣、食厥、勞傷、房勞等症。如中於寒者。謂冬月卒中寒氣。昏冒口噤。肢攣惡寒。脈浮緊。用麻黃桂枝理中湯之類。中於暑者。謂夏月卒冒炎暑。昏冒痿厥。吐瀉喘滿。用十味香薷飲之類。中於濕者。丹溪所謂東南之人。多因濕土生痰。痰生熱。熱生風也。用清燥湯之類。加竹瀝、薑汁。中於火者。河間所謂非肝木之風。內中六淫之邪。外侵。良繇五志過極。火盛水衰。熱氣拂鬱。昏冒而卒仆也。用六味丸。四君子。獨參湯之類。內有悲怒傷肝。火動上炎者。用柴胡湯之類。中於氣者。繇七情過極。氣厥昏冒。或牙關緊急。用蘇合香丸之類。誤作風治者死。食厥者。過於飲食。胃氣自傷。不能運化。故昏冒也。用六君子。加木香。勞傷者。過於勞役。耗損元氣。脾胃虛衰。不任風寒。故昏冒也。用補中益氣湯。房勞者。因腎虛精耗。氣不歸源。故昏冒也。用六味丸。此皆類中風者也。夫內經主於風。河間主於火。東垣主於氣。丹溪主於濕。愚之斯論。僭補前人之闕也。若夫地之南北。人之虛

實。固有不同。其男子女人。大略相似。當與後論參看通變治之。

附治驗

斬閣老夫人。先胸脇脹痛。後四肢不收。自汗如水。小便自遺。大便不實。口緊目瞤。飲食頗進。十餘日矣。或以爲中臟。公甚憂。余曰。非也。若風旣中臟。真氣旣脫。惡症旣見。禍在反掌。焉能延之。乃候其色。面目俱赤。而面或青。診其脈。左三部洪數。惟肝尤甚。余曰。胸乳脹痛。肝經血虛。肝氣否塞也。四肢不收。肝經血虛。不能養筋也。自汗不止。肝經風熱。津液妄泄也。小便自遺。肝經熱甚。陰挺失臟也。大便不實。肝木熾盛。尅脾土也。遂用犀角散四劑。諸症頓愈。又用加味逍遙散調理而安。後因鬱怒。前症復作。兼發熱嘔吐。飲食少思。月經不止。此木盛尅土。而脾不能攝血也。用加味歸脾湯爲主。佐以加味逍遙散。調補肝脾之氣。清和肝脾之血而愈。後每遇怒。或睡中手足抽搐。復用前藥卽愈。

大參朱雲溪母。於九月內。忽仆地痰沫。不省人事。脣口喎斜。左目緊小。或用痰血之劑。其勢稍緩。至次年四月初。其病復作。仍進前藥。勢亦漸緩。至六月終。病乃大作。小便自遺。或謂風中於臟。以爲不治。余診之。左關弦洪而數。此屬肝火血

原
书
缺
页

原
书
缺
页

血液衰少而然也。用清燥湯、六味丸兼服尋愈。

一婦人肢節作痛。不能轉側。惡見風寒。自汗盜汗。小便短少。雖夏亦不去衣。其脈浮緊。此風寒客於太陽經。用甘草附子湯一劑而瘥。

一婦人因怒發搐。嘔吐痰涎。口噤昏憤。氣口脈大於人迎。此氣滯而食厥。用平胃散。加茯苓、半夏、木香治之而甦。更以六君子加木香漸愈。乃去木香。又二十餘劑而瘥。

一婦人元氣素虛。勞則體麻發熱。痰氣上攻。或用烏藥順氣散、祛風化痰丸之類。肢體痿軟。痰涎自出。面色痿黃。形體倦怠。而脾肺二脈虛甚。此氣虛而類風。朝用補中益氣湯。夕用十全大補湯。漸愈。又用加味歸脾湯調理尋愈。

一婦人體體肥胖。頭目眩暈。肢體麻木。腿足痿軟。自汗身重。其脈滑數。按之沉緩。此濕熱乘虛也。用清燥、羌活二湯漸愈。更佐以加味逍遙散全愈。

一婦人口眼歪斜。四肢拘急。痰涎不利而惡風寒。其脈浮緊。此風寒客於手足陽明二經。先用省風湯二劑。後用秦艽升麻湯而愈。

一婦人素性急。患肝風之症。常服搜風順氣丸、秦艽湯之類。後大怒吐血。脣口牽

緊。小便頻數。或時自遺。余以爲肝火旺而血妄行。遂用小柴胡湯。加山梔、牡丹皮漸愈。五年之後。又大怒吐血。誤服降火祛風化痰之劑。大便頻數。胸滿少食。用清氣化痰之劑。嘔而不食。頭暈口乾。不時吐痰。用導痰降火之類。痰出如湧。四肢常冷。余曰。嘔而不食。胃氣虛弱也。頭暈口乾。中氣不能上升也。痰出如湧。脾氣不能攝涎也。四肢逆冷。脾氣不能運行也。用補中益氣。加茯苓、半夏治之。諸症漸愈。又用加味歸脾湯。兼服而安。

鴻臚王繼之室人。素有癰症。遇勞役怒氣則發。良久自省。一日因飲食勞役失宜。發而半日方省。不能言語。或以爲風中於臟。用祛風化痰順氣之劑。及牛黃清心丸。病益甚。六脈浮大。兩寸虛而不及本部。且進飲食。余曰。此脾胃之氣傷也。若風中於臟。禍在反掌。彼不信。仍用風藥。後果卒。

婦人吐痰頭暈。肢體麻木。見第四卷

產後發瘕似中風。見第十卷

娠婦發瘕似中風。見第十卷
男子諸症。見內科摘要

排風湯 治風邪入臟。狂言妄語。

白鮮皮

白朮

白芍藥炒

桂心

川芎

當歸

防風

杏仁去皮炒

甘草各二

白茯苓

麻黃去節

獨活各二

三生飲

治卒中不省。口眼喎斜。痰壅喉響。無問外感內傷。痰涎食厥。氣虛眩暈。

但六脈沉。悉有神效。

生南星

生烏頭去皮

生附子各半兩

木香一錢

右每服半兩。薑水煎。不省人事。以細辛、皂角末少許吹鼻中。得嚏進藥。氣盛只

用南星五錢。生薑十四片。煎飲之。名星薑飲。

愚按。三生飲乃行經絡。治寒痰之良藥。斬關奪旗之神劑。每服必用人參兩許。

驅其外邪。而補其真氣。否則不惟無益。適以取敗。觀先哲用耆附、朮附等湯。其

義可見。

加減小續命湯。治中風半身不遂。口眼喎斜。手足戰掉。語言蹇澀。神思昏亂。筋

攣骨痛。或脚氣緩弱。陰晦復作。

麻黃去節

防己

人參

黃芩炒

桂心

甘草炒

白芍藥

川芎

杏仁各一兩

附子炮半

防風半兩

右每服五錢。薑棗水煎。精神恍惚。加茯苓、遠志。有熱。去附子。加芍藥。心煩。加犀角半兩。骨冷痛。加桂附。嘔逆腹脹。加人參、半夏一兩。躁悶便澀。去附子。加芍藥一兩。竹瀝一合。臟寒下利。去防己、黃芩。加附子、白朮一兩。自汗。去麻黃、杏仁。加白朮一兩。腳弱。加牛膝、石斛一兩。身痛。加秦艽一兩。腰痛。加桃仁、杜仲半兩。失音。加杏仁一兩。

小引風湯

防風

獨活

細辛

川芎

五味子并炒

白茯苓

人參

白芍藥焙

白朮炒

甘草等分

右每服五錢。薑三片。杏仁五個。水煎服。加麻黃、菴蓉、附子、當歸、羚羊角等分。即大引風湯也。

必效竹瀝湯 治中風痰涎壅盛。言語蹇滯。四肢緩縱。

秦艽

防風

獨活

附子炮各錢

右以水二盞。煎半盞。入生地汁、淡竹瀝各半盞。再煎四五沸。作四服。病既去。以他藥調治。未愈再服。最效。

星香湯 治中風痰盛。服熱藥不得者。

南星 木香等分

右每服四錢。薑十片。水煎。

星附湯 治中風痰涎上攻。六脈沉伏。不知人事。

附子 生用 南星 生用 各木香 半兩

右每服四錢。薑水煎。寒甚。加天雄、川烏。多灸關元、丹田二穴。

附方

三化湯 治中風。外有六經之形症。先以加減續命湯治。內有便溺之阻隔者。此方主之。

厚朴 薑汁炒

大黃 酒蒸

枳實 麸炒

羌活 各入

右每服一兩。水煎。

秦芄湯 治中風外無六經之形症。內無便溺之阻隔。乃血弱不能養於筋。手足

不能運口強不能言。宜養血而筋自榮也。

秦 芫

石 膏各二兩

甘 草炒

川 芎

當 歸

芍 藥炒

羌 活

獨 活

防 風

黃 芩炒

白 芷

生 地 黃

熟地黃自製

白 茯苓

白 朮各一兩

細 辛半兩

右每服一兩。水煎。

陰雨。加生薑七片。春夏。加知母一兩。

省風湯

治中風口噤。口眼喎斜。筋脈攣急。抽掣疼痛。風熱痰實。

防 風

南 星生用各四兩

半 夏水浸洗生用

黃 芩炒

甘 草

生用各二兩

右每服五錢。水煎。

大八風湯後方見

燒竹瀝法

用新竹截尺許。作兩片。用兩磚對立。竹仰磚上。中以火燒之。兩頭瀝

自出。取荆瀝亦然。

烏藥順氣散

治風氣骨節疼痛。遍身頑麻。手足癱瘓。言語蹇澀。宜先疎氣道。後

隨證投藥。

麻黃去節

烏藥

陳皮去白

川芎

白芷

桔梗

枳殼去穢

甘草炒各

乾薑炮半

僵蠶炒一

右每服五錢。薑水煎。頭痛加葱白。

有汗加薄荷。

八味順氣散

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮炒

烏藥

人參各一

甘草炙半

右每服五錢。水煎。

導痰湯

半夏

南星

茯苓

陳皮炒

枳實炒

甘草炒

右薑水煎服。

參蘇飲 治痰積中脘。暈眩嘈雜。怔忡噦逆。或痰停關節。手足轉曳。口眼喎斜。半

身不遂。嘔吐惡心。頭疼發熱。

人參

紫蘇葉

半夏

茯苓

乾葛

前胡各三錢

甘草炙

木香

陳皮炒

枳殼製

桔梗各半兩

右每服一兩。薑水煎。腹痛加芍藥。

附子理中湯

治中寒不語。四肢強直。昔有武士守邊大雪。出帳盼瞻。忽然暈倒。

又馬觀文之內。厥逆惡寒腹痛。服此悉愈。方見十一卷第八論

牛黃清心丸方見後

秦艽升麻湯

治風寒客於手足陽明經。口眼喎斜。惡見風寒。四肢拘急。其脈浮

緊。

秦艽二錢

升麻

乾葛

甘草

芍藥炒

人參各半兩

防風

桂枝各三錢

右每劑一兩。連鬚葱白二莖。水煎服。

犀角散 治肝臟中風。筋脈拘攣。手足不收。坐踞不得。胸背強直。脇肋脹滿。面赤

心煩。言語蹇澀。或風邪流注四肢。上攻頭面作痛。口眼喎斜。脚膝痛乏。

犀角屑二錢

石膏

羚羊角

羌活各一錢

人參

甘菊花

獨活

黃芩炒

天麻

枳殼去穢炒

當歸

黃耆

芎藭

白朮

酸棗仁炒

防風

白芷各五分

甘草五分

右水薑煎。

薏苡仁散 治肝臟中風。

薏苡仁

麻黃去節各一錢半

防風

附子炮去皮

柏子仁

川芎

桂心

枳殼去穢炒

石膏

細辛

獨活

羚羊角各一錢

右薑水煎服。

射干湯 治肝經受病。多汗惡風。善悲噤乾。目下青黃。可治。急灸肝膈百壯。一黃

一白。不可治。

射干

芍藥各二錢半

薏苡仁三錢

桂心五分

牡蠣

石膏各二錢

右作一劑。水煎服。

茯神散 治同前。或四肢沉重。精神不安。或痰氣不利。

茯神去木

羌活

麻黃去節

龍齒另研

赤芍藥

甘草炙各一錢

蔓荊子

薏苡仁

麥門冬去心

人參去蘆

防風去蘆

犀角屑各二分

右水薑煎。

遠志湯 治症同前。或偃臥不側。悶亂冒絕。若脣色正赤。可治。灸心膻百壯。若青

黃不定。面色晳晳戰慄動者。不可治。

遠志去心二錢半

人參

石菖蒲

羌活

細辛

麻黃去根各半兩

赤芍藥

白朮各一兩

右爲末。每服二錢。煎小麥湯調。日二服。

防風散 治脾臟中風。多汗惡風。身體怠惰。四肢不能動。色微黃。不嗜食。舌強語

澀。口喎斜僻。肌膚不仁。腹膨心煩。翕翕發熱。神思如醉。其脈浮緩。胸滿痰涎。志意昏濁。

獨活半錢

防風

茯苓去木

人參

附子炮去

前胡

沙參

半夏湯洗七次

黃耆炒

旋覆花

羚羊角銹末

甘草炙各錢

右水薑煎。

白朮湯 治症同前。或腹滿身黃。嘔吐酸水。急灸脾臑百壯。目下及手足青者。不

可治。口角兩邊黃者。可治。

白朮

厚朴薑製

防風各二錢

附子炮去

橘紅

白蘚皮

五加皮各一錢

右水薑煎。

細辛散 治症同前。或肉熱。肌膚淫淫如蟲行。或汗大洩。皮膚不澤。唇鼻黃色。

細辛

白朮

獨活

附子炮去

肉桂

防風各一錢

厚朴薑製

麻黃