

中国动物图谱

—— 鳥 类 ——

第 三 册

科学出版社


中国动物图谱

鳥 类

第 三 册

(雀 形 目)

鄭作新 傅桐生 錢燕文 等編著
周宇垣 王希成



科学出版社

1962

內 容 簡 介

本册列有雀形目鳥类計 150 种, 分隶于 26 科, 每种均有簡要說明, 与图对照, 便于参考之用。

中 国 动 物 图 譜 鳥 类 第 三 冊

編著者 郑 作 新 等

出版者 科 学 出 版 社
北京朝阳門大街 117 号
北京市书刊出版业营业許可証出字第 061 号

印刷者 中 国 科 学 院 印 刷 厂

总經售 新 华 书 店

1962 年 12 月第 一 版 书号: 2644 字数: 132,000
1962 年 12 月第一次印刷 开本: 787×1092 1/16
(京) 001—870 印张: 5 1/4

定价: 0.80 元

前 言

这是中国动物图谱鳥类的第三册,其中所列均属于雀形目,計 150 种,分隶于 26 科。
編写分工情况如次:

百灵、鵲鴝、鴉、雀等科.....	傅桐生
太平鳥、黃鸝、鷓(鶯和鷓亞科)、山雀、鵲、綉眼鳥等科.....	錢燕文
鵲、啄花鳥、太陽鳥等科.....	周宇垣
伯勞、棕鳥等科.....	王希成
闊嘴鳥、八色鸚、燕、山椒鳥、卷尾、燕鵙、河鳥、鷓鴣、岩鷓、鷓(鷓和画眉亞科)、旋木雀、文鳥 等科.....	鄭作新

本册的取材标准以及編写的内容和規格,悉依前例。各鳥的描述,除另有注明外,概为雄性成鳥的繁殖羽。对于各鳥的生态方面,着重生境、食性及巢卵等的特征。

中国动物图谱鳥类部分,先后已出三册,合計 364 种,分隶于 22 目 68 科;以种数言,約占全国鳥类总额三分之一,足敷目前一般参考的需用。至于国内鳥类更全面而有系統的介绍,則有待于专书。

本册所列的图,均由卢济珍、岩崑、王竟成、李传勳等同志繪就。

鄭 作 新

北京中国科学院动物研究所

目 录

前言

雀形目

闊嘴鳥科.....	1
銀胸絲冠鳥.....	1
八色鸚科.....	1
藍翅八色鸚.....	1
百灵科.....	2
沙百灵.....	2
百灵.....	2
凤头百灵.....	3
云雀.....	3
燕科.....	4
灰砂燕.....	4
家燕.....	4
金腰燕.....	5
鵲鴝科.....	5
樹鵲.....	5
水鵲.....	6
田鵲.....	6
山鵲鴝.....	7
白鵲鴝.....	7
黃腹灰鵲鴝.....	8
黃鵲鴝.....	8
山椒鳥科.....	9
暗灰鵲鴝.....	9
小灰山椒鳥.....	9
灰山椒鳥.....	10
赤紅山椒鳥.....	10
鸚科.....	11
白喉冠鸚.....	11
綠翅短脚鸚.....	11
栗背短脚鸚.....	12
黑〔短脚〕鸚.....	12
紅耳鸚.....	13
黃臀鸚.....	13
白头鸚.....	14
紅臀鸚.....	14
綠頸嘴鸚.....	15

太平鳥科.....	15
太平鳥.....	15
伯勞科.....	16
紅尾伯勞.....	16
虎紋伯勞.....	16
牛頭伯勞.....	17
棕背伯勞.....	17
黃鸝科.....	18
黃鸝.....	18
卷尾科.....	18
黑卷尾.....	18
灰卷尾.....	19
發冠卷尾.....	19
棕鳥科.....	20
絲光棕鳥.....	20
灰棕鳥.....	20
八哥.....	21
鸚哥.....	21
燕鵲科.....	22
灰燕鵲.....	22
鴉科.....	22
松鴉.....	22
長尾藍鴉.....	23
灰喜鴉.....	23
喜鴉.....	24
樹鴉.....	24
星鴉.....	25
紅嘴山鴉.....	25
禿鼻烏鴉.....	26
寒鴉.....	26
大嘴烏鴉.....	27
小嘴烏鴉.....	27
白頸鴉.....	28
河鳥科.....	28
褐河鳥.....	28
鷓鴣科.....	29
鷓鴣.....	29
岩鸚科.....	29

領岩鷓	29
鷓科	30
鷓亞科	30
藍歌鷓	30
藍點類	30
紅點類	31
紅肋藍尾鷓	31
鷓鷃	32
灰頂紅尾鷓	32
白頂溪鷓	33
紅尾溪鷓	33
短翅鷓	34
小燕尾	34
黑背燕尾	35
黑喉石鷓	35
灰林鷓	36
白頂鷓	36
白喉磯鷓	37
藍磯鷓	37
紫嘯鷓	38
黑鷓	38
白眉白腹鷓	39
赤頸鷓	39
紅尾斑鷓	40
虎斑山鷓	40
画眉亞科	41
棕頸鈎嘴鷓	41
銹臉鈎嘴鷓	41
紅頂穗鷓	42
紅頂鷓	42
文須雀	43
棕頭鴉雀	43
矛紋草鷓	44
黑臉噪鷓	44
黑領噪鷓	45
黑喉噪鷓	45
山噪鷓	46
画眉	46
白頰噪鷓	47
銀耳相思鳥	47
紅嘴相思鳥	48
紅翅鷓鷃	48
栗頭希鷓	49
黑類風鷓	49

白腹風鷓	50
褐雀鷓	50
白眶雀鷓	51
山鷓	51
鷓亞科	52
矛斑蝗鷓	52
大草鷓	52
芦鷓	53
褐柳鷓	53
黃眉柳鷓	54
黃腰柳鷓	54
極北柳鷓	55
鷓亞科	55
白眉鷓	55
鷓鷃	56
紅喉鷓	56
烏鷓	57
北灰鷓	57
寿帶鳥	58
山雀科	58
大山雀	58
沼泽山雀	59
鷓科	59
普通鷓	59
旋木雀科	60
旋木雀	60
啄花鳥科	60
朱背啄花鳥	60
紅胸啄花鳥	61
太陽鳥科	61
藍喉太陽鳥	61
叉尾太陽鳥	62
紋背捕蛛鳥	62
綉眼鳥科	63
暗綠綉眼鳥	63
紅肋綉眼鳥	63
文鳥科	64
麻雀	64
山麻雀	64
黃胸織布鳥	65
白腰文鳥	65
斑文鳥	66

雀科.....66

燕雀..... 66

金翅雀..... 67

黄雀..... 67

朱雀..... 68

北朱雀..... 68

紅交嘴雀..... 69

黑头蜡嘴雀..... 69

黑尾蜡嘴雀..... 70

錫嘴雀..... 70

栗鴉..... 71

黃胸鴉..... 71

黃喉鴉..... 72

灰頭鴉..... 72

三道眉草鴉..... 73

赤胸鴉..... 73

田鴉..... 74

小鴉..... 74

凤头雀..... 75

鉄爪鴉..... 75

銀胸絲冠鳥 闊嘴鳥科

Serilophus lunatus elisabethae La Touche

(銀胸闊嘴鳥)

量度：体长约175，嘴峯14.5，翼91，尾69，跗蹠19毫米(♂)。

形态 头頂灰棕，頸項更棕，前額沾藍；眉紋黑而形寬闊，直伸至頸項；上背和兩肩灰褐，向后漸轉為腰和尾上復羽的栗色。尾黑；最外側三對具有寬闊白端；次一對的內翹近端處具一白斑。翼上復羽黑，腕緣近處各羽稍沾灰藍色；初級和次級飛羽黑，基部橫貫以一道淡藍寬斑，先端綴白；第三和第四枚初級飛羽的白端特闊而顯；內側飛羽的外翹具藍端，內翹具栗端，二色之間綴以白紋；三級飛羽淡栗色。頭側淡棕，眼先稍薄棕灰黑色。下體淡珠灰，胸和兩肋較淡，向后几轉純白；復腿羽黑；腋羽灰色。

雌鳥自頸側有一狹形銀白色領環橫亘胸部。


眼深紫褐色，雜以深翠光澤；眼周裸露部鮮黃；嘴灰藍色，基部橙黃，中部橄欖綠，會合綫藍白色；跗蹠黃綠色。

生态 栖于平原和丘陵間各種類型的樹林中，亦見于竹叢和矮樹叢間。飛行遲鈍。性亦緩慢，不畏人。曾見有小羣栖在樹上覓食，雖經連續射擊，亦不驚飛。食物以昆蟲為主，間兼吃果實及其他植物質。叫聲似“chir-r-r”，輕低而富于音韻。

巢由雜草、嫩枝、細莖等所成，內墊以更細的草、竹葉和其他樹葉等，置于矮樹上或灌木叢間。卵每產4—5枚，色近白，而疏雜以紅褐色斑點，尤其是在卵的鈍端。

分布 此鳥在國內有三個亞種的分化。本亞種見于雲南和廣西的南部；另有其他亞種得自雲南西南部及海南島。

經濟意義 可利用為觀賞鳥。



藍翅八色鶇 八色鶇科

Pitta brachyura nympha Temminck et Schlegel

(五色麥鷄)

量度：体长约190，嘴峯23，翼119，尾34，跗蹠39毫米(♂)。


形态 头頂棕褐，縱貫以一道黑色冠紋；眉紋乳黃，直伸至後頸；後頸有黑色領環；背翠綠色；下腰和尾上復羽輝藍；尾黑而具暗綠色羽端。小復羽藍；內側復羽和飛羽與背同色；外側者均轉為黑褐，初級飛羽的基部橫貫以一道白斑。頭側黑；頰微黑；喉白；胸和兩肋均沾淡棕綠色；腹部中央和尾下復羽粉紅色；腋羽黑。

雌鳥相似，但羽色較蒼淡。

眼暗褐；嘴黑褐，基部、先端以及嘴峯均較淡；跗蹠為帶粉紅的肉黃色。

生态 大多單獨在灌叢間的地面上活動，從落葉腐屑間搜索食物。行動敏捷，往往連續急跳，每跳逾米。巢營置于山坡上的灶狀構造中，外層為枯葉，次為苔蘚層，其內再鋪以松針。卵每產4—5枚，呈寬橢圓形，色白而沾灰，并具淡紫和紫褐色斑點，特別是在卵的鈍端。

分布 繁殖在安徽和台灣山地；遷徙時，見于東南沿海各省；曾經一度偶獲自河北北戴河。此鳥在國內還有二個亞種：*P. b. melli* 分布于兩廣，及 *P. b. moluccensis* 見于雲南南部。




沙 百 灵 百灵科

Calandrella rufescens cheleënsis (Swinhoe)

(小云雀、沙鸛)

量度：体长 156，嘴峯 10，翼 90，尾 65，跗蹠 19 毫米(♂)。

形态 上体一般沙棕色，而具黑色纵纹，尾上复羽棕色更著；两翼和尾均暗褐，羽缘淡沙棕色；最外侧一对尾羽几全白色，次一对外翮纯白；耳羽



淡棕；下体大都白色，胸有不明显的暗褐色斑点，两肋亦杂以褐色纵纹。

眼褐色；嘴铅褐色；脚黄褐色。

生态 喜栖于河川旁草原沙地和田野等。性不甚畏人；俟人接近时方飞去，飞行不远又落下。在高空飞翔时，一边急动两翼，现出优美姿态，一边发出悦耳的鸣叫声。觅食在草地上。食物主要为杂草种子，夏季也有昆虫幼虫。巢营于草原或沙滩上，由禾本科植物的茎叶和细根等筑成。卵每窝 3—4 枚，呈绿白色而具褐色和淡紫色斑点。

分布 国内有六个亚种。本亚种分布于东北、内蒙古、河北、甘肃、陕西、山东和江苏北部。


经济意义 著名笼鸟之一。

百 灵 百灵科

Melanocorypha mongolica mongolica (Pallas)

量度：体长 179，嘴峯 17，翼 117，尾 70，跗蹠 26 毫米(♂)。

形态 (冬羽) 额、头顶周缘和后颈均栗红色，头顶中部棕黄；眉纹棕白，向后延伸至枕；耳羽茶褐；上体余部概栗褐色，羽缘棕灰。翼上复羽大都栗红，羽缘淡黄；外侧飞羽黑褐，羽缘白色，内侧者



几变纯白；尾羽黑褐，羽缘和羽端缀白，最外侧尾羽几全白色。喉白；上胸两侧具黑色块斑，其下转为棕白；至腹纯白，胁部具有栗纹。

雌鸟的栗色一般较浅淡，而褐色较著；胸侧黑斑不如雄鸟之发达。

眼灰褐色；嘴黑褐，下嘴淡黄；脚淡黄色。

生态 生活于荒漠草原。地上行走颇速，飞翔也很快。鸣声变化很多，能模仿其他鸟类及猫等的鸣叫声。食物主要是各种野生植物的种子，也有少量昆虫。巢由杂草所成，置于草下凹坑内，或露天地面陷凹处。卵呈白色或近黄色，而具褐色细斑。

分布 内蒙古东部草原留鸟，不良年份中也成羣徙至河北。另一亚种分布于青海。

经济意义 为我国最著名的笼鸟之一，每年有许多幼雏运至各地。

凤头百灵 百灵科

Galerida cristata leautungensis (Swinhoe)

(阿兰、角角、大角)

量度：体长 182，嘴峰 18，翼 103，尾 67，跗蹠 24 毫米(♂)。

形态 头上具长而窄的冠羽。上体一般沙褐色，各羽具黑褐色纵纹；尾上复羽较棕而无黑纹；两翼和尾均暗褐色，羽缘棕褐，最外侧尾羽几全棕褐色；眼先和眉纹淡棕；颧纹和穿眼线均暗褐色。下体棕白，胸部具有黑褐色纵斑；两胁和尾下复羽棕色较著。


眼淡褐色；嘴铅褐色；脚黄褐色。

生态 栖息于山脚草原、海滨草地或荒漠草原地带。高空鸣叫，边飞边鸣，姿态优美，鸣声动听。性不畏人。地上觅食，以各种杂草种子为食。繁殖期中兼食昆虫。营巢于地面凹陷处。巢甚大，呈碗形，由干草和芦苇等编成。卵每产 4—5

枚，底色近白而具褐色和紫灰色斑。

分布 广布于东北、华北一带，西达甘肃和四川。另一亚种见于新疆和甘肃西北部。

经济意义 国内著名笼鸟之一。



云雀 百灵科

Alauda arvensis intermedia Swinhoe

(阿兰、告天子、朝天柱)

量度：体长 187，嘴峰 12，翼 110，尾 65，跗蹠 22 毫米(♂)。

形态 上体包括翼上复羽概沙褐色，各羽具黑褐纵纹；后头具羽冠；两翼和尾均黑褐色，各羽外缘淡棕；最外侧一对尾羽几乎纯白，次一对的外翹亦白。眉纹淡棕；耳羽稍带褐色。胸部淡棕，具多数黑褐色斑点；下体余部均白。


眼暗褐；嘴铅黑色；脚肉褐色。

生态 生活于田野和草甸，或林缘草地上。常于清晨起飞至高空鸣叫，每次达数十分钟之久。鸣声宏亮，而有多种变化，颇婉转动听。当被惊扰，或由空中降落至地上时，头部立即显出短冠。地面觅食，行走颇速。食物主要为各种野生植物的种子，也以昆虫喂雏。巢营于地面凹陷处，由干草、细茎或前一年的植物叶子等造成。卵每产

3—5 枚，呈灰白色，而杂以褐色和暗灰色斑点，常密集于卵的钝端而成圈状。

分布 国内有五个亚种。本亚种繁殖于东北，迁徙时见于华北一带，冬达福建和广东北部。

经济意义 笼鸟中名贵者。



灰 砂 燕 燕科

Riparia riparia diluta (Sharpe et Wyatt)

(穴砂燕、沙岩燕、土燕[北名]、灰燕[南名])

量度：体长约130，嘴峰5.5，翼111，尾53，跗蹠约9毫米(♂)。

形态 雌雄相似。上体全部烟灰褐色，腰部较淡；两翼和尾的表面转暗褐；下体白，胸部具一灰褐色横带，胸侧和两胁亦稍缀以烟灰色；腋羽灰褐沾棕。


体形为燕类中的最小者。跗蹠后缘具有小簇短羽。尾短，几为方形，这是此鸟与其他燕类不同的特征。

眼暗褐；嘴黑；脚和趾暗褐。

生态 常集结成羣，低翔于水面，捕取飞虫为食。叫声“zee-zee——”或“zoc-zoc——”，音甚低微。在福建邵武，冬时营巢于河岸砂土的平置隧道中。所掘的隧道，长约一米左右，末端稍扩大，其间堆铺枯草、杂叶、残羽等，而成碟状的巢。卵纯白，每窝通常仅4枚。

分布 繁殖在我国北部，夏时见于长江流域。终年留居福建北部。

经济意义 吃虫有益。



家 燕 燕科

Hirundo rustica gutturalis Scopoli

(玄鳥、拙燕、越燕)

量度：体长约180，嘴峰8，翼111，尾94，跗蹠约10毫米(♂)。

形态 雌雄相似。前额深栗；上体余部包括

头侧以及两翼的内侧复羽和飞羽纯黑，而闪着金属蓝色；两翼余羽及尾羽概黑褐，而略带暗绿反光；所有尾羽除中央一对以外，其内翮均具白斑，展尾时并成‘V’状带纹。颈、喉及上胸栗色或赤栗色；下胸更有一曲折不整的蓝黑色横带，但时断时续，且常缀以栗色；胸以下纯白，或渲染浓淡不等的污黄或粉红色。

眼暗褐；嘴和两脚均黑。


生态 此鸟体态轻捷伶俐。两翼狭长，飞时呈镰刀状；尾分叉似剪刀。飞行捷速若矢，忽上忽下，时东时西。常结羣横飞田野空中，或在水面掠过。飞时张口，捕取蝇、蚊等飞虫为食。鸣声短促而尖锐，略似“zuic-zuic-zuic——”，或“zhu-zi, zhu-zi”。脚短弱，拙于步行。

巢以泥土混着稻草、根须等构成半碗状，营置于屋檐上或廊檐下，内铺以轻羽、软毛及细柔杂屑。卵每窝通常4—5枚，色白而略杂以淡紫色块斑，其上更散布有暗紫以至暗红褐色大小不同的斑点和条纹。

分布 每年春分前后，遍布我国境内大部分地区繁殖；至秋季间南旋至印度、南洋羣岛以至澳洲越冬，间有少数留居我国东南部。

此燕还有其他亚种，分别在我国东北及新疆等处繁殖。

经济意义 这是国内习见的一种吃虫鸟，值得大力保护。国内各地向来让家燕筑巢于房屋内，不加残害，并且还认为吉兆，虽属迷信，但却合乎保护益鸟的用意。



金腰燕 燕科

Hirundo daurica japonica Temminck et Schlegel

(赤腰燕、巧燕、花燕儿〔北名〕、紅腰家燕〔南名〕)

量度：体长约185，嘴峯7，翼112，尾102，跗蹠14毫米(♂)。

形态 雌雄相似。上体大都呈金属蓝黑色；后颈具栗色领环；腰部栗黄，形成寬闊的腰带，各羽微綴以黑色羽干紋。两翼除小、中复羽与背相同外，余与尾羽均黑褐色。眼先棕灰，羽端綴黑；耳羽暗棕色；白眼先上方有一栗色眉紋，直伸至頸側而与后颈同色的領环相接續。下体白色沾棕，滿杂以黑色羽干紋；这些纵紋在頰和喉等較粗而密，向后漸細而疏；尾下复羽的羽端为輝藍黑色。

体形似家燕，但稍大些。此燕腰部栗黄，非常明显夺目，易与家燕相区别。


眼暗褐；嘴黑；脚暗紅褐至黑褐色。

生态 与家燕相似，但大都栖息于山地村落間。飞行不似家燕之迅速，且常浮翔于高空中，較少在水面掠过。叫声較家燕稍响亮，很象“zuic-zuic-zuic——”，“zuic-wi-c——”，或“zuic-gū-gū-gū——”。食物全部为昆虫，以鞘翅目种类为最多，内包括金龟蚬、象蚬、沟叩头蚬、叶蚬等。

巢和家燕相同，也是混泥夹草所构成的，但为曲頸壺状，并具一壺嘴状的开口，内鋪以残羽、軟毛及其他輕柔物质，营于屋簷下或悬置于墙壁上。此鳥所营的巢，因較家燕更形精巧，故又名巧燕，而家燕則称为拙燕。卵每产4—5枚，純白。

分布 夏时在我国中部和东部繁殖；西部还見有其他亚种。至秋均南迁过冬。常与家燕同时南北往返迁徙。

经济意义 与家燕同。



树 鵲 鵲鵲科

Anthus hodgsoni yunnanensis Uchida et Kuroda

(大鵲、树鵲、麦如兰儿)

量度：体长175，嘴峯11，翼92，尾63，跗蹠20毫米(♂)。


形态 上体概褐綠色，头顶各羽具黑褐羽干紋，向后漸微。飞羽黑褐色，外翮具黄白色狭綠；复羽大都先端黄白，駢成二道翼斑；尾羽黑褐，各羽外緣褐綠；最外侧二对尾羽具大形楔状白斑；眉紋淡黄色；眼先微白，貫以暗褐眼紋；頰、頰、胸均污白色，胸上滿具黑斑；胸以下棕白色，两胁具黑色細紋。

眼褐紅色；嘴黑褐，下嘴較淡；脚浅肉色。

生态 栖息于杂木林緣或栽培地区。通常集羣活动。性机警，稍有惊动，即飞去；每当飞至树上时，即发出高声鳴叫。栖止时，尾上下摆动不已。常在地上奔馳覓食，也在树上捕捉昆虫。食物主要为各种昆虫和杂草种子；所吃的昆虫包括蝗虫、螞蟥、金龟蚬、金針虫、蝇类等。巢营于林緣地面或灌木丛間，以叶、茎、草穗、苔蘚、兽毛等所成。卵每产3—5枚，呈淡蓝灰色，密布以淡褐和暗灰色斑点。

分布 繁殖于东北，迁徙经过华北和华中，至华南各地越冬。另一亚种見于甘肃、四川和云南。

经济意义 嗜吃害虫和杂草种子，对农林有益处。




水 鵲 鵲鵲科

Anthus spinoletta blakistoni Swinhoe

(冰 鵲)

量度：体长 175，嘴峯 13，翼 90，尾 70，跗蹠 23 毫米(♂)。

形态 上体概淡沙褐色，头顶和背均有黑褐色纵纹，背上褐纹较粗；两翼和尾大都黑褐色，羽



缘灰褐以至乳白色，最外侧二对尾羽均具楔形白斑。眉纹宽，呈乳白色。下体概乳白色；胸部染以酒红色，并散有黑褐色斑点；两肋微杂以褐色纵纹。

眼暗褐色；嘴、脚和趾深褐至黑色。

生态 喜栖于平原沼泽或河川岸旁的草地或耕地间。性不畏寒，也见于冰冻溪流傍岸。常结小群或单独活动，而不集成大群。地上奔驰颇速；但也见在树上栖止。食物主要为各种杂草种子和昆虫，也有些蠕虫。营巢于地面陷凹中，或匿置于苔藓下方，或稀疏的草丛中。巢由草茎、根须等造成杯状，内垫以兽毛。卵灰白，密杂以灰、淡红和紫褐色斑点。

分布 在新疆、青海、甘肃一带繁殖；冬迁华北、长江中下游、福建等地。另一亚种在苏联西伯利亚东部繁殖，迁徙遍及我国东部。

经济意义 啄食杂草种子和昆虫，很有益处。


田 鵲 鵲鵲科

Anthus richardi richardi Vieillot

(大 花 鵲)

量度：体长 192，嘴峯 13，翼 92，尾 76，跗蹠 30 毫米(♂)。

形态 上体黄褐色，有黑褐色纵纹，至腰和尾上复羽转灰褐色，斑纹不显；两翼与尾均黑褐，羽缘黄褐以至乳白色；最外侧一对尾羽几白色，次一对具楔形白斑。眉纹棕白；颊、耳羽和颞纹均暗褐



色；胸和两肋黄褐，胸有零星黑褐斑点；下体余部乳白色。

眼褐色；嘴褐色，下嘴较淡；腿和脚淡褐色。

生态 栖息于沼泽化的草原或牧场地带，有时也在杂木林中。集群在地上奔驰觅食。常见与云雀混杂在一起。飞翔时一上一下，呈波浪形。鸣声似“chi, chi, chee, chee”，后三音急骤下降。食物主要为蝗虫、鳞翅目昆虫等。巢营于地面草丛间，由干草、苔藓等所成，内垫以软草、兽毛等。卵每窝产 3—5 枚，一般呈绿灰乃至污白色，密布以褐色斑点。

分布 几遍全国，计有四个亚种。本亚种繁殖于内蒙古、东北及华北，冬迁华南一带。

经济意义 为蝗虫等害虫的天敌，对农有益。

山 鵲 鴿 鵲鴿科

Dendronanthus indicus (Gmelin)

(树鵲鴿、刮刮油)

量度：体长 160，嘴峯 12，翼 77，尾 68，跗蹠 21 毫米(♂)。

形态 上体大都橄欖綠色，尾上复羽轉为污褐；眉紋淡黃；其下有一条褐色穿眼紋。两翼大都黑褐色，大、中复羽先端均黃白色，外侧飞羽的外羽基部及内侧飞羽的外羽中部还横貫以黃白色斑，因而形成翼上的四道黃白色横斑。尾羽亦黑褐，最外侧二枚殆白色，次一对具楔形白斑。下体概白，胸有二道黑色横斑，两胁微呈綠灰色。


眼深褐色；嘴黑褐，下喙肉紅；脚肉色。

生态 喜栖息于山区闊叶林中。动作敏捷，常沿树枝馳走。栖止时，尾不断左右搖摆，身体也微随摆动。飞时翅呈波状，并发出似拉鋸的鳴叫声。食物純为动物性，有各种昆虫(及其幼虫)和蜘蛛等。巢营于树上的水平枝桠間，呈杯状，以草茎、枯叶、羽毛等筑成。卵每产 4—5 枚，呈灰綠色，而杂以疏緩褐点的紫灰色斑。

分布 繁殖于东北、河北和华中各省，迁徙时

曾見于华南一带。

經濟意义 消灭大量森林害虫有益。



白 鵲 鴿 鵲鴿科

Motacilla alba leucopsis Gould

(白鵲儿、瀕鵲)

量度：体长 178，嘴峯 14，翼 84，尾 86，跗蹠 22 毫米(♂)。

形态 上体除額、头頂前部、头侧和頸侧为白色外，概黑色；翅上的小复羽黑；中复羽和大复羽大部为白色，形成翼上白斑；飞羽黑褐，外緣以白色狭边；尾羽黑色，羽緣白；最外侧二对大都白色。下体白色；胸部有一半圓形黑斑；两胁沾灰色。

雌鳥上体黑色較淡，且杂以灰色；翼上白斑不显。

眼黑褐；嘴和脚黑色。

生态 見于山区小溪流、平原湖泊、沼泽或海岸等地。三五成羣活动。鳴声响亮，音似“育令”，边鳴边飞。飞翔頗速，呈长弧状的波浪式。食物純为昆虫及其幼虫，包括甲虫、蝇类、松毛虫等。

营巢于距水不远的地上、牆壁中或茅屋脊下。巢頗大而較坚固，呈杯状，由草茎、叶子、細根等所成。卵每窝 4—5 枚，一般呈灰白色，密布以淡灰乃至黑褐色斑紋。

分布 白鵲鴿在国内有 8—9 个亚种，見于全国各地；本亚种遍布我国东部及中部。

經濟意义 吃害虫有益，与其他鵲鴿同。




黄腹灰鶺鴒 鶺鴒科

Motacilla cinerea melanope Pallas

(灰鶺鴒、黄鶺)

量度：体长 177，嘴峰 12，翼 79，尾 87，跗蹠 19 毫米(♂)。

形态 上体自额至下背深灰褐色，至腰及尾上复羽转为黄绿色。两翼大都黑褐色，三级飞羽具黄白色边缘；几乎所有飞羽基部白色，形成横斑状。尾羽黑褐色，羽缘沾绿；最外侧一对尾羽纯白，次二对大部分白色。眉纹和颊纹均白；颊和耳



羽灰褐；颊、喉和上胸均黑，各羽有白缘；其余下体均黄色。

雌鸟的颊、喉和前胸转为白色；下体黄色亦不如雄鸟鲜亮。

眼褐色；嘴黑褐色，基部稍淡；脚角色。

生态 生活于山区溪流地区，冬季降至平原。常沿水边活动。飞行呈波浪式；栖止时，尾不断上下摆动。又喜栖止于水中石上，注视昆虫飞来或水中动物游动，即急趋捕之。食物主要为昆虫及其幼虫，如蝗虫、蝇、松毛虫等。6 月营巢于岸旁石隙中。巢由细草茎、细根、枯叶、树皮等筑成。卵每产 4—5 枚，呈灰白色，而具淡灰乃至紫褐色斑点。亲鸟护雏性强。

分布 繁殖于东北，迁徙时遍布全国。

经济意义 吃虫有益，与其他鶺鴒同。


黄鶺鴒 鶺鴒科

Motacilla flava simillima Hartert

(黄马莲花、黄鹪儿)

量度：体长 174，嘴峰 14，翼 76，尾 70，跗蹠 24 毫米(♂)。

形态 额、头顶及后颈均淡蓝灰色，上体全部橄榄绿色，腰部沾黄；较长的尾上复羽黑褐，羽缘黄绿；两翼大都黑褐色，羽缘和先端均黄白色，



在复羽处形成二道翼斑；尾羽浓黑，镶以黄绿色窄边；最外侧二对几全白色。眉纹细长，呈白色；眼先近黑；耳羽铅灰。下体概鲜黄色。

眼褐色；嘴铅黑色，下嘴基部黄色；脚暗褐色。

生态 生活于沼泽化潮湿草甸及河畔、溪边的草地。飞翔时呈断续不规则的波浪形，边飞边鸣。栖止在水边石上或地上时，尾羽上下摆动。食物主要为水边昆虫及其幼虫，如蝇、蚊、小甲虫等。繁殖不在国内。营巢靠近水边不远的地上或石隙中。卵呈黄白色，并杂以灰褐色斑纹。

分布 国内共有七个亚种；本亚种迁徙时，飞越我国东部。

经济意义 啄食大量水滨昆虫有益。

暗灰鵲鵒 山椒鳥科

Coracina melaschistos intermedia (Hume)

(黑翅山椒鳥、平尾龙眼燕[南名])

量度：体长约240，嘴峯17.5，翼123，尾124，跗蹠22毫米(♂)。

形态 上体暗蓝灰，腰和尾上复羽稍淡；眼先黑色；两翼除小复羽綴以灰色外，概黑而有綠色金屬反光；尾羽亦然，外側尾羽均具白端。下体羽色与背相似，向后轉灰白。


雌鳥相似，但灰色較淡。

眼淡黃；嘴和脚、趾等均黑。

生态 栖息于山地树林間，大多活动于高大的树冠上，絕不落到地面上。嗜吃毛虫，故亦可称为毛虫鵲。在湖南林区，曾发现它們啄吃松林的毁灭性害虫——松毛虫及其虫卵。性静寂，罕听到它的叫声。巢用枯草、松針、地衣等构成浅杯状，外敷以苔蘚、蛛絲等，置于乔木近巔頂处的水平树枝上。卵每产3—4枚，呈蓝白色，而滿布以褐色和灰色粗斑和纵紋。

分布 夏时遍布于我国中部和东部。此鳥还有他亚种，分布于我国西南部及海南島。

經濟意义 啄吃毛虫，对林有益。



小灰山椒鳥 山椒鳥科

Pericrocotus roseus cantonensis Swinhoe

(小灰十字鳥、小树白面鳥[以上南名])

量度：体长约185，嘴峯12，翼87，尾96，跗蹠15毫米(♂)。

形态 前額、头頂前部、頰和耳羽下部純白；眼先黑；头頂后部以至后頸，及耳羽上部均暗灰；上背和两肩灰褐；下背至尾上复羽灰砂褐色。两翼几純黑褐；三級飞羽較淡；初級和次級飞羽大部于近羽基处具一白斑，連綴以成一道横斑，飞时尤显。中央尾羽黑褐；外側尾羽黑而端白。下体白，胸和两胁沾灰褐色。

雌鳥的头頂前部亦为暗灰，但稍綴白；翅上白斑渲染黃色；余部与雄鳥相似。


眼黑褐；嘴及脚、趾等均黑。

生态 多結羣活动。鳴声似“zii-li-ih——”或“zii-zi-ih”；常边飞边叫，繼續不断。食物主要为昆虫，包括金龟蚬、蜂象、鳞翅目昆虫等，亦兼吃草籽、果实等。巢以草根、树皮、纖維等織成杯状，外敷以地衣，絡以蛛网，而置于高大树木的直立枝叉中，或在横枝上。卵每窠通常4枚，呈灰白色，

而具有浅紫以至暗紅褐色形状不一浓淡不同的杂斑，且大都凑集于卵的鈍端。

分布 夏时遍布于我国南部和东南部一带。在我国西南部还見有典型亚种，即一般称为粉紅山椒鳥的。

經濟意义 是一种主要的吃虫鳥，对农林业生产有益。




灰山椒鳥 山椒鳥科

Pericrocotus divaricatus (Raffles)

(冥灰燕儿[北名]、灰十字鳥、大树白面鳥[以上南名])

量度：体长约 195，嘴峯 12，翼 94，尾 97，跗蹠 14 毫米(♂)。

形态 前額和头頂前部純白；头頂后部以至后頸，眼先以及耳羽上部均黑；上体余部石板灰色；两翼除內側复羽与背同色外，大部黑褐，飞羽近羽基处横貫以一道白色斜带；中央二对尾羽亦黑褐，外側尾羽黑而端白；下体白，胸側和两肋淡



灰。

雌鳥上体几純灰色；两翼与尾的黑褐色較淡而沾灰；翅上白斑带黃。余羽与雄鳥同。

此鳥腰部与背同为灰色；不似小灰山椒鳥的腰部呈灰砂褐色，而与背部不同。

眼暗褐；嘴和脚、趾等均黑。

生态 常栖于园林、丛树等处。习性与小灰山椒鳥相似，鳴声亦同，迁徙也几同时；不过此鳥体形較大，雄者头頂前白后黑，这些特征均有别于小灰山椒鳥。食物全部为昆虫，包括蜂象、金龟蚬及其他害虫等。巢亦与小灰山椒鳥相似，但主要由苔蘚、地衣等所成，营置乔木嶺处細枝上。卵灰白，而杂以淡紫色块斑，其上更綴以黃褐色細点。

分布 繁殖在我国东北及日本；迁徙时遍布我国东部。

此鳥有人依其形态特征，把它列为 *P. roseus* 的一亚种；但它的繁殖范围却与 *P. roseus* 的其他各亚种(如前述的 *P. r. cantonensis* 等)遙相隔离，故暫仍另立为一种。


經濟意义 与小灰山椒鳥同。

赤紅山椒鳥 山椒鳥科

Pericrocotus flammeus fohkiensis Buturlin

(紅十字鳥[南名])

量度：体长约 210，嘴峯 15，翼 100，尾 112，跗蹠 17 毫米(♂)。



形态 头的全部、后頸及上背呈輝藍黑色；下背、腰、尾上复羽及下体自胸以下概鮮紅色。两翼大都黑褐，但飞羽基部和复羽端部却貫以一道鮮紅色闊斑；最內側飞羽的近端处更具鮮紅色点斑。中央尾羽与上背略同；外側尾羽鮮紅，羽基黑色。

雌鳥前額橙黃；头頂至上背灰色；下背至尾上复羽黃綠。两翼和尾与雄鳥同，但紅色部分均轉为檸檬黃色。下体几純为沾綠的黃色。

眼暗褐；嘴、脚等均黑。

生态 栖于丘陵地或平原，大多集羣活动于树冠上，雌雄紅黃互相輝映，显得非常美丽夺目。食物全部为昆虫，如金龟蚬、蜂象、蟬、鳞翅目昆虫及其幼虫等。覓食在树上的枝叶間，亦在空中捕吃飞虫。叫声似“spe-et—”，低微而带颤音。巢呈杯状，由細草、須根、松針等所成，置于高树的枝叉中或細枝上。卵每窝 2—3 枚，呈浅綠色，而具淡藍以至黑褐色細点和粗斑。

分布 終年留居于我国南部，西抵广西。另有一亚种(*P. f. elegans*)，获見于云南及海南島。

經濟意义 它主要吃虫，在广西南部 and 海南島数量相当多，对森林害虫起了一定的天敌作用。它的羽色优美，还可适度地利用为观赏鳥。