

农村常见疾病 草药治疗手册



农村常见疾病草药治疗手册

成都市中醫學會 編

四川人民出版社

1966·成都

农村常见疾病草药治疗手册

成都市中医学会编

四川人民出版社出版(成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 $\frac{1}{50}$ 印张 $1\frac{7}{25}$ 字数 32 千

1966年1月第一版 1966年1月第一次印刷

印数: 1—150,000

统一书号: T 14118 • 58 定价: 0.07 元

前　　言

草药是祖国医药遗产的一个重要的组成部分。我国劳动人民在长期和疾病作斗争中，积累了使用草药的丰富经验。许多草药都具有疗效高、使用简便和价格低廉的特点。

目前，各地城市医院、医学院校、卫生和医药研究等部门，积极地响应了党的号召，正把医药卫生工作的重点转向农村，为广大农民服务。我省草药资源丰富，有计划、有步骤地把整理出来的草药推广到农村，帮助农民治病，为广大贫下中农服务，对保护农村劳动力，促进农业生产新高潮，具有重要的意义。为了更好地贯彻党的卫生工作必须面向农村的方针，我会在今年夏季曾召集了会员中有临床经验的草药医生座谈研究，针对农村中容易发生的感冒、哮喘、气管炎、关节痛、风湿、痢疾、蛔虫、小儿百日咳等二十一一种疾病，提出了可以作为预防和治疗用的草药一百一十九种，拟定了草药药方四十三个，编成了这本《农村常见疾病草药治疗手册》，供农村巡回医疗人员、半医半农卫生人员，以及县、区、乡医务人员参考。

书中介绍的草药，都是在四川农村中一般能够找到的，使用既方便，治病又及时。为了解决草药名称

不統一和有的草藥識別比較困難的問題，书中尽可能采用了农村习用、农民熟悉的草药名字，并注明别名、产地及形态特征，同时附有插图。有部分草药因产地、季节的限制，不易配齐，在药方内就多列了几种草药，便于农民使用时即使少一两味，也可以找到别的草药来代替。对草药煎熬、服用方法，也根据农村的条件作了介绍，一般是：一剂药是两天量，共熬两次，每熬一次分三次服；附方后面未作具体说明的，也可参照这个办法来处理。至于用量，是照顾农村习惯，以新采的鲜药为准，用十六进位秤来计算的；若用晒干了的药，可以根据患者年龄、病情轻重以及药物的干湿度酌量减少二分之一或三分之二。

我們編寫這本書，還是一個初步的嘗試，加以編寫時間仓促，所列病种还不夠周到，收集的药方还不夠完善，希望讀者多給我們提出意見，以便續編時改進。

成都市中医学会

1965年9月

目 录

第一部分 草药

一、解表药

- | | | |
|----|-----|---|
| 1. | 水薄荷 | 1 |
| 2. | 水荆芥 | 1 |
| 3. | 紫苏 | 1 |
| 4. | 六月寒 | 2 |
| 5. | 风寒草 | 2 |
| 6. | 黄荆树 | 2 |

二、清热解毒药

- | | | |
|-----|-----|---|
| 7. | 青蒿 | 3 |
| 8. | 芦竹根 | 3 |
| 9. | 野菊花 | 3 |
| 10. | 地地菜 | 4 |
| 11. | 水葋根 | 4 |
| 12. | 桑叶 | 5 |
| 13. | 鸡苦胆 | 5 |
| 14. | 猪鼻孔 | 5 |
| 15. | 馬齒莧 | 5 |
| 16. | 水黃連 | 6 |
| 17. | 白头翁 | 6 |
| 18. | 水案板 | 6 |
| 19. | 紅藤 | 7 |
| 20. | 敗醬草 | 7 |

- | | | |
|-----|------|----|
| 21. | 紫花地丁 | 8 |
| 22. | 銀花藤 | 8 |
| 23. | 灯籠花 | 8 |
| 24. | 花斑竹 | 9 |
| 25. | 苦藠头 | 9 |
| 26. | 干油菜 | 10 |
| 27. | 鐸头草 | 10 |
| 28. | 五爪龙 | 10 |
| 29. | 蛇倒退 | 11 |
| 30. | 夏枯草 | 11 |
| 31. | 皂角寄生 | 12 |
| 32. | 席草根 | 12 |
| 33. | 油葱 | 12 |
| 34. | 仙人掌 | 12 |
| 35. | 狗地芽根 | 13 |
| 36. | 馬蹄草 | 13 |
| 37. | 酸酸草 | 13 |
| 38. | 鸡冠花 | 14 |
| 39. | 千里光 | 14 |
| 40. | 偷油婆 | 14 |
| 41. | 蜈蚣草 | 15 |
| 42. | 天泡草 | 15 |
| 43. | 地龙胆 | 15 |
| 44. | 眉毛笔 | 16 |

三、除湿利水藥

- 45. 水皂角.....16
- 46. 苦草根.....16
- 47. 尿珠根.....17
- 48. 金錢草.....17
- 49. 星宿草.....18
- 50. 車前草.....18
- 51. 辰砂草.....18
- 52. 夜合珍珠.....19
- 53. 辣蓼子.....19
- 54. 馬鞭梢.....20

四、滋補藥

- 55. 糯米草根.....20
- 56. 三白草.....21
- 57. 无花果.....21
- 58. 家蓼子花.....21
- 59. 娃娃拳.....22
- 60. 雞屎藤.....22
- 61. 四瓣草.....23
- 62. 腺脂花根.....23
- 63. 雞爪參.....23
- 64. 雞骨草.....24
- 65. 麥冬草.....24
- 66. 独足絲茅.....24
- 67. 凤尾花根.....25

五、收涩藥

- 68. 夜关门.....25
- 69. 木槿花根.....25

- 70. 毛足鷄.....26
- 71. 瓦片草.....26

六、理血藥

- 72. 鋸鉗藤.....26
- 73. 翻天印.....27
- 74. 紅牛膝.....27
- 75. 透骨消.....28
- 76. 刮金板.....28
- 77. 土三七.....29

七、驅虫藥

- 78. 苦棟皮.....29
- 79. 扁竹根.....29

八、止咳化痰藥

- 80. 三皮草.....30
- 81. 五皮草.....30
- 82. 竹林消.....31
- 83. 地白菜.....31
- 84. 青澤蘭.....31
- 85. 矮茶風.....32
- 86. 肺經草.....32
- 87. 青蛙草.....33
- 88. 兔耳風.....33
- 89. 楊棠花.....33
- 90. 生花生壳.....34
- 91. 冬青叶.....34
- 92. 荸麻根.....34
- 93. 猪鬃草.....35
- 94. 觀音草.....35

九、消导健脾藥	
95.	白花草根.....36
96.	刺梨根.....36
97.	蘿卜头.....36
98.	隔山櫑.....37
99.	泥鰍串.....37
100.	魚米.....38
101.	草鞋板.....38
102.	黃桷藤.....38
十、追风除湿藥	
103.	桑枝.....38
104.	野峨眉豆根.....39
105.	刺五甲.....39
106.	刺三甲.....39
十一、理氣藥	
114.	茴香根.....42
115.	野花椒根.....42
116.	石菖蒲.....43
117.	香附子.....43
118.	青藤香.....43
119.	香樟根.....44

第二部分 草药处方

1.	感冒方.....45
2.	咳嗽方.....46
3.	哮喘方.....47
4.	胃痛方.....47
5.	腹泻方.....48
6.	痢疾方.....49
7.	蛔虫病方.....49
8.	腸痛方.....50
9.	黃疸方.....50
10.	风湿性关节痛方.....51
11.	凝跌閃扭方.....51
12.	烫伤方.....52
13.	疔疮方.....52
14.	地瓜疮方.....53
15.	天泡疮方.....53
16.	火眼、紅肿眼、痒 痛眼方.....53
17.	牙痛方.....54
18.	痔疮方.....54
19.	带症方.....55
20.	小儿疳积方.....55
21.	湿疹搔痒方.....56

第一部分 草藥

一、解表藥

1. 水薄荷（別名：土薄荷）

性状：生在沟边阴湿地上，形似薄荷。性微温，味辛。全草供药用。

功能主治：清风热，发汗；治外感发烧、头痛。

用量：鲜的3—5钱。熬水内服。

2. 水荆芥

性状：生在沟边阴湿地上，叶象荆芥，较小，秋季开花。性微温，味辛。全草供药用。

功能主治：发表散寒，解暑；治外感恶寒发烧、头痛、目红肿痛。

用量：鲜的3—5钱。熬水内服。

3. 紫苏

性状：野生或栽培，草本，高4—5尺，有香气，叶卵形，有锯齿，绿色或背红紫色，秋季开淡红色花。性温，味辛。全草或根供药用。

功能主治：发散风寒，止咳；治外感风寒、咳嗽。

用量：鲜的4—6钱。熬水内服。

4. 六月寒（别名：散寒草、大风寒）

性状：荒地野生，草本，高1—2尺，叶小，卵形，有锯齿，夏季开淡紫色花。性温，味辛。全草供药用。

功能主治：散寒止咳，治风寒咳嗽及百日咳。

用量：鲜的5—8钱。熬水内服。

5. 风寒草（别名：红头绳、小风寒）

性状：生在沟边田边，蔓生草本，叶桃儿形，有毛，春夏开黄花。性温，味苦。全草供药用。

功能主治：散寒止咳，理气；治外感风寒、咳嗽、一身酸痛。

用量：鲜的6钱—1两。熬水内服。

6. 黄荆树

性状：低山、丘陵野生，木本，高3—5尺，枝上有毛，掌状复叶，夏季开淡紫色花，果实球形，深褐色。性温，味苦。枝、根、果实供药用。

功能主治：散寒，行气，止痛；治外感风寒、头痛身痛。熬水内服。

用量：鲜的5钱—1两。熬水内服。

二、清热解毒藥

7. 青蒿（別名：苦蒿、牛尿蒿）

性状：荒地野生，草本，高2—3尺，有香气，茎多分枝，叶片裂为线状。性寒，味苦辛。茎叶供药用。

功能主治：退热，清暑；治外感发烧及骨蒸虚热。

用量：鲜的6—8钱。熬水内服。

8. 蘆竹根（別名： 蘆竹笋、蘆毛竹根）

性状：生在溪边、屋旁潮湿处，叶长条形，根茎粗壮，有大小不等的笋子突起。性寒，味苦。根头及笋芽供药用。

功能主治：退热，生津，止呕；治外感风热及热伤津液。

用量：鲜的1—2两。熬水内服。



芦竹根

9. 野菊花（別名：黃花菜、野黃菊）

性状：杂草丛中野生，草本，茎上有毛，叶象菊

花較小，秋天开黃花，有香气。性微寒，味甘苦。全草供药用。

功能主治：清热解毒，治风热头痛、目赤及痈疮肿毒。

用量：鮮的1—2两。熬水內服。

10 地地菜（別名：薺菜、螞蟻草、雀雀草）

性状：生在荒地或耕地上，草本，叶上有不規則的鋸齒，春天开白色小花，果实倒三角形。性微寒，味甘苦。全草供药用。

功能主治：祛风退热，治风热头痛。

用量：鮮的1—3两。熬水內服。

11. 水葦根（別名：水蘆竹、水竹根）

性状：生在淺水中或潮湿的地方，草本，根莖粗壯有節，白色，斷面呈多數小孔狀，葉長條形，秋季开棕色花，呈毛帶狀。性寒，味甘苦。地下莖供药用。

功能主治：清热生津，治肺热咳嗽。

用量：鮮的1—2两。
熬水內服。



水葦根

12. 桑叶（別名：冬桑叶）

性状：栽培或野生，木本。性凉，味苦甘。叶供药用。

功能主治：清肺热，明目；治风热咳嗽、目赤痛。

用量：鲜的5钱—1两。熬水内服。

13. 鷄苦胆

性状：为鷄的苦胆、胆汁。性凉，味苦。

功能主治：清热；治百日咳。

用量：鲜的每日1—2个。熬水内服。

14. 猪鼻孔（別名：魚腥草、翻轉紅）

性状：生在田坎、沟边，草本，有特殊臭味，地下茎白色有节，叶心脏形，夏秋全开白花。性微寒，味苦辛。全草供药用。

功能主治：清热解毒；治痈肿、痢疾。

用量：鲜的1—2两。熬水内服。

15. 馬齒莧（別名：

五行草、九头

獅子草）

性状：生在菜园、路边，草本，茎叶均肥嫩多汁，匍匐地面生长，叶椭圆形，夏季开淡黄色小花。性寒，味酸。



全草供药用。

功能主治：清热解毒，消痈肿，治痢疾、痔疮。

用量：鲜的1—3两。熬水内服。

16. 水黄连（别名：黄脚鸡、金鸡脚 下黄）

性状：生在水沟边，草本，根黄色，茎带紫色，叶片有缺缺，夏季开淡黄色小花。性寒，味苦。叶或全草供药用。

功能主治：清热，解毒；治痢疾。

用量：鲜的5钱—1两。熬水内服。



水黄连

17. 白头翁

性状：荒地野生，草本，茎细，叶柳叶形，开白色花，高1—2尺。性温，味苦辛，有小毒。全草供药用。

功能主治：清热利湿；治痢疾。

用量：鲜的5钱—1两。熬水内服。

18. 水案板（别名：扎水板、檀木叶、 金梳子草）

性状：生在水田及池沼中，草本，根白色。叶有





水菜板

19. 紅藤

性状：生在低山、丘陵区，草本，藤本茎細弱，暗紅色，小叶3片，茎叶有毛，果实豆莢状。性平，微苦。茎叶供药用。

功能主治：清热，解毒，鎮痛；治腸痛。

用量：鮮的1—2两。熬水內服。

20. 敗醬草

性状：生在沟边阴湿地上，草本，高2—5尺，嫩枝有白毛，茎有雀斑点，叶椭圆形，边缘有锯齿，秋季开白花。性微寒，味苦。全草供药用。

功能主治：清热，解毒；治腸痛、疮症。



敗醬草

用量：鮮的1—2两。熬水內服。

21. 紫花地丁（別名：兰花地丁）

性状：杂草丛中野生，草本，高3—4寸，叶卵圆形，有細毛，春秋开蓝紫色花。性寒，味苦。全草供药用。

功能主治：清热解毒，消痛肿。

用量：鮮的5錢—1两。
熬水內服。



22. 銀花藤（別名：右轉藤、金銀花）

性状：野生或栽培一週繞藤本，嫩枝有毛，叶椭圆形，花两两成对，初时白色，后变黃色，故名金銀花，又名双花。性寒，微苦。藤叶供药用。

功能主治：清热解毒，治痛肿。

用量：鮮的1—2两。熬水內服。

23. 灯籠花（別名：黃花地丁、地丁草、蒲公英）

性状：生在田野路旁，草本，叶有大小不等的缺刻，春天开黃花，果实頂端有白色伞状毛，形如灯籠，全草含有白色乳汁。性寒，味苦。全草供药用。

功能主治：清热解毒，排脓消肿；治乳痈、疗毒。

用量：鲜的 1—2 两。熬水内服。



灯笼花

性状：生在山野沟边，高大粗壮草本，高 7—8 尺，根棕黄色，茎上有黄紫色斑点，卵形，秋季开绿白色小花。性微寒，味苦微酸，根供药用。

功能主治：清热解毒，治黄疸。

用量：鲜的 1—2 两。熬水内服。

25. 苦荳头（另名：苦荳菜、野南荳）

性状：生在草坡林边阴湿处，草本，高 2—4 尺，全株有白色柔毛，根呈疙瘩状，叶呈三角形，秋季开白色花。性微寒，味微苦。根叶供药用。

功能主治：清热解毒，消食健脾；散瘀癰，治头昏和狂犬病。

用量：鲜的 5 钱—2 两。
熬水内服。



苦荳头