

歷代中醫珍本集成

歷代中醫珍本集成

二四

歷代中醫珍本集成 (二四)

上海中醫學院中醫文獻研究所 主編

上海三聯書店出版

(上海紹興路5號)

新華書店上海發行所發行 上海市印刷七廠 分廠印刷

開本七八七×一〇九二 三十二開 印張 十

插頁五 印數五〇〇冊 字數 八六,〇〇〇

一九九〇年十二月第一版一九九〇年十二月第一次印刷

ISBN 7-261-03057-2·R·33 定價 平裝十三·七〇元
精裝十八·二〇元

出版說明

在中華文化遺產中，中醫藥學以其獨特的理論、深邃的思想、卓絕的療效和浩瀚的文獻，繼續爲人類的衛生保健事業作出積極的貢獻，受到海內外有識之士日益廣泛的矚目和重視。中醫藥學在數千年的發展歷史過程中，積累了豐富的醫療、養生等方面的實踐經驗，並隨着歷代醫家的著說而成爲留傳後世的典籍。因此，整理與研究這些醫學文獻，不僅具有史學價值，而且更具有實際應用價值。這種整理與研究工作，成爲當前繼承和發揚中醫學術的基本途徑之一。

爲了促進中醫學術的普及與提高，特約請上海中醫學院中醫文獻研究所主編盧代中醫珍本集成》，以滿足廣大中醫工作者的需求。本叢刊由上海中醫學院中醫文獻研究所朱邦賢副所長、中醫學院圖書館王若水副館長任總編審，並特聘著名中醫學家裘沛然教授、上海中醫學院院長陸德銘教授、上海中醫學院副院長嚴世芸副教授任選編顧問，

組織上海中醫學院專業人員承擔校勘工作。

中醫古籍僅現存者已逾萬種，本叢刊輯選具有相當學術價值和臨床實用價值的歷代古籍，包括自北齊以來歷代中醫典籍之精粹百餘種，分爲醫經、傷寒、本草、醫方、診斷、通論、養生、內科、外科、兒科、婦科、針灸、眼科、醫案醫話等十四類，對其著者生平、著述內容、學術特色等方面予以校正考定，分裝爲四十冊。所有典籍經專業人員勘正錯訛，採用影印方式出版，既保存和反映了中醫古籍的原貌，又能便利讀者正確閱讀和理解古代醫籍的旨趣，各醫籍前載有「內容提要」，以梗概地介紹撰著者生平、著述情況及內容要點，並客觀公允地評價其學術特色，對從事中醫工作者有一定的參考價值。我們期待本叢刊的出版，能夠對普及中醫和促進中醫學術的發展，起到推進作用。

上海三聯書店

一九八九年十月

內容提要

《劉涓子鬼遺方》十卷。南北朝著名外科科學家劉涓子撰。約成書於元嘉十九年（公元四四二年）。後由南齊醫家龔慶宣重為編次審訂于永元元年（公元四九九年）。在後世輾轉傳抄過程中多有遺佚，今僅存宋版五卷本傳世。

本書為我國現存較早外科專著，以其托名「黃鬼父」所遺，故名《鬼遺方》。書中所論病證，包括癰疽瘡癤、濕疹癩癧、疥癬髮禿、諸癰及金創外傷等等，全面反映了兩晉南北朝以前外科學的主要成就。卷一總述癰疽病因、病證命名、預後及其鑒別診斷；卷二以後分列一百四十餘首外科內、外治處方，廣泛運用清熱解毒、活血化瘀、補益托裏以及灸法、薄貼法、針烙引流等治療方法。是書在理論上以《靈樞·癰疽》為宗旨，收錄前代醫家之經驗，並融合其平生治驗而成。書中對癰疽憑波動感辨別深部膿腫、強調早期治療及其病變不同階段、病發不同部位的處理原

則和方法，均有詳盡的論述；對金創外傷側重于止血、止痛、鎮靜、收斂、生肌等處置原則及方藥之論述等，均為當時極其突出的醫學成就，對後世中醫外科學發展有舉足輕重之影響。

茲據宋刻本及其他版本校正《叢書集成》本影刊。

《外科精義》二卷。元代著名外科學家齊德之撰著。約成書于元統三年（公元一二三五年）。

齊氏生卒年闕考，里籍未詳。曾任醫學博士，充御藥院外科太醫。元統三年，結合多年外科診療經驗，在纂集前代癰疽瘡瘍論治理論基礎上撰就是書。全書卷上總論外科診療證治大法，共載諸論三十五篇；卷下列述外科病治方一百四十餘首，并附載諸藥修合炮製及主療瘡腫法等。齊氏特別強調調瘡腫局部病變與全身狀態的關係，認為瘡瘍諸疾皆由陰陽不和、氣血凝滯所致。因此臨床診療必須脈證合參，稽察其全身症候，量其陰陽氣血之盛衰，內外合治，方能奏效。一般瘍醫多忽略脈診，

齊氏不僅開篇即列「論瘡腫診候人式法」，批評瘡科之流多有不診脈候、專攻治外的陋習，并以五六篇脈診專論詳述脈之名狀、所主證候及判斷其逆從之法等等，對後世外科病治走上辨證論治道路起有重大影響。在治療上，齊氏主張病有逆從，治有緩急，法有正權，方有奇偶，用有輕重，強調并倡導內治與外治相結合的原則。內治則開創內消及托裏之法，外治則總結砭鐮、貼煇、湯漬、針烙、灸療、追蝕等方法，從而使本書成爲十四世紀外科文獻中最具影響之代表作。

茲以《古今醫統正脈全書》本爲據，參照明文奎堂《東垣十書》本（卷十四、十五）等校正錯訛，并重爲之影刊。

朱 邦 賢

〔南北朝〕 劉涓子

〔南齊〕 龔慶宣

劉涓子鬼遺方

歷代中醫珍本集成

劉涓子鬼遺方

〔南北朝〕劉涓子 撰

〔南齊〕龔慶宣 編

外科精義

〔元〕齊德之 著

劉涓子鬼遺方卷第一 并序

南北朝 龔慶宣撰

昔劉涓子，晉末，於丹陽郊外，照射，忽見一物，高二丈許，射而中之，如雷電聲，若風雨，其夜不敢前追，詰旦率門徒子弟數人，尋蹤至山下，見一小兒提轡問何往，爲我主被劉涓子所射，取水洗瘡，而問小兒曰：主，人是誰人？云：黃父鬼，仍將小兒相隨還來，至門，聞搗藥之聲，比及遙見三人，一人開書，一人搗藥，一人臥爾，乃齊唱叫突，三人並走，遺一卷癰疽方，并藥一曰：時從宋武北征，有被瘡者，以藥塗之，卽愈，論者云：聖人所作，天必助之，以此天授武王也，於是用方爲治，千無一失，姊適余從叔祖，涓子寄姊書，具敘此事，并方一卷，方是丹陽白薄紙本寫，今手跡尙存，從家世能爲治方，秘而不傳，其孫道慶與余鄰居，情款異常，臨終見語，家有神方，兒子幼稚，苟非其人，道不虛行，尋卷診候，兼辨藥性，欲以相傳，屬余既好方術，受而不辭，自得此方，於今五載，所治皆愈，可謂天下神驗，劉氏昔寄方，故草寫，多無次第，今輒定其前後，族類相從，爲此一部，流布鄉曲，有識之士，幸以自防，齊永元元年，太歲己卯，五月五日，撰，道慶曰：王祖母劉氏有此鬼方一部，道慶祖考相承，謹按處治，萬無一失，舅祖涓子兄弟自寫，寫稱云：無紙，而用丹陽錄，永和十九年，資財不薄，豈復無紙，是以此別之耳。

宋永和十二年且去
宋氏蓋遺疑元嘉之說

黃父曰：夫言癰疽何以別之？岐伯答曰：榮衛稽留於經脈之中，久則血澀不行，血澀不行，則衛氣從之不

通。瘰癧不得行，火不止，熱勝，熱勝則肉腐爲膿，然不能陷腐，於骨髓不爲燥枯，五藏不爲傷，故曰癰。黃父曰：何爲疽？岐伯曰：熱氣浮盛，當其筋骨，良肉無餘，故曰疽。疽上皮肉以豎，上如牛領之皮，癰者薄以澤，背其候也。黃父曰：及如所說，未知癰疽之性名，發起處所，診候形狀，治與不治，死活之期，願一一聞之。岐伯曰：癰疽圖曰：

赤疽發額，不寫十餘日死，其五日可剌也。其膿亦多血，死，未有膿可治。人年二十五、三十一、六十、九十五者，在額不可見血，見血者死。

禽疽發如軫者數十數，其四日腫合，牽核痛，其狀若聲，十日可剌，其肉發身核寒，齒如噤，欲瘥如是者，十五日死。

疔疽發頂，若兩耳下，不寫十六日死，六日可剌，其色黑，見膿而癰者死不可治。人年十九、二十三、三十五、三十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九，百神在耳下，不可見血，見血者死。

丁疽發兩肩比起有所逐，惡結血流，內外榮衛不通，發爲丁疽，三日身腫痛甚，口噤如瘞狀，十一日可剌，不治二十日死。

蜂疽發背，起心輪，若連肩骨，二十日不治死，八日可剌，其色赤黑，膿見背者死不可治。人年一十八、

二十四、三十五、六十七、七十二、九十八者，百神在胃，不可見血，見血者死。

陰疽發背，若陰股，始發腰強，內不能自止，數飲不能多，五日堅痛，不治，三歲而死。

刺疽發起肺膈，不寫二十日死，其八日可刺，發而赤，其肉如椒子者，死不可治。人年十九、二十五、

二十九、三十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七，百神在背，不可見血，見血者

死。

脈疽發頸項，如痛身隨而熱，不欲動悄悄，或不能食，此有所大畏恐駭，而不精，上氣嗽，其發引耳不可以

腫，二十日可刺，不刺八十日死。

龍疽發背，起胃俞，若腎俞，二十日不寫死，九日可刺，不刺，其上赤下黑，若背潰黑死，發血膿者不死。

首疽發熱八十日，一方云八九日，大熱汗，頭引血盡，如噉，身熱同，同如沸者，皮頗腫，淺刺之，不刺，二十日

死。

榮疽發背，起若兩肘頭，二十五日不寫死，九日可刺，膿多赤白，而可治也。人年一歲、十六、二十六、

三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六，百神在骨，不可見血，見血即死。

行疽發如腫，或後合相從，往來不可，要其所在刺之，即愈。

勇疽發股，起太陰，若伏鼠，二十五日不寫死，其十日可刺，勇疽發膿青黑者死，白者尙可治，不可治，人年

十一、十五、二十、三十一、三十三、四十六、五十九、六十三、七十五、九十一、百神皆在尻尾不可見血見血者死。

標疽發背熱同耳聾後六十日腫如聚水其狀若如此者可刺之但出水後及有血出即除愈也不
可治人年五十七、六十五、七十三、八十一、九十七者百神在背不可見血見血者死。
癰疽發足跌若足下三十日不寫死其十二日可刺癰疽者白膿不太多其瘡上瘳赤黑者死不可治人
年十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三百神在足不可見血見血者死。

衝疽發小腸痛而振寒熱四日五日悄悄六日而變刺之五十日死。

軟疽發兩指頭若五指頭七八日不寫死其四日可刺其發而黑癰者不堪未過指節可治。
一方不呼爲軟疽是刺其明

蠱引爲

敗疽

疥疽發腋下若兩臂兩掌中振寒熱而噉乾者飲多即嘔心煩悄悄六十日而漸合者如此可有汗如無

汗者死。
一方云床虛則蠱亦引爲床發

筋疽皆發背兩邊大筋其色蒼八日可刺若有膿在肌腹中十日死。

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱而赤六十日可刺如刺無血三四日病愈。

搔疽發手足五指頭起節其色不變十日之內可刺過時不刺後爲蝕有癰在脈腋三歲死
叔疽發身腫牽核而身熱不可以行不可以屈伸成膿刺之以除
白疽發脾若肘後痒自痛傷乃身熱多汗五六處有者死心主癰疽在股脛六日死發膿血六十日死
黑疽發腫居背大骨上八日可刺過時不刺爲骨疽
骨疽膿出不可止壯熱碎骨六十日死脇少陽有癰腫在頸八日死發膿血者十日死
倉疽發身痒後痛此故傷寒氣入藏篇發爲倉疽九日可刺之不刺九十日死矣
腰太陽脈有腫交脈屬於陽明在頸十日死發膿血七十日死
尻太陽脈有腫癰在足心少陽八日死發膿血六十日死或八十日死
頭陽明脈有腫癰在尻六日死發膿血六十日死
股太陰有腫癰在足太陽十七日死發膿血百日死
脣太陽脈有腫癰在頸八日死發膿血百日死
足少陽脈有腫癰在脇八日死發膿血六百日死
手陽明脈有腫癰在腋淵一歲死發膿三歲死
黑疽發腋淵死

黑疽發耳中如米大此疽不治死。

黑疽發肩死。黑疽發缺盆中名曰伏疽不治死。

赤疽發於脾半夜可治出歲死。

黑疽發肘上下不死可治。

脾解除指本黑頭赤死。

黑疽發掌中不死可治。

赤疽發陰股軟可治堅死。

赤疽發肥腸死。

黑疽發腋腋軟可治堅不可治。

赤疽發掌中不可治。

黑疽發趺上堅死。

足下久腫癰色赤死。

癰高而光者不大熱用薄瘡其肉平平無異而紫色者不須治但以黃耆并淡竹葉湯申其氣耳。癰平而痛用八物黃耆湯。大癰七日小癰五日其自有堅強色診。事生破發背及發乳若熱手近不得者令人之

熱熱先服王不留行散。外散。外摩發背大黃膏。若背生破無善在乳者。熟之候。手按之。若隨手起。便是熱。針法要臆。看以意消息之。背不可過一寸。針良久不得膿。即以食肉膏散差。灸頭肉。瘻口中人體熱氣。歌服木瓜散。五日後膿欲差者。排膿內寒散。

凡破癰之後。病人便遲綿欲死。內寒熱。腫自有似癰而非者。當以手按腫上。無所運。是風毒耳。勿針。可服昇麻湯。外摩膏破癰口。當合流下三分。近一分針。唯令極熱。便不痛。破癰後敗壞不差者。作豬蹄湯洗之。日再下湯。二日故可用。瘡六七日。湯半劑。亦可用。胸中斷氣。斷氣者當入關中。以手按左眼視右眼。見光者胸中結癰。若不見光者。癰疽內發。針傷脈。血不出。住實不寫。留成癰。腎脈來者大。漸小陰結。若肌肉痺。癰痛爲發。寸口如此來大。如未漸小矣。

有黑色者。是石留黃毒。有赤色者。是丹砂毒。有青色者。是硃砂毒。有似鹽顆者。是鍾乳毒。有黃水者。是杏桃人毒。有白水者。是附子乾薑毒。有膿者。熱肉麤等毒。硃砂發。白雄鴨頂上血一合。已來。取黑鉛湯一茶椀。調服之。解。鍾乳發。雄雞肘上血一合。將鐵粉湯一茶椀。調服之。解。附子發。取附子皮三半。鼓半升。相和。以水一升煎。約一茶椀。服之。解。丹砂發。取黑鉛黃者。防風。伏龍肝各半兩。水一升。煎半茶椀。去滓。服之。解。