

国家临床医师  
资格考试丛书

FUCHANKEXUE XITIJI

方爱华 金志军 主编

# 妇产科学 习题集



安徽科学技术出版社

《国家临床医师资格考试丛书》

供临床医师、医学生用

# 妇产科学学习题集

主 编 方爱华 金志军

安徽科学技术出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

妇产科学习题集/方爱华,金志军主编. —合肥:安徽科学技术出版社,2000.10

(国家临床医师资格考试丛书)

ISBN 7-5337-0709-5

I. 妇… II. ①方… ③金… III. ①妇科学-医师-资格考核-习题②产科学-医师-资格考核-习题  
N. R7-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 71973 号

*NAWOT/04*

\*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 合肥义兴印刷厂印刷

\*

开本:787×1092 1/16 印张:7.75 字数:198千

2000年11月第1版 2000年11月1次印刷

印数:4 000

ISBN 7-5337-0709-5/R·133 定价:10.00元

(本书如有倒装、缺页等问题请向本社发行科调换)

《国家临床医师资格考试丛书》

编 委 会

总主审 蔡瑞宝

- |            |    |                  |
|------------|----|------------------|
| 《内科学习题集》   | 主编 | 蔡瑞宝 (第二军医大学长征医院) |
| 《外科学习题集》   | 主编 | 王来根 (第二军医大学长征医院) |
| 《妇产科学习题集》  | 主编 | 方爱华 (第二军医大学长征医院) |
|            |    | 金志军 (第二军医大学长征医院) |
| 《儿科学习题集》   | 主编 | 苏 渊 (第二军医大学长征医院) |
| 《影像诊断学习题集》 | 主编 | 王 俭 (第二军医大学长征医院) |

《国家临床医师资格考试丛书·妇产科学习题集》

编 委 会

主 编 方爱华

金志军

副主编 王 俭

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 俭 (第二军医大学长征医院)

方爱华 (第二军医大学长征医院)

金志军 (第二军医大学长征医院)

郭晓杰 (第二军医大学长征医院)

徐丛剑 (第二军医大学长征医院)

## 前 言

1999年11月21日,我国《执业医师法》确立了“国家实行医师资格考试制度”后举行的首次国家医师资格考试在全国31个考区结束。医师资格考试制度对规范我国医师资格,建设高素质的医师队伍,确保医疗安全,为人民健康、为社会主义现代化服务,具有划时代意义。

对于临床医师来说,最大限度地提高医疗质量,保障人民健康,经受医师资格考试的检验,无疑是必须的、必要的。然而,由于临床分科的缘故,临床医师对自己所涉及专科以外各科的基础理论、临床实践则相对薄弱;由于工作、生活的重担,他们没有更多的时间来重拾以往的课本,重新温习;医学教材不断修订充实,他们一时无法重新系统学习;教材中知识点的把握在资格考试中甚为重要,他们希望能在有限的时间及精力条件下,顺利通过考试,取得资格。基于以上考虑,我们组织解放军第二军医大学长征医院内科、外科、妇产科、儿科、影像科的富有教学、临床经验,并能准确领会与把握各学科教学大纲所要求的知识点,掌握各级临床医师参加考试所需题库的专家学者,编写了《国家临床医师资格考试丛书》,以便帮助临床医师在较短的时间内掌握要点,通过考试,取得执业资格。

目前,本丛书已进入出版运作阶段的有五种:即《内科学学习题集》、《外科学学习题集》、《妇产科学学习题集》、《儿科学学习题集》、《影像诊断学习题集》,以保证临床医师参加2000年资格考试之需,其他基础学科分册也将陆续推出。

本分册为《妇产科学学习题集》,以多选题为主要题型,按卫生部第四版规划教材章节顺序排列编写,由于时间仓促,疏忽或不足之处,诚盼读者指正。

方爱华

金志军

2000年6月8日

## 题型和解题说明

本书以多选题 A 型题为主要题型，即由一简短的文字叙述（称题干）及 5 个备选答案组成，其中只有一个最佳答案，其余四个均为干扰或迷惑答案。

(一) A<sub>1</sub> 型题 即肯定的单个最佳选择题，根据题干要求从 5 个备选答案中选择一个肯定意义的最佳答案。

例如：关于月经，下列哪项是正确的

- A. 月经是子宫内膜基层周期性脱落
- B. 月经正常为 2~3 天
- C. 月经期是指月经持续流血的天数
- D. 一次月经的出血量平均为 200ml
- E. 月经周期是指此次月经干净之日至下次月经干净之日

参考答案：C

(二) A<sub>2</sub> 型题 即否定的单个最佳选择题目，这种题目所设的 5 个备选答案中除一个外都是正确的。因此，回答此类题目时，特别注意选出最不适用、用得最少、或者在某方面是例外的一个否定备选答案。

例如：关于子宫，下列哪项是错误的

- A. 子宫重量约 50g
- B. 子宫的容积为 5~6ml
- C. 成人宫体与宫颈比例为 2:1
- D. 子宫位于骨盆中央呈倒置梨形
- E. 子宫峡部内膜与宫颈内膜相同

参考答案：E

(三) A<sub>3</sub> 型题 即病例组的 A 型题，以一个病人的临床情况为题干，然后从不同的角度提出多个相关问题，通常，一个病例组试题包括的问题不超过 3 个，试题可以是一个肯定的短语陈述句形式，也可是一个否定的陈述句形式，回答这些问题时，只需根据题干的资料去分析和选择答案。

例如：1. 一名 35 岁男子，右胸部刀刺伤后 1h 来院急诊，呼吸急促，面色苍白，四肢厥冷，烦躁不安，体检发现右侧第 4 肋间腋前线处长约 2cm 伤口，血压 12/9kPa，心率 120 次/分，进一步检查，患者外侧肺部呼吸音减弱，以及

- A. 气管由健侧移位，叩诊鼓音
- B. 伤侧胸壁反常呼吸运动
- C. 咯血，白沫痰，肺部湿啰音
- D. 脉细速，心音弱，静脉压高
- E. 脉细速，叩诊浊音，肋间隙饱满

2. 胸部 X 线摄片示右肺压缩 10%，右下胸腔有液平，先应采取何种确诊方法

- A. 开胸探查
- B. B 超检查
- C. 胸部 CT 检查
- D. 胸腔穿刺
- E. 气管镜检查

参考答案：1. E 2. D

## 目 录

第一章 女性生殖系统解剖	(1)
第二章 女性生殖系统生理	(7)
第三章 妊娠生理	(10)
第四章 妊娠诊断	(12)
第五章 孕期监护及保健	(15)
第六章 正常分娩	(18)
第七章 正常产褥	(22)
第八章 新生儿护理特点及其处理	(24)
第九章 妊娠病理	(27)
第十章 高危妊娠	(34)
第十一章 妊娠合并症	(36)
第十二章 异常分娩	(40)
第十三章 分娩期并发症	(46)
第十四章 异常产褥	(51)
第十五章 外阴白色病变及外阴瘙痒	(53)
第十六章 女性生殖系统炎症	(55)
第十七章 女性生殖系统肿瘤	(64)
第十八章 妊娠滋养细胞疾病	(75)
第十九章 月经失调	(80)
第二十章 子宫内膜异位症和子宫腺肌症	(87)
第二十一章 女性生殖器官发育异常	(92)
第二十二章 女性生殖器官损伤性疾病	(94)
第二十三章 不孕症	(98)
第二十四章 计划生育	(100)
第二十五章 妇女保健	(106)
第二十六章 妇产科影像学	(108)
参考答案	(112)



## 第一章 女性生殖系统解剖

### (一) A<sub>1</sub>型题

- 关于骨盆，下列哪项是正确的
  - 骨盆由骶骨、尾骨及左右两块髂骨构成
  - 骨盆轴为贯穿骨盆腔各平面中点的假想轴线
  - 骨盆腔是所有生殖器所在部位
  - 骨盆各关节活动度在妊娠期极度增大
  - 骶棘韧带构成骨盆出口的侧界
- 关于女性骨盆平面，下列哪项是正确的
  - 入口平面的前后径大于横径
  - 中骨盆平面的横径大于前后径
  - 骨盆最大平面的横径是坐骨棘间径
  - 中骨盆平面是骨盆最小平面
  - 出口平面是在同一平面的两个三角形构成的
- 正常骨盆倾斜度为
  - 45°
  - 50°
  - 55°
  - 60°
  - 70°
- 关于中心腱，下列哪项是正确的
  - 对盆腔脏器起着强大的支托作用
  - 中心腱位于肛提肌的深层
  - 是由三对肌肉和肛门外括约肌的肌腱会合而成的
  - 分娩时其极度受压，但不易撕裂
  - 以上均不对
- 关于会阴，下列哪项是正确的
  - 会阴体厚5~6cm
  - 其是从阴蒂到肛门之间的软组织
  - 其由外向内逐渐变宽
  - 分娩时，会阴伸展性极小，易撕裂
  - 由皮肤、筋膜、部分肛提肌及中心腱构成
- 关于肛提肌，下列哪项是正确的
  - 其是构成盆膈的主要成分
  - 其是骨盆底最大的一对肌肉
  - 是封闭骨盆出口的前三角部位
  - 由耻骨降支和盆壁两侧起，止于正中线
  - 呈梨形
- 我国妇女以哪种骨盆类型最常见
  - 妇女型
  - 男子型
  - 扁平型
  - 混合型
  - 类人猿型
- 骨盆轴的方向，下列哪项是正确的
  - 上段向下向前，中段向下，下段向下向后

- B. 上段向下向后, 中段向下, 下段向下向后  
C. 上段向下向前, 中段向下, 下段向下向前  
D. 上段向下向后, 中段向下, 下段向下向前  
E. 上段向下向后, 中段向下, 下段向上向前
9. 关于女性外生殖器, 下列哪项是正确的  
A. 会阴体厚 1~2cm  
B. 女性外生殖器即外阴  
C. 小阴唇是一对纵行隆起的粘膜皱襞  
D. 前庭大腺开口于尿道两侧  
E. 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区
10. 子宫最狭窄的部分为  
A. 组织学内口  
B. 解剖学内口  
C. 子宫颈管  
D. 子宫峡部  
E. 子宫外口
11. 维持子宫的正常位置, 下列哪项是正确的  
A. 腹腔压力作用  
B. 子宫四对韧带的作用  
C. 子宫四对韧带及盆底肌肉, 筋膜的支托作用  
D. 盆底肌肉及其上下筋膜作用  
E. 膀胱和直肠的支托作用
12. 下列哪项说法是正确的  
A. 阴道前壁长、后壁短  
B. 子宫颈表面全部由阴道壁包绕  
C. 阴道粘膜有许多纵行皱襞, 使其有较大伸缩性  
D. 阴道壁由粘膜、平滑肌及纤维组成  
E. 阴道前穹隆的顶端为子宫直肠陷凹的底部
13. 关于输卵管, 下列哪项是正确的  
A. 全长为 6~8cm  
B. 伞端有腹膜覆盖  
C. 平滑肌收缩时由近端向远端蠕动  
D. 内壁为复层柱状上皮  
E. 粘膜受性激素的影响有周期性变化
14. 左侧卵巢动脉可来自  
A. 左髂内动脉  
B. 左肾动脉  
C. 左髂外动脉  
D. 右髂外动脉  
E. 阴部内动脉
15. 卵巢动静脉经下列哪种韧带进卵巢门  
A. 主韧带  
B. 圆韧带  
C. 子宫骶骨韧带  
D. 骨盆漏斗韧带  
E. 卵巢固有韧带
16. 骨盆测量出口横径 $<8\text{cm}$ 时, 应进一步测量哪种径线  
A. 骶耻内径  
B. 骶耻外径  
C. 出口前矢状径  
D. 出口后矢状径  
E. 耻骨弓角度

17. 骶耻外径的距离为
- A. 耻骨联合至第5腰椎棘突  
B. 耻骨联合中点至髂后上棘连线中点  
C. 耻骨联合中点至米氏菱形窝上角  
D. 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝下角  
E. 耻骨联合上缘中点至第5腰椎棘突下
18. 会阴体的厚度为
- A. 1~2cm  
B. 2~3cm  
C. 3~4cm  
D. 4~5cm  
E. 5~6cm
19. 骨盆入口平面的形态为
- A. 横椭圆形  
B. 纵椭圆形  
C. 圆形  
D. 漏斗形  
E. 两个在不同平面的三角形
20. 中骨盆平面的形态为
- A. 圆形  
B. 横椭圆形  
C. 纵椭圆形  
D. 漏斗形  
E. 两个在不同平面的三角形
21. 骨盆出口平面的形态为
- A. 圆形  
B. 横椭圆形  
C. 纵椭圆形  
D. 漏斗形  
E. 两个在不同平面的三角形
22. 下列哪项为骨盆底最有力的肌肉
- A. 球海绵体肌  
B. 坐骨海绵体肌  
C. 会阴深横肌  
D. 肛门外括约肌  
E. 肛提肌
23. 关于成人阴道, 下列哪项是正确的
- A. 阴道上窄下宽  
B. 阴道前穹隆深, 后穹隆浅  
C. 阴道表面由单层柱状上皮覆盖  
D. 阴道内腺体可分泌少量粘液  
E. 阴道上端包缠子宫颈, 下接阴道前庭
24. 关于子宫颈, 下列哪项是正确的
- A. 主要由结缔组织构成  
B. 宫颈腺体可分泌少量酸性粘液  
C. 子宫骶韧带是固定宫颈的主要韧带  
D. 宫颈内口是宫颈癌的好发部位  
E. 宫颈管内膜上皮为复层鳞状上皮
25. 关于输卵管的结构, 下列哪项是正确的
- A. 内膜上皮为低柱状上皮, 有纤毛  
B. 由浆膜层、粘膜层及粘膜下层三层构成  
C. 平滑肌蠕动方向是自内向外  
D. 子宫角是管壁最厚的部位  
E. 峡部是管腔最狭窄的部位
26. 关于卵巢的结构, 下列哪项是正确的
- A. 位于阔韧带上方  
B. 成人卵巢大小约 7cm×5cm×3cm  
C. 是一对粉红色、球形器官  
D. 青春期开始从卵巢表面排卵  
E. 绝经后体积变小、变软

27. 关于女性生殖器的邻近器官, 下列哪项是正确的
- A. 子宫前邻近膀胱、尿道
  - B. 子宫和阴道均与直肠相邻
  - C. 输卵管在阔韧带底部与卵巢动脉交叉后在其下方穿行
  - D. 阑尾位置随妊娠子宫的增大而向上向内方向移位
  - E. 以上说法均不对
28. 维持子宫前倾位置的主要韧带为
- A. 主韧带
  - B. 阔韧带
  - C. 骨盆漏斗韧带
  - D. 子宫骶骨韧带
  - E. 圆韧带
29. 固定宫颈于正常位置的韧带为
- A. 主韧带
  - B. 阔韧带
  - C. 骨盆漏斗韧带
  - D. 子宫骶骨韧带
  - E. 圆韧带
30. 自输卵管伞端延伸至盆壁的韧带为
- A. 主韧带
  - B. 阔韧带
  - C. 子宫骶骨韧带
  - D. 骨盆漏斗韧带
  - E. 圆韧带
31. 关于子宫内膜功能层, 下列哪项正确
- A. 单层高柱状上皮
  - B. 靠近肌层的内膜
  - C. 表面 2/3 部分, 可发生周期性变化
  - D. 淡红色纤维组织
  - E. 内膜中无腺体
32. 下列哪项是正确的
- A. 坐骨切迹 < 2 指
  - B. 坐骨棘间径 9cm
  - C. 对角径 10~11cm
  - D. 入口平面前后径为 11cm
  - E. 前矢状径为 5cm
33. 卵巢囊肿蒂扭转时, 其蒂的组成为
- A. 骨盆漏斗韧带、输卵管、卵巢固有韧带、圆韧带
  - B. 骨盆漏斗韧带、输卵管、卵巢固有韧带
  - C. 骨盆漏斗韧带、输卵管、圆韧带
  - D. 骨盆漏斗韧带、卵巢固有韧带、圆韧带
  - E. 输卵管、卵巢固有韧带
34. 下列哪项为海绵体组织
- A. 阴蒂
  - B. 处女膜
  - C. 大阴唇
  - D. 小阴唇
  - E. 阴道前庭
35. 下列哪项为粘膜组织
- A. 阴阜
  - B. 阴道前庭
  - C. 大阴唇
  - D. 小阴唇
  - E. 处女膜

(二) A<sub>2</sub> 型题

36. 关于阴道, 下列哪项是错误的
- A. 阴道后壁较前壁长  
B. 阴道位于骨盆下部中央  
C. 阴道上端较下端宽  
D. 阴道与宫颈外口连接处称穹隆  
E. 阴道为复层鳞状上皮所覆盖, 无腺体
37. 关于女性生殖器, 下列哪项是错误的
- A. 宫颈管粘膜上皮是高柱状上皮, 有腺体  
B. 阴道上皮为复层鳞状上皮覆盖, 无腺体  
C. 输卵管粘膜为单层高柱状上皮, 有纤毛  
D. 子宫内膜分功能层与基底层  
E. 卵巢的外膜为腹膜
38. 关于子宫, 下列哪项是错误的
- A. 子宫重量约 50g  
B. 子宫的容积为 5~6ml  
C. 成人宫体与宫颈比例为 2:1  
D. 子宫位于骨盆中央呈倒置梨形  
E. 子宫峡部内膜与宫颈内膜相同
39. 关于子宫, 下列哪项是错误的
- A. 长约 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm  
B. 峡部下界为解剖学内口, 上界为组织学内口  
C. 子宫内膜分为基底层和功能层  
D. 子宫前面腹膜覆盖膀胱形成膀胱子宫凹陷返折  
E. 子宫后面腹膜向下再折向直肠形成子宫直肠陷凹
40. 关于淋巴引流, 下列哪项是错误的
- A. 内生殖器淋巴分髂淋巴、腰淋巴和骶前淋巴组  
B. 阴道下段淋巴主要入腹股沟淋巴结  
C. 子宫体与底部及输卵管、卵巢淋巴均入腰淋巴结  
D. 外阴部淋巴引流交叉过中线  
E. 阴蒂部的淋巴引流入腹股沟淋巴结
41. 下列哪项是错误的
- A. 正常成人子宫体与宫颈比例是 2:1  
B. 卵巢动脉自髂内动脉分出  
C. 子宫颈的淋巴入闭孔及髂内外淋巴结  
D. 输尿管在距宫颈内口水平 2cm 处与子宫动脉交叉  
E. 外生殖器主要由阴部神经支配, 内生殖器则由植物神经支配
42. 关于骨盆, 下列哪项是错误的
- A. 骨盆分真、假骨盆两部分  
B. 真骨盆对分娩有直接影响  
C. 骨盆髂骨由髌骨、尾骨和耻骨融合而成  
D. 从耻骨联合上缘两侧髂耻线到骶岬上缘的连线是真假骨盆的分界线  
E. 骨盆入口平面横径较出口平面横径长
43. 关于骨盆出口平面, 下列哪项是错误的

- A. 由两个在不同平面的三角形构成
  - B. 前界为耻骨联合下缘
  - C. 后界为骶尾关节
  - D. 两侧为耻骨降支、骶棘韧带和坐骨棘
  - E. 前后两个三角形具有共同的底边
44. 关于子宫, 下列哪项是错误的
- A. 其表面为腹膜覆盖
  - B. 其内腔呈下宽上窄的三角形
  - C. 子宫体是子宫上部较宽的部分
  - D. 中层为肌层, 是体壁最厚的一层
  - E. 平滑肌纵横交错
45. 关于外阴, 下列哪项是错误的
- A. 阴蒂富于神经末梢
  - B. 尿道口位于阴蒂与阴道口之间
  - C. 大阴唇局部受伤后易形成血肿
  - D. 前庭大腺是尿道口两旁的腺体
  - E. 两侧小阴唇之间的区域为阴道前庭

## 第二章 女性生殖系统生理

### (一) A<sub>1</sub>型题

- 关于月经,下列哪项是正确的
  - 月经是子宫内膜基底层周期性脱落
  - 月经周期是指此次月经干净之日至下次月经干净之日
  - 月经期是指月经持续流血的天数
  - 月经正常为2~3天
  - 一次月经的出血量平均为200ml
- 下列哪项是正确的
  - 月经来潮时基础体温可升高0.3~0.5℃
  - 排卵一般发生于月经来潮前14天
  - 月经来潮时子宫内膜自基底层剥脱
  - 排卵以后的卵泡叫闭锁卵泡
  - 正常月经第5天子宫内膜为分泌期
- 月经后子宫内膜的再生起源于
  - 子宫肌层
  - 子宫致密层
  - 子宫基底层
  - 子宫海绵层
  - 子宫功能层
- 关于妇女一生,下列哪项正确
  - 月经初潮标志卵巢功能成熟
  - 第二性征的出现,标志青春期开始
  - 幼童期其体格与内外生殖器同时发育
  - 更年期是妇女由生育期进入老年期的一个过渡时期
  - 绝经期为月经失调、排卵渐减少的时期
- 正常月经周期第10天,子宫内膜处于
  - 增生期
  - 分泌期
  - 月经期
  - 月经前期
  - 月经后期
- 下列哪项属雌激素作用
  - 对垂体只产生正反馈调节
  - 使子宫颈粘液分泌增多而稀薄
  - 使阴道上皮角化现象消失
  - 促进水钠排泄
  - 抑制输卵管蠕动
- 下列哪项属孕激素作用
  - 对垂体有正反馈作用
  - 使乳腺管发育
  - 使子宫内膜呈增生期改变
  - 使排卵后体温降低0.3~0.5℃
  - 降低子宫对催产素的敏感性

8. 雌激素、孕激素浓度均降低结果是
- A. 使子宫内膜呈增生期改变  
B. 使子宫内膜坏死、脱落  
C. 致成熟卵泡排出卵子  
D. 致黄体发育成熟  
E. 致黄体开始萎缩
9. 下列哪项属雌、孕激素的协同作用
- A. 宫颈粘液的变化  
B. 输卵管蠕动强度  
C. 阴道上皮细胞角化现象的变化  
D. 乳腺的发育  
E. 子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
10. 血中 FSH 含量最高的时期为
- A. 新生儿期  
B. 青春期  
C. 性成熟期  
D. 绝经后 3 年  
E. 老年期
11. 关于排卵, 下列哪项是正确的
- A. 自青春期开始就有周期性排卵  
B. 排卵有赖于大量的黄体生成素的作用  
C. 排卵均发生在月经周期的中期  
D. 有月经来潮就有排卵  
E. 孕激素量在排卵期前达高峰
12. 卵子未受精, 黄体萎缩时间在排卵后
- A. 5~6 天  
B. 7~8 天  
C. 9~10 天  
D. 11~12 天  
E. 13~14 天
13. 卵巢分泌的激素, 下列哪项是正确的
- A. 雌、孕激素  
B. 甲状腺素  
C. 黄体生成素(LH)  
D. 促性腺激素释放激素(GnRH)  
E. 促卵泡素(FSH)
14. 预防老年妇女骨质疏松, 下列哪项可采用
- A. 口服铁剂  
B. 口服鱼肝油  
C. 口服维生素  
D. 口服尼尔雌醇  
E. 口服甲状腺素片

(二) A<sub>2</sub> 型题

15. 下列哪项不是了解卵巢功能的检测方法
- A. 阴道脱落细胞涂片检查  
B. 镜检宫颈粘液结晶  
C. 子宫内膜活检  
D. 测定血中糖皮质激素水平  
E. 基础体温测定
16. 关于月经, 下列哪项是错误的
- A. 月经一般持续 3~7 天  
B. 有周期性子宫内膜出血就有排卵  
C. 月经是性功能成熟的一项标志  
D. 月经血呈暗红色不凝固  
E. 月经周期的长短取决于卵泡期的长短
17. 关于月经前期, 下列哪项是错误的
- A. 黄体萎缩  
B. 雌、孕激素分泌量下降



- C. 子宫内膜间质水肿消失  
D. 基底小动脉呈痉挛性收缩  
E. 子宫内膜出血以小动脉为主
18. 下列哪项不提示已排卵  
A. 卵巢黄体已形成  
B. 子宫内膜呈增生期变化  
C. 宫颈粘液涂片可见椭圆体  
D. 基础体温双相  
E. 阴道涂片多为中层细胞和角化前细胞
19. 下列哪项与阴道自净作用无关  
A. 雌激素  
B. 阴道内乳酸杆菌  
C. 阴道粘膜上皮糖原含量  
D. 宫颈粘液  
E. 阴道 pH 值
20. 下列哪项是错误的  
A. 雌激素使子宫对催产素敏感  
B. 小剂量催产素可以使子宫节律性收缩  
C. 孕激素可促使子宫发育, 肌层增厚  
D. 大剂量催产素使子宫发生强直性收缩  
E. 雌、孕激素对丘脑分泌的激素有反馈作用
21. 下列哪项不受性激素影响  
A. 阴道上皮细胞  
B. 子宫内膜  
C. 输卵管粘膜  
D. 卵巢生发上皮  
E. 宫颈粘液