

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛 己立齋補註
鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷四

婦人血風肢體骨節疼痛方論第一

婦人血風。繇氣血不足。腠理不密。風冷乘之。以致邪正相搏。故骨節疼痛。肢體發熱。口舌咽乾。

愚按東垣先生云。飲食失節。脾胃虛弱。乃血所生病。故口中津液不行。若火熱來乘土位。故肢體發熱作渴。若肝經血熱。用四物。羌活、黃芩、黃柏。肝經血虛。用逍遙散。山梔、川芎。風濕兼痰。用四物。南星、半夏、羌活、蒼朮。風濕傷脾。用羌活勝濕湯。暑濕傷氣。用清燥湯。氣鬱肝脾。用四君。木香、枳殼、檳榔。胃氣受傷。用補中

益氣湯。瘀血流注。用四物、桃仁、紅花。骨痛筋攣。用當歸、沒藥。倦怠無力。用補中益氣、羌活、川芎。

附治驗

一婦人自汗盜汗。發熱晡熱。體倦少食。月經不調。吐痰甚多。二年後。遍身作痛。陰雨益甚。此氣虛而風寒所乘。用小續命湯。疼痛頓止。用補中益氣、加味歸脾。三十餘劑。諸症悉愈。

一婦人月經不調。且素有痛風。過勞必作。用衆手重按。痛稍止。此氣血俱虛。用十全大補。加獨活而痛痊。用六味丸。逍遙散而經調。

一婦人肢體作痛。面色痿黃。時或赤白。發熱惡寒。吐瀉食少。腹痛脇脹。月經不時。或如崩漏。或痰盛喘嗽。頭目眩痛。或五心煩熱。口渴飲湯。或健忘驚悸。盜汗無寐等症。臥床年許。悉屬肝脾虧損。氣血不足所致。用十全大補。加味歸脾。兼服月餘。諸症悉痊。

芎藭散

川芎 一錢

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁 炒

桂心

當歸酒洗

木香

牛膝酒洗

羌活

枳殼炒

甘草各三

右水煎服。

羚羊角散 治血氣身體疼痛手足無力。

羚羊角 銹

酸棗仁炒

生地黄

檳榔各半

五加皮

防風

赤芍藥

當歸酒洗

骨碎補炒

海桐皮

川芎各五錢

甘草三錢

右爲末。每服二錢。溫酒調下。

通靈丸 治血風手足疼痛不可忍者。

白附子

僵蠶各一兩去絲

全蠍半兩炒

麝香一字

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服十丸。溫酒下。日二服。

當歸沒藥丸 治血風肢體刺痛。筋攣骨痺。或手足麻木。

當歸

五靈脂各一兩雨炒

沒藥半兩

右爲末。醋糊丸。桐子大。每服三十丸。薑湯下。

虎骨散 治血風走痛。或打撲作痛。

虎骨酥炙

敗龜板酥炙

當歸酒洗

桂心

牛膝酒洗

漏蘆

地龍去土

葳靈仙

玄胡索炒

自然銅製等

右爲末。每服二錢。熱酒調下。

附方

羌活勝濕湯 治頭痛脊痛。腰似折。項似拔。

羌活

獨活錢各一

藁本

防風

甘草

炙各五分

蔓荆子

川芎各二分

右水煎服。如身重腰沉沉然。是濕熱也。加黃柏一錢。附子半錢。白朮二錢。

東垣清燥湯

後方見

四物湯

補中益氣湯

四君子湯

三方見二十卷第六論

小續命湯

方見十九卷第八論

逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

六味丸 方見二十四卷第十一論

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

婦人血風。白虎歷節。繇體虛風邪乘之。隨血而行。或淫溢皮膚。或卒然掣痛走疰。如虎噬者。加減小續命湯主之。

愚按東垣云。若人身體沉重。走疰疼痛。此濕熱相搏。或風熱鬱而不得伸。附着於有形也。是症多因飲食起居失節。或因七情勞役失宜。脾胃虧損。腠理不密。外邪所侵。以致內熱晡熱。自汗盜汗。或經候不調。飲食不甘。治法。濕熱腫痛者。清燥湯兼痰。佐以二陳湯。肝火作痛者。加味逍遙散。脾鬱作痛者。加味歸脾湯。血虛作痛者。四物湯。氣虛作痛者。四君子湯。氣血俱虛者。八珍湯。俱加羌活。川芎。月經先期而痛者。加味逍遙散。頭眩倦怠而痛者。補中益氣湯。大抵按之痛甚者。病氣實。按之痛緩者。元氣虛。勞役而痛者。亦元氣虛也。飲食失宜而痛者。脾氣虛也。惱怒而痛者。肝火盛也。若晝輕而夜重者。血分病也。與前兼用

附治驗

一婦人歷節發熱作渴。飲食少思。月經過期。其脈舉之洪大。按之微細。用附子八物。四劑而痛止。用加味逍遙而元氣復。用六味丸而月經調。

一婦人體肥胖。素有熱。月經先期。患痛風。下體微腫。痛甚則小便頻數。身重脈緩。

此風濕血虛而有熱。用羌活勝濕湯二劑。腫痛漸愈。用清燥湯數劑。小便漸清。用加味逍遙散。內熱漸愈。又爲飲食停滯。發熱仍痛。面目浮腫。用六君加柴胡。升麻而愈。又因怒氣。小腹痞悶。寒熱嘔吐。用前藥加山梔。木香而安。惟小腹下墜。似欲去後。此脾氣下陷。用補中益氣而愈。後因勞役怒氣。作嘔吐痰。遍身腫痛。經行寒熱。此肝木侮脾土。用六君加柴胡。山梔。腫痛嘔吐悉退。後用補中益氣而安。

一婦人飲食少思。畏風寒。患痛風。嘔吐寒熱。脈弦緊。用附子八物而四肢痛愈。用獨活寄生而腰痛漸痊。惟兩膝腫痛。用大防風湯而痛漸愈。用歸脾。逍遙而元氣復。

漏蘆散 治走疰疼痛。

漏蘆

當歸酒洗

牛膝各三錢

桂心

地龍去土

防風

羌活

白芷

沒藥

甜瓜子各半兩

虎脛骨

敗龜板各一兩

右爲末。每服二錢。熱酒調下。

四生丸 治骨節作痛。或渾身麻痺。

白僵蠶絲炒去

地龍去土

白附子

五靈脂

草烏去皮尖

右爲末。米糊丸。桐子大。每服二十丸。茶清送下。酒調服亦可。

麝香丸 治歷節諸風走痛。或如蟲行。

大川烏三箇去皮尖生用 全蠍二十箇

黑豆二粒

地龍去土錢

麝香一字

右爲末。米糊丸。菉豆大。每服十丸。溫酒下。許學士云。予得此方。凡歷節及不測疼痛。一二服便瘥。治一貴婦。遍身走痛。夜如蟲嚙。三服而愈。

附子八物湯 治歷節痛如錐鋸。

附子炮

乾薑炮

芍藥炒

茯苓

人參

甘草

桂心各五分

白朮一分

右水煎服。一方去桂。用熟地黃二錢。

獨活寄生湯方見後

小續命湯方見後

一婦人兩踝作痛。上行膝脾肩肘。痛如鎚鎚。至夜尤劇。六脈皆緊。一劑而愈。又鄧安人。夏月患此。人迎脈虛。此因暑而得。用酒蒸黃連丸。一服亦安。

附方

東垣清燥湯 治元氣虛。濕熱乘之。遍身痠軟。或肺金受邪。絕寒水生化之源。腎無所養。小便赤少。大便不調。腿腰痿軟。或口乾作渴。體重麻木。頭目眩暈。飲食少思。或自汗盜汗。肢體倦怠。胸滿氣臭。

黃耆一錢五分

五味子九粒炒

黃連炒

神麴炒

猪苓

柴胡

甘草二分

蒼朮

白朮炒

麥門冬去皮

陳皮炒

生地黃

澤瀉各五分

白茯苓

人參

當歸酒洗

升麻各三分

黃柏酒拌一分

右水煎服。

二陳湯方見二十四卷第五論

八珍湯

加味歸脾湯三方見二十四卷第四論四物湯

加味逍遙散

四君子湯

六君子湯

羌活勝濕湯方見前

補中益氣湯

四方見二十六卷第六論六味丸
方見二十四卷第十一論

大防風湯

方見二十四卷第九論

婦人血風癰癧瘰癧方論第二

婦人癰癧瘰癧。五心煩熱。乃血風攻疰。用人參荊芥散。消風散。逍遙散。大抵因體虛風寒相搏。赤屬血分。而白屬氣分也。經云。汗出見濕。乃生痤瘡。凡人汗出。不可露臥沐浴。使人身振寒熱。致生風癰也。

愚按。前症有身發疙瘩。或如丹毒。癢痛不常。或膿水淋漓。發熱煩渴。或頭目昏眩。日晡益甚。或寒熱發熱。月經不調。皆肝經風熱血燥。用加味逍遙散爲主。佐以四君。芎歸。若忿怒身發疙瘩。痛疼寒熱。乃肝火血燥。用加味小柴胡湯。氣血俱虛。八珍加柴胡。丹皮。若夜間發熱。作渴譫語。乃熱入血室。用小柴胡加生地。血虛。四物合小柴胡。後用加味逍遙散調理。若鬱結食少體倦。內熱晡熱。乃脾經血燥。用加味歸脾湯。寒熱。加山梔。熟地。若遊走瘙癢。乃血風走注。用何首烏散。血虛。逍遙散。風熱。消風散。若專用風藥。復傷陰血。必致筋攣等症。

附治驗

一婦人身發疥瘡。或生丹毒。癢痛不常。搔碎成瘡。膿水淋漓。發熱煩渴。頭目眩暈。日晡益甚。此血虛內熱之症。以當歸飲。加柴胡、山梔治之而愈。

一婦人患前症。肢體疼痛。頭目不清。自汗盜汗。月水不調。肚腹作痛。食少倦怠。先用參荊芥散。後用逍遙散。治之而痊。

一婦人因忿怒。身發疥瘡。憎寒發熱。余謂肝火。用小柴胡湯。加山梔、黃連治之而愈。後口苦脇痛。小便淋漓。復用前藥全愈。

一婦人患前症發熱。夜間譫語。此血分有熱。以小柴胡湯。加生地治之而安。後用四物湯。加柴胡、山梔、丹皮而熱退。又用逍遙散全愈。

一室女十四歲。天癸未至。身發赤斑癢痛。左關脈弦數。此因肝火血熱。以小柴胡湯。加山梔、生地、丹皮治之而愈。若因怒而致者。亦宜治以前藥。治驗餘見二十四卷血風門

何首烏散 治皮膚癢癢。遊走無定。

何首烏

防風

白蒺藜炒

枳殼麸炒

天麻

僵蠶

胡麻炒

荒蔚子

蔓荊子錢各一

茵陳五分

右水煎服。

附方

四物湯

四君子湯四方見二十卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯

四方見二十卷第二論

八珍湯

加味歸脾湯

加味逍遙散

逍遙散四方見二十四卷第四論

消風散方見二十四卷第七論

當歸飲

方見二十四卷第六論

人參荊芥散方見五卷第三論

婦人虛風頭目眩暈方論第四

婦人頭眩。繇氣虛風入於腦。循脈引於目系。目系急而然也。邪甚則必癲。素問云。頭痛癲疾。下虛上實。過在足少陰巨陽。甚則入腎。徇蒙招搖。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則在肝。下虛者腎虛也。故腎厥則頭痛。上虛者肝虛也。故肝虛則暈。徇蒙者。如以物蒙其首。招搖不定。目眩耳聾。皆暈之狀。故肝厥頭痛不同也。

愚按丹溪先生云。眩者言其黑運旋轉。其狀目閉眼昏。身轉耳聾。如立舟船之上。起則欲倒。蓋虛極乘寒得之。亦不可一途而取軌也。若風則有汗。寒則掣痛。暑則熱悶。溼則重滯。此四氣乘虛而眩運也。若鬱結生痰而眩暈者。此七情虛火上逆也。若淫慾過度而眩暈者。此腎虛氣不歸源也。若吐衄漏崩而眩暈。此肝虛不能攝血也。有早起眩暈。須臾自定者。元氣虛也。正元飲下黑錫丹。傷溼頭運。用腎着湯。加川芎。有痰。用青州白丸子。頭風風熱也。久則目昏偏頭風。相火也。久則目緊便澀。皆宜出血以開表之。竊謂前症肝虛頭暈。用鈎藤散。腎虛頭暈。六味丸。頭暈吐痰。養正丹。不應。八味丸。血虛。四物參苓白朮。不應。當歸補血湯。氣虛。四君歸耆。不應。益氣湯。用木實瀉青丸。虛。用地黃丸。不應。川芎散。脾氣虛。二陳參朮柴胡升麻。不應。益氣湯。加茯苓半夏。脾胃有痰。半夏白朮天麻湯。風痰上壅。四神散發熱惡寒。八物湯。七精氣逆。四七湯。傷濕而暈。除濕湯。

附治驗

一婦人素頭暈。不時而作。月經遲而少。此中氣虛弱。不能上升而頭暈。不能下化而經少。用補中益氣湯而愈。後因勞仆地。月經如湧。此勞傷火動。用前湯加五

味子。一劑而愈。前症雖云氣無所附。實因脾氣虧損耳。

婦人內熱口乾。勞則頭暈。吐痰帶下。詳見六卷第十六論。

養正丹治 虛風頭眩。吐涎不已。蓋此藥升降陰陽。補接真氣。非止頭眩而已。

黑鉛

水銀

硫黃

硃砂

右用砂器鎔鉛。下水銀攪勻。離火少時。入硫砂再攪。候冷爲末。飯丸。菴豆大。每

服三十丸。空心。食前。棗湯下。

鈎藤散 治肝厥頭暈。

鈎藤鈎

陳皮

半夏

麥門冬

茯苓

茯苓

人參

甘菊花

防風

甘草

石膏

右薑水煎。

川芎散 治肝腎虛風。頭目眩暈。或頭痛耳鳴。目系緊急。

小川芎

山藥

白茯苓

甘菊花

人參

山茱萸肉

右爲末。每服二錢。酒調。日三服。

三五七散 治八風五痺。肢體不仁。或風寒入腦。頭痛目旋。耳內蟬鳴。

附子炮

細辛各三兩

山茱萸

乾薑各五兩

防風

山藥各七兩

右爲末。每服二錢。溫酒調。

四神散 治血風眩暈。頭痛寒熱唾痰。

菊花

當歸酒洗

旋覆花去梗

荆芥穗各一

右葱白三寸。茶末一錢。水煎。

附方 治血風頭旋。或不知人事。用喝起草嫩心。陰乾爲末。酒服二錢。其功甚效。

卽前蒼耳散。

治頭旋如天動地轉。名曰心眩。膽礬一兩細研。用麵餅劑一箇拌勻。勒如骰子大。瓦上焙乾。每服一散爲末。燈心竹茹煎湯調下。此去痰之法。當審而用之。

附方

正元飲 治下元虛敗。痰氣上湧。頭目眩暈。臟腑滑泄。時或自汗。手足逆冷。霍亂

轉筋等症。

紅豆錢炒二

人參去蘆二兩

附子炮去皮一兩

茯苓

甘草炙各一兩

肉桂五錢

川芎

山藥炒薑汁

烏藥

乾葛各一兩

白朮二兩

乾薑錢炮三

黃耆炙一兩半

右每服三錢。薑棗水。入鹽少許。煎送黑錫丹。

黑錫丹 治真陽虛敗。痰氣壅塞。心火炎熾。或赤白帶下等症。

肉桂

沉香

附子炮去皮臍

葫蘆巴酒浸炒

破故紙炒

茴香炒

肉豆蔻麵裹煨

陽起石飛研水

金鈴子蒸去皮核

木香各一兩

硫黃

黑錫去灰各二兩

右將黑錫。硫黃入銚內。煉結砂子。傾出地上。去火毒。研細。餘藥為末和勻。再研

至黑光色。酒糊丸。桐子大。陰乾。入布袋擦令光潤。每服四十丸。

腎着湯方見十五卷第八論

青州白丸子方見三卷第四論

六味丸

八味丸二方見二十四卷第十一論

當歸補血湯方見十九卷第六論

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

二陳湯

方見二十四卷第五論

瀉青丸

方見二十四卷第三論

八物湯

方見二十四卷第四論

四七湯

方見十二卷第七論

除濕湯

即腎着湯加川芎

半夏白朮天麻湯

方見四卷第五論

婦人血風頭痛方論第五

許學士云。婦人患頭風者。十居其半。每發必掉眩。如在車船之上。蓋因肝經血虛。而風邪襲之爾。用川芎當歸散。若頭痛連齒。時發時止。連年不已。此風中腦。謂之厥逆頭痛。宜白附子散。及灸曲鬢穴。在耳掩前正尖上。灸七壯。左痛灸左。右痛灸右。

愚按。東垣云。足太陽頭痛。脈浮緊。惡風寒。川芎、羌活、獨活、麻黃爲主。手少陽經頭痛。脈弦細。往來寒熱。柴胡爲主。足陽明頭痛。身熱。目疼。鼻乾。惡寒發熱。脈浮緩而長。升麻湯。或石膏、白芷爲主。手太陽頭痛。有痰體重。或腹痛。爲痰癖。脈沉緩。蒼朮、半夏、南星爲主。足少陰經頭痛。足寒氣逆。爲寒厥。脈沉細。麻黃附子細辛湯爲主。足厥陰頭項痛。或吐涎沫。厥冷。脈浮緩。吳茱萸湯主之。諸血虛頭痛。

當歸、川芎爲主。諸氣虛頭痛。人參、黃耆爲主。氣血俱虛。頭痛調中益氣。少加川芎、蔓荊、細辛。痰厥頭痛。半夏、白朮、天麻湯。厥逆頭痛。羌活附子湯。如濕氣在頭者。以苦吐之。不可執方而治。若脈雜見而病見不一。且補胃爲主。

附治驗

一婦人因勞耳鳴。頭痛體倦。用補中益氣。加麥門、五味而痊。三年後得子。因飲食勞倦。前症益甚。月經不調。晡熱內熱。自汗盜汗。用六味地黃丸。補中益氣湯頓愈。經云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。故脾胃一虛。耳目九竅皆爲之病。一婦人兩眉稜痛。後及太陽。面青善怒。此肝經風熱之症。用選奇湯合逍遙散。加山梔、天麻、黃耆、半夏、黃芩而愈。此症失治。多致傷目。或兩耳出膿。則危矣。頭痛手掉身麻。見一卷第五論。

川芎當歸散

川芎 一錢

當歸 酒拌

羌活

旋覆花

細辛

蔓荊子

防風

石膏 煨

藁本

荊芥穗

半夏 麩

生地黃